

# Lapkritis

## Mėnesio TOP pasiūlymai



-50%

### FORMULA VITALE

atrinktos prekės

**MAISTO PAPILDAI**  
„Formula Vitale“ biologiskai aktyvių medžiagų deriniai, kuriuose yra būtinų vitaminų, mineralų ir augalinų veikluių medžiagų, kurių kasdien reikia mūsų organizmui. Be glitimo, be laktozės, be GMO. Tinka veganams!



**1+1**

Perkant pakuotę –  
antra tokia pati DOVANU!

**PROVISOR**  
atrinktos prekės

**MAISTO PAPILDAI**  
Daugiau energijos – laimingesni Jūs!  
PROVISOR maisto papildai, tai – geriausios ir išskirtinės sudėtys, maksimaliai pasisavinamos formos.  
ATRASKITE SAU TINKANTĮ PRODUKTĄ!



**1+1**

Perkant pakuotę –  
antra tokia pati DOVANU!

### BIOFARMACIJA

atrinktos prekės

**MAISTO PAPILDAI**  
Maisto papildai milteliais geriamajam tirpeliui ruoštų Jūsų vidiniams grožiui „bioODA MAXfiller“ ir „bioODA“ – tai kolageno, hialuronu rūgštis, natūralios kilmės vitaminu C, magniu ir cinko kompleksai odos jaujymui, išsininkite reikalingiausiai; „bioODA“ – 1 paketėlyje 4500 mg kolageno ir 50 mg hialuronu rūgštis; „bioODA MAXfiller“ – 1 paketėlyje net 12000 mg kolageno ir 200 mg hialuronu rūgštis. „HYAMAX“ – net 500 mg hialuronu rūgštis ir 50 mg rusvujų jūrų dumblų ekstrakto vlenamie pakelelyje. Rusvujų jūrų dumblų ekstraktas padeda drėkininti ir palaidyti normalią odos bokšte, „reHAIR“ – kompleksinė priemonė, kurios aktyvios medžiagos padeda stabdyti moterių ir vyrių plauku slinkimą, skatinanti išsilankusius plaukus ataugima bei stiprina plaukus. Produktų sudėtyje tik aktyviosios medžiagos: be konzervantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų. Pagaminta Izraelyje.



**-50%**

### EMILI

žolelių arbatos

**MAISTO PAPILDAS**  
Emili žolelių arbato gėrai savijautai.  
Emili žolelių arbato vaikams ir suaugusiesiems.  
Emili žolelių arbato aktyviai dienai ir jaukiam vakarui.



# Gerai savijautai

**a.**  
Apotheka



2,99 €

**NEUROMED**  
geriamieji lašai, tirpalas, 50 ml

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Nuo nerimo, įtampos ir nemigos. Veiklosios medžiagos, stíprumas: skystasis ekstraktas iš valerijonų šaknų, šventagaršvių šaknų, meliso lapų, agurkų spurgų, levandų žiedų (6/4/5/2/3) (1:2), 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis geriaminis vaistinis preparatas. Jūro indikacijos: pagrįstas tik ligalaikiu varčymu, skirtas nesuprimomis mažėjimams, miegai gerinti bei viršinkinti sutrikimams leidinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Saugausiesiems ir vaikams nuo 12 m. geri 1-3 kartus per dieną po 10-20 lašų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms medžiagoms. Specialūs išpejimai: vaisto nerekomenduojama vartoti jaunesniams nei 12 m. asmenims, nes nėra atlikta atitinkamai saugumo tyrimų. Jeigu vartojant si vaista išgau negu 4 savaites simptomai išlieka ar pasunkė, būtina pasirti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Šventagaršvių šaknyse esančios furanokumarinai didina žmonių odos jautrumą šviesos poveikiu ir tai gali sukelti odos uždegimą, todėl šventagaršvių preparato vartojimo laikotarpiui reikiėtų vengti būti sauleje arba gydytis ultravioletiniais spinduliais. Preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-30.



-40%

**NEUROMED**  
SLEEP kapsulės, N15  
SLEEP FORTE tabletės, N30  
GOOD MOOD antidepresantas su šafranu, kapsulės, N15

**MAISTO PAPILDAS**

Miegai ir nervų sistemių.

„Neuromed Sleep“ – greita pagalba, kad pavyktyti lengviau užmigtį ir ramiai miegoti. Vartoti epizodiškai, neužmiegant, prabundant naakti. Išbandykite „Neuromed Sleep FORTE“ – tręjopų efekto čiuaplamašas tabletės, kurios padės greičiau užmigtį, kokybiškai išsimiegoti ir iš ryto jauktis išvali.

„Neuromed Good Mood“ su šafranu ir kurkuminiu – gerai nuotaikai, psichologinė funkcija, nuovargiu mažinti. Vartoti petriant išgau užtisetus stresą, jaučiant nuovargį, apliečiant pozityvius mintimus. KARTU Į RAMYBĘ SU „NEUROMED“!



1+1

Perkant pakuočę –  
antra tokia pati DOVANŲ!

**RAMEVAL®**  
kapsulės, N15

**MAISTO PAPILDAS**

„Rameval®“ – rambys augalų puokštė sulkurta iš valerijonų, meliso, pipirinių mėtų, ramunių ir apynių. „Rameval®“ padeda:  
– palaikti normalią nervų sistemos būklę (valerijonai),  
– atsiplėšti (vaistinės melisos, pipirinių metos, vaistinės ramunes),  
– palengvinti užmigimą ir palaikti miego kokybę (vaistinės melisos, paprastieji apyniai),  
IEŠKAI RAMYBĘ? ATRASK JĄ SU RAMEVAL.



nuo  
5,89 €

**SEDATIF PC**

tabletės, N40 5,89 €

tabletės, N90 9,19 €

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stíprumas: Aibus precatorius 6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatinės principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: saugausiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletės 3 kartus per parą, „Sedatif PC“ veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų néra, todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinėmis medžiagomis, jei yra bakteriniai sukelėtai žarnyno uždegimai. Specialūs išpejimai: šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kurieems nustatytas relas pavidelmas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, glukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygiai. Reklamos teksto parengimo data 2019-08. VEIK STRESA, KOL STRESAS NE/VEIK TAVĘS.



3,59 €

**LOPEDUM EXPRESS** 2 mg kietosios kapsulės,

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

Veiklosios medžiagos, stíprumas: vienoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochloridas. Terapinės indikacijos: simptominis suaugusiaių ir vyresnių kaip 12 metų paugilių čiūminto viduriavimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: iš pradžia reikia geri 2 kapsulės, vėliau (po kiekvieno išsiuvišinimo dėl toksinų ir mitbos kepenų pažeidimo ar hepatito, malaišinimų) – po 1 kapsulę. Kontraindikacijos: nevarolti jaunesniams kaip 12 metų vaikams, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėmis medžiagomis, jei yra bakteriniai sukelėtai žarnyno uždegimai. Specialūs išpejimai: jei per 48 val. po vaistio išgérimo viduriavimais nesuslipinėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636030. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2403136090. Teksto patvirtinimo data: 2024 03 13.

PAGALBA NUO VIDURIAVIMO



nuo  
9,59 €

**ESSENTIALE FORTE N**

300 mg, kietosios kapsulės, N30 9,59 €  
300 mg, kietosios kapsulės, N100 14,69 €  
600 mg, kietosios kapsulės, N30 13,99 €

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

Veiklosios medžiagos, stíprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomai, tokii kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje sritimi, atradusius dėl toksinų ir mitbos kepenų pažeidimo ar hepatito, malaišinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: susaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paugiliams vienkartinė dozė – dvie 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvie 300 mg kietosias kapsulės 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų) arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). Essentiale forte N saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paugiliams iki 12 metų netirtas. Dėl šios priežiūrės Essentiale forte N neturėtai būti vartojamas vaikams ir paugiliams iki 12 metų. Kapsulės geramos valgyti metu, nekrumytos, užengeriant dideliu skygio kiekiiu (pvz., stikliniu vandeniu). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinėi arba išsiuvišinimai – mitos medžiagai. Padidėjęs jautrumas nėra sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs išpejimai: Essentiale forte N neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) suleito kepenų pažeidimų. Jei yra kepenų pažeidimai, negalima vartoti alkoholio. Essentiale forte N gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti konvegti pastančių vaistų dozė. Essentiale forte N sudėtyje yra refiniuoto sojų aliejus, hidrato ricinos aliejus ir etanolio. Ricinos aliejus gali skandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šis vaistas sudėtyje yra mažas etanolio kiekis. Teksto parengimo data: 2024 01 20. Mėnesio top kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 2022 08, sausio mėn. 2201\_SB\_Essentiale\_V01\_LT

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIAMS!

-50%



**VITIRON™**

MIND & BODY FORTE kapsulės, N30  
KIDS guminukai, N50

**MAISTO PAPILDA**

„Vitiron™ Mind & Body FORTE“ – vitaminai ir mineralinės medžiagos ligalaiki PROTINEI bei FIZINEI išvermeti. Vitaminai C, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, biotinas, niacinomas padeda palaikti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią psichologinę funkciją. Ypatinga, lėto atpalaidavimo kapsulė, iš kurios vitaminai ir mineralinės medžiagos išskiriliai po 5 valandas, suteikdami energijos ligesniam laikui. „Vitiron™ Kids“ – tai vaisių ir uogų skonių, išvairių formų kramtomoji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. PATENKINS VISUS AUGANCIO VAIKO MIKROELEMENTŲ POREKIUS IR PADĖS PALAIKYTI GERĄ IMUNINĘ SISTEMOS VEIKLĄ.



# Peršalimo vaistinėlei



9,89 €

## SEPTABENE

1,5 mg / 5 mg / 1 ml burnos gleyvinės purškalas, 30 ml

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Septabene dezinfekcijai burnai ir ryklių bei lengvai ryklės uždegimui požymius – skausma, paraudima, patinima, karštis ir funkcijos sutrikimai.

Septabene varjotomas uždegimui ir skausmui mažinti bei antisepiniams poveikiu sukeit:

- jei yra ryklė, burnos ir dantų dirgimasis;
- sergančiam dantų uždegimui (gingivitu), lergiles uždegimui (faringitu) ir gerkių uždegimui (tarngitu);
- priėti dantų traukimai ir poimai;

**Dozavimas** suaugusiesiems. Vienkartinė dozė yra suartojama purktuvu galiuose paspaudus vieną kartą. Tokia dozė kartotinė galima varoti kai 2 valandas 3–5 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veiklosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima varoti ligai kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomoje poveikio nebūna, pacientas turi pasirūpti su gydytoju. Septabene negalima varoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. **Specialūs išpejimai ir atsargumo priemonės.** Septabene negalima varoti ligai kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomoje poveikio nebūna, pacientas turi pasirūpti su gydytoju. Septabene negalima varoti kartu su anjoninėmis medžiagomis, kurių yra, pvz., dantų pastosa. Todėl valstinių preparato nerekomenduojama varoti prieš pat dantų valymą arba tuo po jo. Reklamos tekstas parengimo data: 2023 12 12.



7,59 €

## SEPTABENE

3 mg / 1 mg citrinų ir šeivamedžio skonio pastilės, N16

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Septabene dezinfekcijai burnai ir ryklių bei lengvai ryklės uždegimui požymius – skausma, paraudima, patinima, karštis ir funkcijos sutrikimai. Septabene varjotomas uždegimui ir skausmui mažinti bei antisepiniams poveikiu sukeit:

- jei yra ryklė, burnos ir dantų dirgimasis;
- sergančiam dantų uždegimui (gingivitu), lergiles uždegimui (faringitu) ir gerkių uždegimui (tarngitu);
- priėti dantų traukimai ir poimai;

**Dozavimas** suaugusiesiems. Rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietaja pastile reikia ietai ištrupinti burnoje kas 3–6 valandos. **6–12 metų vaikams.** Rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietaja pastile reikia ietai ištrupinti burnoje kas 3–6 valandos. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veiklosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. **Specialūs išpejimai ir atsargumo priemonės.** Septabene negalima varoti ligai kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomoje poveikio nebūna, pacientas turi pasirūpti su gydytoju. Sakeikite su kitais valstinišiais preparatais ir kitokiai savelka. Septabene negalima varoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima varoti kartu su pliušu, kadangi jis sliprina celipti prindinio chlorido antikorpių poveikį.

TAVO GERKLE – TAVO JEGA!



6,59 €

## ILOXEN

200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės, N12

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosioms medžiagoms, ir atspalviams, būdingame plėvele dengtose tabletėse yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudofedino hidrochlorido. **Indikacijos** ILOXEN varjotomas nosies uždegimui, susijusiu su diminu rincipiu (influenza virusinės lėtinės, cingiminių grybas, kurios yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas\*. Varjotimo būdas ir dozavimas: tabletė reikiu muriuti nepraežiast ir nekrumytai, užgeriant didelę skystinė vandenė. Geriausia – valgo metu. **Suaugusiesiems** ir 15 metų bei vyresniems pasaulyje po 1 tabletė kaip 6 val. pagal porelą. Jeigu simptomai išreiški stipriau: po 1 tabletė kaip 6 val. pagal porelą. Ne dozavimai ne daugiau kaip 6 tabletės per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veiklosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima varoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Specialūs išpejimai ir atsargumo priemonės. Septabene negalima varoti tuo pat metu kartu su anjoninėmis medžiagomis, kurių yra, pvz., dantų pastosa. Todėl valstinių preparato nerekomenduojama varoti prieš pat dantų valymą arba tuo po jo. Reklamos tekstas parengimo data: 2023 12 12.



4,79 €

## BRONTEX

60 mg šypnūsišios tabletės, N10

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1. šypnūsišios tabletės yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. Indikacijos: kvėpavimo taku skystinės ligoniams, sergantiems čiūme arba lėtinė bronchijų ar plaučių liga, kurios metu sutinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Dozavimas ir varjotimo metodas: suaugusiesiems ir vyresniems kai 12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg ambroksolio (pusę šypnūsišios tabletės). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstu veiklos nepakankamumu, doze reikiu mažinti ir (arba) varoti rečiu. Ambrosksolio nepatariama varoti ligai kaip 4–5 paras. **Kontraindikacijos.** „Brontex“ negalima varoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinėi medžiagai. Šypnūsišių tabletėlių „Brontex“ negalima varoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs išpejimai:** ju reikia laikytis, jei sutrikusi bronchių motorika ir padidėjusi glevių sekrecija, jei sutrikusi inkstu veikla arba sergančių sunkių kepenų liga, buvus, pepsimeti opai arba nustasičius fruktosez netoleravimą, taip pat sergantiesiems cukrinium diabetu (varjotant sirupą). Jeigu pasireiškė odos išbėrimai (iskaitant glevių, puz., burnos, gerkių, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), „Brontex“ varjotima reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Reklamos tekstas parengimo data: 2021 08 02. ISGYDYS NUO KOSULIO VISĄ ŠEIMĄ!



5,49 €

## SEPTANAZAL

1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tipralas), suaugusiesiems, 10 ml

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Ksilometazolinio hidrochloridas / Dekspanterenolis

Septanazal nuo 6 metų amžiaus varjotomas:

- nosies gleviniams purbukimui mažinti sergančios nosies glevinės uždegimui (rinitu) bei glevinės pažeidimui glijimui skatinti;
- nealerginiams nosies glevinės uždegimui (vazotoniniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosies pasnaukėjimui.

Rekomenduojama dozė 6 metu bei vyresniems vaikams yra po viena įjūskimai į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

**Kontraindikacijos.** Septanazal suaugusiesiems varoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolinio hidrochloridui, dekspanterenoliui arba bet kuriai pagalbinėi ūžio valstinių medžiagai. Jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies glevinės uždegimas ir atsiranda šausis (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinėta posmeglinė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. **Specialūs išpejimai.** Septanazal galima varoti tik atidžiai ivertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidázės inhibitorius (MAOI) ar kitokias krausospūdžių didinti galinčias valstinišias preparatus, yra padidėjęs akisplūdis (ypač jei sergama uždaruo kampo glaukomu), pacientas serga sunkiai širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023 11 20.

ATKEMŠA UŽGULUSIA NOSI IR SVELNIAI GYD OSSAUSĖJUSIA NOSIES GLEVINE



5,49 €

## SEPTANAZAL

0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tipralas), vaikams, 10 ml

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Ksilometazolinio hidrochloridas / Dekspanterenolis

Septanazal nuo 6 metų amžiaus varjotomas:

- nosies gleviniams purbukimui mažinti sergančios nosies glevinės uždegimui (rinitu) bei glevinės pažeidimui glijimui skatinti;
- nealerginiams nosies glevinės uždegimui (vazotoniniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosies pasnaukėjimui.

Rekomenduojama dozė 6 metu bei vyresniems vaikams yra po viena įjūskimai į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

**Kontraindikacijos.** Septanazal suaugusiesiems varoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolinio hidrochloridui, dekspanterenoliui arba bet kuriai pagalbinėi ūžio valstinių medžiagai. Jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies glevinės uždegimas ir atsiranda šausis (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinėta posmeglinė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smogenų dangalais. **Specialūs išpejimai.** Septanazal galima varoti tik atidžiai ivertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidázės inhibitorius (MAOI) ar kitokias krausospūdžių didinti galinčias valstinišias preparatus, yra padidėjęs akisplūdis (ypač jei sergama uždaruo kampo glaukomu), pacientas serga sunkiai širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. **Teksto peržiūros data:** 2023 11 20.

ATKEMŠA UŽGULUSIA NOSI IR SVELNIAI GYD OSSAUSĖJUSIA NOSIES GLEVINE



3,89 €

## BRONTEX

15 mg/5 ml sirupas, 100 ml

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 5 ml sirupo yra 15 mg ambrosksolio hidrochlorido. **Indikacijos:** kvėpavimo taku sekreto skystinės ligoniams, sergantiems čiūme arba lėtinė bronchijų ar plaučių liga, kurios metu sutinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Dozavimas ir varjotimo metodas: 2–5 ml. vaikams skrima 3 kartus per parą po 7,5 mg ambrosksolio (2,5 ml sirupo); 6–12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 15 mg ambrosksolio (5 ml sirupo); suaugusiesiems ir vyresniems kai 12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg ambrosksolio (10 ml sirupo). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstu veiklos nepakankamumu, doze reikiu mažinti ir (arba) varoti rečiu. Ambrosksolio nepatariama varoti ligai kaip 4–5 paras. **Kontraindikacijos.** „Brontex“ negalima varoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosksoliui ar bet kuriai pagalbinėi medžiagai. Ambrosksolio hidrochlorido negalima varoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams. **Specialūs išpejimai:** „Brontex“ negalima varoti ligai kaip 4–5 paras. **Kontraindikacijos.** „Brontex“ negalima varoti, jei reikia laikytis, jei sutrikusi bronchių motorika ir padidėjusi glevių sekrecija, jei sutrikusi inkstu veikla arba sergančių sunkių kepenų liga, buvus, pepsimeti opai arba nustasičius fruktosez netoleravimą, taip pat sergantiesiems cukrinium diabetu (varjotant sirupą). Jeigu pasireiškė odos išbėrimai (iskaitant glevių, puz., burnos, gerkių, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), „Brontex“ varjotima reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Reklamos tekstas parengimo data: 2021 08 02. ISGYDYS NUO KOSULIO VISĄ ŠEIMĄ!



3,29 €

## BRONTEX

30 mg tabletės, N20

### NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 30 mg ambrosksolio hidrochlorido. Indikacijos: kvėpavimo taku sekreto skystinės ligoniams, sergantiems čiūme arba lėtinė bronchijų ar plaučių liga, kurios metu sutinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Dozavimas ir varjotimo metodas: 6–12 m. vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg ambrosksolio (1 tabletė). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstu veiklos nepakankamumu, doze reikiu mažinti ir (arba) varoti rečiu. Ambrosksolio nepatariama varoti ligai kaip 4–5 paras. **Kontraindikacijos.** „Brontex“ negalima varoti, jei reikia laikytis, jei sutrikusi bronchių motorika ir padidėjusi glevių sekrecija, jei sutrikusi inkstu veikla arba sergančių sunkių kepenų liga, buvus, pepsimeti opai arba nustasičius fruktosez netoleravimą, taip pat sergantiesiems cukrinium diabetu (varjotant sirupą). Jeigu pasireiškė odos išbėrimai (iskaitant glevių, puz., burnos, gerkių, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), „Brontex“ varjotima reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Reklamos tekstas parengimo data: 2021 08 02. ISGYDYS NUO KOSULIO VISĄ ŠEIMĄ!

# Virškinimo sistemai

a.  
Apotheka



4,69 €

## ESPUMISAN

EASY, 125 mg granulės, N14

### MEDICINOS PRIEMONĖ

Espumisan® Easy yra naudojant šiuolaikines technologijas pagamintos granulės, kurių sudėtyje yra putojimą slopinančios medžiagos simetikono.

Naudojamas mažinti pilvo pūtimą, atsiradusį dėl duju susikaupimo, bei tempimo pojūti pilve, pilvo išsiplūtimą, spaudimą viršutinę pilvo dalyje ir gurgulinius skrandžius bei žarnyje.

Espumisan® Easy gretai ištrūpsta burnoje, todėl aktyviųjų medžiagų greitai pasieka virškinimo trakta, kur pradeda veikti. Espumisan® Easy taikomas atskiruose paketeliuose, kuriuos galima nešioti su savimi ir vartoti pajutus nemalonius pilvo pūtimą ir kitus su duju susikaupimu susijusius simptomus. Granulių nereliai užgerti vandeniu, jos yra malonaus citrinų skonio.



-20%

## SMECTAGO

3 g paketėliai, N12

### MEDICINOS PRIEMONĖ

SmectaGo® yra medicinios priemonė – paruošta vartoti per burną suspensija, kuri tiekama atskiru dozu paketeliuose.

SmectaGo® yra skirtas:

- Suaugusiuji ir vyresnių kaip 8 metų vaikui viršinimo viduravimo gydymui. Vaikams viršinimo viduravimo gydymas turi būti derinamas kartu su geniuojančiu rehidrataciniu tirpalu, siekiant išvengti dehidratacijos.

Parengimo data: 2024.01. SCGO-LT-2024-0003



-15%

## MELILAX

PEDIATRIC 5 g mikrokлизma, N6  
ADULT 10 g mikrokлизma, N6

### MEDICINOS PRIEMONĖS

Skatina tuštintinasi bei dirginimo, saugo bei raminia tiesiosios žarnos gleivine.

Mellilax Pediatric mikrokлизma – kūdikiams ir vaikams. Kūdikiams nuo 0 metų amžiaus. Mellilax Adult mikrokлизma – suaugusiesiems ir pasaigiams nuo 12 metų amžiaus. Priemonė taip pat galima vartoti nėštumo ir žindymo metu.

Mellilax skatina tuštintinasi ir sumažina vidurų užkitejimo sukeliama diskomfortą, dirginimą bei uždegimą. Skiriamą net jei pacientui taip pat pasireiškia viscerinės hiperauterumas, jis turi iplėšti arba serga hemoroziniu.

Gamintojas: Aboca S.p.A. Società Agricola, Italija.



-25%

## COMPLIFLORA žarnyno mikroflora

### MAISTO PAPILDAS

„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family+“ – formule „keturi vienam“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonių, ir storaiž žarnyno. Didelė KSV (kolonijos sudaranciu vienetu) dozė. **Ypatiųjų gamybos metodas:** bakterijos atspalios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. **Vartojimas:** 1 kapsulė arba 1 paketelis per dieną.

„Compliflora Family“ – formule „keturi vienam“, Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 5301 kompleksas alyjein formą. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, reikia specifaliai laikymo salygų. **Vartojimas:** Kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai per dieną.

„Compliflora Family+“ – formule „keturi vienam“, yra sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai.

„Compliflora Feminina“ – formule „keturi vienam“, yra sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai.

„Compliflora Immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaipti gera imuninę organizmo būklę. Vienoje kapsuleje yra 4 milijardai mikrokapsulių pieno rūgštis bakterijų, cinko bei vitamino D. **Vartojimas:** 1 kapsulė per dieną.



nuo  
3,09 €

## ESPUMISAN

40 mg minkištosių kapsulės, N25 3,09 €  
40 mg minkištosių kapsulės, N50 4,89 €  
L, 40 mg/ml geriamojo emulsija, 30 ml 4,79 €

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklojei medžiaga: vienijo minkištose kapsulėse yra 40 mg simetikono. Indikacijos: ligų, kuriai metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams gydymui: prieš pilvo eritmės organų tyrimus, pr: rentgenu, ultragarasu.

Kontraindikacijos: Espumisan negalima vartoti esant padidėjusiui jautrumui veikliajai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms (saulečio geltonojam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms). Specialūs išpejimai. Duju senkaupiai gali atsirasti dėl rimtenių virškinimo trakto negalavimui. Ju požymiai gali būti: spaudimo ir pilnumo pojūtis, raugėjimas, žarnų gurgulavimas, pilvo pūtimas. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda irje trunka ilgiau, reikia pasiartti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. Dozavimas: kai dėl susilaikusio duju sutrikimo jautrumui traktui veikla: pasaigiams ir suaugusiesiems, bei 6–14 metų amžiaus vaikams rekomenduojame skirti vartoti po du Espumisan 40 mg minkištasių kapsulės 3–4 kartus per parą. Priesiekus 40 mg minkištasių kapsulės galima vartoti ligiau. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojame skirti po du Espumisan 40 mg minkištasių kapsulės 3 kartus per parą viena diena prieš tyrimus ir du Espumisan 40 mg minkištasių kapsulės tyrimo dienos rytą. Reklama paruošta 2021 m. lapkričio mėn. LT-Esp-11-2021-v1-pharma

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADEŠ ESPUMISANAS!



-40%

## GASTROVAL

kapsulės, N15

### MAISTO PAPILDAS

GASTROVAL® 4 fermentai augalų ekstraktai virškinimui palengvinti. Dažinės ciberžolių padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinių pažeidžių, padėja normalizuoti cholesterolio lygį kraujelyje. Tiksasis margainis padeda palaikyti normalią lastelių regeneraciją. Ožragų seklių ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę.

„GASTROVAL®“ SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.

Pasiūlymai fizinėse vaistinėse galojio su vaistinės lojalumo kortelėmis.  
Nurodytų vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems.



# Širdžiai ir kraujotakai

a.  
Apotheka



## Jūsų sklandžiai širdies veiklai

**-35%**

**9,29 €**

### NATASPIN

CONTROL PRO, kapsulės, N30  
H, kapsulės, N30

#### MAISTO PAPILDAI

Kraujotakai, kraujagysliams, cholesteroliu.  
**NatAspin® Control Pro** – pažangji kompleksinė priemonė cholesterolio kontrolei, kraujotakai, širdžiai ir kraujagysliams, kepenų veiklai. Sudėtyje yra platus poveikio augalinės kilmės derinys iš 2000 FV (fibroin vienetus) standartizuotos natokinazės fermento, monokaklinio K, polikoksonolo ir polifenolių (iš benzamininių citrinmedžių) dėlei. Dažnais ciberželės padeda palaikti normalią cholesterolio koncentraciją kraujelyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veikla, normalų kepenų lipidų kieki.

**NatAspin® H** – vienintelis Lietuvos valstybinė siūlomas standartizuotas natokinazės fermento ir hidroksitirozolo (iš alyvuogių) derinys kraujotakai. Skirtas tik mitbybių reguliuoti esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusių trombų susidarymo rizikai.

**NATASPIN® – PRADĒKITE DABAR, SU NATOKINAZĖS FERMENTU.**



**nuo  
10,99 €**

### TROXEVASIN

300 mg kietosios kapsulės, N50 **10,99 €**

300 mg kietosios kapsulės, N100 **15,29 €**

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikloji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje „Troxevasin®“ kietosioje kapsulėje yra 300 mg troksertinio. Indikacijos: lėtinio venu nepakančiamumo simptomus, pavysčiusių, kurių skausmo, sunarkino, patinimo lengvinymus. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Troxevasin®“ kapsulės – suaugusiesiems rekomenduojama 600 mg (2 kapsulės) parai tollygias intervalais. Gydoma kol išnyksta simptomai, kada nėra daugiau kaip 2 sav. Palaijomomo dozė - 1 kapsulė (300 mg) per para 2–4 sav. Maksimali paro dozė yra 1500 mg. Kapsulės reikia vartoti valgimo metu. Kontraindikacijos: padidėjus jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinėi medžiagai. Specialūs išpejimai: „Troxevasin®“ kapsulės atsargiai reikia vartoti pacientams, sergančiams kepernių ar tulžies pūsties veiklos sutrikimui. Šis vaistas neveiksminges, jei tiniusim skuklia kepernių, inkstu ar širdies-kraujagyslių sistemos ligos. Valkamis iki 18 metų „Troxevasin®“ vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie savegumus ir veiksmingumą nėra. Kapsulės negalima vartoti pacientams, kurieems nustatytas retas paveidimas sutrikimas – Lapp laktazės styglius arba glukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo ir žindymo metu „Troxevasin®“ kapsulės galima vartoti tik gydytoju priziūrint. Reklamos parengimo data: 2022 m. balandis. TROX-LT-00010

EIKITE IR ATRASKITE MALŠINKITE VENINĖS KRAUJOTAKOS NEPAKANKAMUMO SUKELTA KOJŲ SKAUSMA IR NENUSTOKITE TYRINĘ!



**nuo  
1,19 €**

### GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml **1,19 €**

geriamieji lašai (tirpalas), 80 ml **1,89 €**

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Širdžiai ir kraujagysliams. Veiklojos medžiagos, stiprumas: gudobelio vaisių tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų palaikymui. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrindas yra ligaliukų vartojimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: jeigu gydytojas nepaskyrė kitai, suaugusiesiems žmonėms reikia gerti praskriedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija eršketinių, sėlimo augalams. Specialūs išpejimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaista ligauja kaip keturias savaites simptomai išlieka, būtina pasistarti su gydytoju ar kvalifikuoju sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 65 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018 08 21.

GYDANTY VAISTĄZOLIU GAIJA!

Mėnesio TOP pasiūlymai galioja iki 2024 11 30.

### DOLOBENE

gelis, 50 g

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Dolobene gelis, 1 g gelio yra 100 mg heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfokido, 25 mg deksamptenolio. Indikacijos: Patinimo, hematomos ir uždegimo po bukos raumenų, sausgyslių, sausgyslių mašių, raiščių, sanarių traumos gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: Tepti gelį pažiešta vieta 1–2 kartus per parą. Neraudoti po oro nepraeidžiančiais tvarsčiai. Dolobene negalima tepti ant atvirų žaizdos, pažeistos odos ir glevinės. Kontraindikacijos: Padidėjus jautrumas veiklosioms arba bet kuriai pagalbinėi medžiagai; sergentiems raudonaja vilkligė; astma; jaunesniems kaip 5 metų vaikams; esant sunkiems inkstų ir/ar kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; negalima vartoti kartu su sulindaku. Specialūs išpejimai: Nepatariama tepti ant pažeistos odos ir glevinės. Reklamos teksto parengimo data: 2024 m. balandis. DLBN-LT-00001



**nuo  
5,19 €**

### TROXEVASIN

2 % gelis, 40 g **5,19 €**

2 % gelis, 100 g **9,29 €**

#### NERECEPTINIAI VAISTINIŲ PREPARATAI

Veikloji medžiaga, stiprumas: viename grame gelio yra 20 mg troksertinio. Indikacijos: lėtinio venu nepakančiamumo simptomus, pavysčiusių, kurių skausmo, sunarkino, patinimo lengvinymus. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeista vieta reikia patepti nedideliu gelio kiekliu ir svenčiai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas vislikai įsigers į oda. Kontraindikacijos: padidėjus jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinėi medžiagai. Specialūs išpejimai: „Troxevasin®“ gelio galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atviru žaizdu arba bet kuriai pagalbinėi medžiagai. Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. balandis. TROX-LT-00010

EIKITE IR ATRASKITE MALŠINKITE VENINĖS KRAUJOTAKOS NEPAKANKAMUMO SUKELTA KOJŲ SKAUSMA IR NENUSTOKITE TYRINĘ!



**1,49 €**

### ŠIRDIES DARBŲ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS

gerami lašai (tirpalas), 30 ml

#### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklojos medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelio vaisių tinktūra, sukatolių tinktūra. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrindas yra ligaliukų vartojimas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijos gerinti, ypač esant nervinei įtampli. Vartojimo būdas ir dozavimas: per buria. Preparata pries vartojimą reikia suplati, iš pradžios 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau doze sumaištini (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjus jautrumas būtina vierių iš sujedamųjų vaistų dalių, nėštumas. Specialūs išpejimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaista ligauja kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasistarti su gydytoju ar kvalifikuoju sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparatą slėgis plote atsiranda durianti skausmas arba labiau sutinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Teksto parengimo data: 2018-08-30.

Pasiūlymai fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems.

Apotheka

# Namų vaistinėlei



-30%

## OCUVAL

25 mg liuteino tabletės, N30  
STRONG 30 mg liuteino kapsulės, N30

### MAISTO PAPILDAI

Akims „Ocuval“ tabletės – akims naudingų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje net 25 mg liuteino ir beta karoteno, kuris reikalingas tinkamam regėjimui palaičių.

„Ocuval Strong“ – pagalbinė pagalba regėjimui: su didesniu kiekiumi liuteino (net 30 mg) ir Omega-3 riebalų rūgštuminių rinkinės, kai akims trūksta ryškumo, jaučiamas akinių nuovargis.

„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA!



4,99 €

## ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pūseliniu gydymu. Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acicloviro. Terapinės indikacijos: iokais odos ir lūpu pūselinius gydymus. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo reikia lepti 5 kartus per dieną, vidutiniškai kas 4 val.; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paros, jei per šį laikotarpį nepareipama, gydymas turi būti atnaujintas.

„Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniams kaip 12 m. vaikams. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniams kaip 12 m. vaikams, valaklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo pagalbinėi medžiagai. Specialūs išpejimai ir atsargumas: priemonės: „Aciclovir Actavis“ 5 % kremu nerekomenduojama tepli gleivinėms, p.vz., burmos, akių ar lūties organu, nes galiame sudringinimus. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti skės, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susitraukė (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir ivertinti gydymo geriamoju acicloviru galimybę. Pagabtinės medžiagos cetosteario alkoholis, natrio laurilsuflatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. Reklamos teksto parengimo data 2023-02-15. DCTL-LT-00047



nuo  
5,79 €

## GRIPEX THERMAL

300/20/5 mg mittelių geriamajam tirpalui, N12 6,39 €  
650/50/10 mg mittelių geriamajam tirpalui, N8 5,79 €  
1000/100/12,2 mg mittelių geriamajam tirpalui, N8 6,39 €  
1000/100/12,2 mg mittelių geriamajam tirpalui, N12 7,89 €

### NERECEPTINIAI VAISTINIŲ PREPARATAI

Peršaliniai ir gripe symptomams lengvinti: GRIPEX THERMAL. Veiklosios medžiagos, stiprumas: (1 paketelėje): „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalinimo ir gripe symptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams; 1 paketelis kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketeliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketeliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketeliai kas 4–6 val. Neprisireiškė su gydytoju, nevertokite išgausiai nei 12 m. vaikams. Nevertokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstai ar kepenų veikla sutrikusia ar nuolat vartojate alkoholi. Kontraindikacijos: alergija veiklosioms arba pagalbinėmis medžiagomis, taip pat vaistams, kurie sudėtyje yra simpatominės amirinės, sirdies plėvės kraujospūdis; glukozės-6-fosfato hidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstu nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaidymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorius vartojimas; arba rūkolių žindynas. Specialūs išpejimai ir atsargumas: pasikartėti su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstu nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija. Reino sindromu (rankų ar kojų piirstų, ausies kraštų ir nosies galuuko išstykimais, dažnai sukeliantis salčio arba emocijinių streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniai diabetu. Reklamos teksto parengimo data: 2022-11-15.

„GRIPEX THERMAL“. GALIU!



8,99 €

## DECATYLEN

0,25 mg/0,03 mg, kietosios pastilės, N40

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienėje pastilėje yra 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Indikacijos: burnos ir rykvių uždegimo (gingivito, opinio ir afirnio stomatito, faringito) vėlinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų pacifiliams kas 2 val. išėtai sučiupti po 1 pastile. Kai uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastile kas 4 val. Kontaindikacijos: padidėjęs jautrumas veiklai arba bet kuriai pagalbinėi medžiagai ar ketvirčiniams amonio dianiniams (pvz., benzalkoninio chloridui). Specialūs išpejimai ir atsargumas: Decatylene sudėtyje yra sorbitolas. Šis vaistinės preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Sorbitolas gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurinį laisvinantį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2023-02. DCTL-LT-00012



7,49 €

## JOX

burnos gleivinės, gerklų ir rykvių purškalas, 30 ml

### NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml purškuoje yra 85 mg joduto povidono ir 1 mg aiantinio. Indikacijos: lengvomis burnos ir rykvių infekciniams ligoms papildomai gydyti: bakterijų sukeliamą tonitilių papildomai gydyti su antibiotikais; burnos ermitės infekcija profilaktika ligoniams, kurieši atleikiamas ar rykvių operacijas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems negu 8 metų vaikams įrengta dozė yra 1–3 purškiamai į desingį ir kairių burnos ermitės puses arba tiesiai į pačiųsių 2–4 kartus, bet ne dažniau kaip 10 purškiamų per dieną. Kontraindikacijos: jeigu yra padidėjęs jautrumas dėl arba bet kuriai pagalbinėi „Jox“ medžiagai; jei nustatytas inkstų funkcijos ar dekompenzacijos sindromas; nėštumas ir žindynų laikotarpis; po tyrimo arba gydymo radioaktyviu yodu; esant sklydauskios funkcijos inkstų medžiagai; „Jox“ inkstų iščilio preparatu; Specialūs išpejimai: saugotis, kad vaistinės preparato nepatektų į akias. Esant kepenų funkcijos nepakankamumui; vartojant iščilio preparatą. Specialūs išpejimai: vartoti antsiagų. Vartoti drabuzinėmis, jei sutrikusi inkstų funkcijos „Jox“ sudėtyje yra 18,6 % etilo alkoholo. „Jox“ negalima vartoti ligiai kaip 2 dienas. Jeigu pasireiška jautrumas arba vėlinis dirginimas, „Jox“ vartojimą reikia nutraukti. Sengart laringitu, „Jox“ vartoti tik būtinu atveju. „Jox“ gali nudažyti gleivinę, dantis, odą ir drabuzius. Reklaminio teksto parengimo data 2020-08-03.



nuo  
4,69 €

## GRIPEX

325/30/10 mg, plėvele dengtos tabletės, N12 4,69 €  
325/30/10 mg, plėvele dengtos tabletės, N24 7,29 €

### NERECEPTINIAI VAISTINIŲ PREPARATAI

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrostometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršaliniai ar gripe symptomų (gávys, raumenų, gerklės skausmu, nosies gleivinės sekiromis) ir užtukimo, dirgiančio kosulio ir karsčiavimo) lenguvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įrengta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tabletės dozės. Per parą galima išserti ne daugiau kaip 8 tabletės. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai išių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaitės baigus juos vartoti. Specialūs išpejimai ir atsargumas: esant sutrikusiai kepenų funkcijs, sengart laringitu, „Gripex“ vartoti tik būtinu atveju. Jeigu per 3 dienas Jūsų saviųjau nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2022-10-11.

„GRIPEX“. GALIU!



nuo  
5,19 €

## SOPADEINE

EXPRESS 500 mg/65 mg šnypščiosios tabletės, N16 5,19 €  
500 mg/8 mg/30 mg tipinamiosios tabletės, N12 5,49 €

### NERECEPTINIAI VAISTINIŲ PREPARATAI

Terapinės indikacijos: lengvam ar vidutiniam sunkumui skausmui (pavyzdžiu, galvos skausmu, išskaitant migreną (su aura ir be jos), nugarsos skausmu, dantų skausmu, raumenų skausmu, dismenoreji, sekiromis, nehemolitinis, rykvių skausmu) ir karsčiavimui, gelūmams bei skausmuose, pasireikštamam sengart kepenų ligomis ir gripu, malinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: Nevertokite dažniau nei kai 4 valandas. Suaugusiems išskaitant sevių pacientus) ir 16 metų bei vyresnių paaugilių: 1 ar 2 tabletės išsprinkite bent puseje stiklinės vandens ir pagal poreikių vartokite kas 4–6 valandas. Neviršyk 8 dienų. Vartojimą išskaitinkite bent puseje stiklinės vandens ir pagal poreikių vartokite kas 4–6 valandas. Nevertokite daugiau kaip 4 tabletės (2000 mg paracetamolio / 260 mg kofeino) per 24 val. Specialūs išpejimai: sengart kepenų ar rykvių gydymui išskaitant kepenų skausmą, išskaitant migreną (su aura ir be jos), nugarsos skausmą, sekiromis, nehemolitinis, rykvių skausmu; sengart Zilberto sindromu (nehemolitinė Seimine gėla); gydytojus Jums buvo sakes yra salkes, kad netoleruojate arba angliavandenė, esant glukozės-6-fosfato hidrogenazės ar glutatono stokai ar glutationo stokai; sengart hemolitinė snemjimė, esant lėtiniam mitibos nepakankamumu ar dehydratacijai; esate suaugus ar paaugejus, kurių kūnų svoris mažėsnis nei 10 kg; esate vyresnis kaip 16 m. amžius; kontroliuojate savo kiekius maistui. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija paracetamoliui, kofeiniui arba bet kuriai pagalbinėi medžiagai; jeigu Jūs vartojate kitų vaistų, kurie sudėtyje yra paracetamolai. Reklamos teksto parengimo data: 2022-02-03.





**1+1**

Perkant pakuotę –  
antra tokia pati DOVANŲ!

## SENI LADY urologiniai įklotai moterims, atrinktos prekės

### HIGIENIOS PRIEMONĖS

- Ploni
  - Prailginti
  - Diskretūs
  - Siu klapo kontrolės sistema
- PROFESSIONALUS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI



**-40%**

## MEFLOVAN

FORTE kapsulės, N60

### MAISTO PAPILDAS

„Meflovan forte“ – triju augaliniu medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiamaus maksimalaus komforto ir geros savijautos meno-pauzės metu. Šio maisto papildo sudėtyje esantis raudonųjų dobilų ekstraktas padeda palaikti normalią būseną meno-pauzės metu. Sudėtyje taip pat yra dviečių naikinių ailejus ir sojų izoflavonai. Pakuočėje 2 menesius kursas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.



**-40%**

## PROSTOSAN

FORTE kapsulės, N30

### MAISTO PAPILDAS

„Prostosan forte“ – pagalba vyru prostatai. Sudėtyje esantys sabalpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pištų ekstraktas – normalią šlapimo pūšis funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energinių guma. Šio preparato sudėtyje taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.



**-40%**

## TOTALPOWER

MAN tabletės, N30

WOMAN tabletės, N30

### MAISTO PAPILDAI

„totalPOWER man“ – galingi multivitaminai aktyviams vyru su 23 aktyviomis medžiagomis. Jo sudėtyje esantis juodasis eleuterokokas padeda palaikti normalią proteinų veiklą ir energiją, magnis padeda palaikti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B<sub>6</sub> ir B<sub>12</sub> – palaikti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.

„total POWER woman“ – tai 24 puikiai tarpusavyje derančiu vitamininių kompleksas aktyvioms moterims, skirtas grožui, energijai bei gerai savijautai. Normalū kūno svori padeda palaikti gvaraninius paulinius, normaliai plauku ir nagų būklę – cinkas, vitaminas A, niascinas, kortikosteronai jausmas prieš menstruacijas ir jų metu – tikrųjų skaistinių ekstraktas. Papildytas kofermentu Q10. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną.



**-20%**

## TESTERA

FOB testas, N1  
Geležies stokos (fertinio) testas  
Helicobacter Pylori testas, N1  
Vitaminino D testas, N1

### MEDICINOS PRIEMONĖS

Testera FOB testas (slaptam kraujavimui aptiktai) – testas skirtas aptikti slaptam kraujavimui išmatose.  
Testera Geležies stokos (fertinio) testas – gretėjasis testas skirtas aptikti geležies (fertinio) stoką žmogaus organizme.  
Testera Helicobacter Pylori testas – testas skirtas aptikti Helicobacter Pylori bakteriją išmatose.  
Testera Vitaminino D testas – testas skirtas nustatyti vitaminino D koncentraciją žmogaus kraujelyje.



**-40%**

## POTENZINE

SUPERIOR tabletės, N30

### MAISTO PAPILDAS

„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papilio sudėtyje esantys ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikti lytinę funkciją, ištvermę ir energijumą. Normalū lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalią vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujelyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.



**-40%**

## TALIJA S

plėvele dengtos tabletės, N30

### MAISTO PAPILDAS

„Talija S“ – subalansuotas augaliniu medžiagų derinys, norintiems turėti grakštias kūno linijas. Šio maisto papilio sudėtyje esantys gvaraninių pauolinių ir kambodžinių garcinijų vaisių ekstraktai padeda palaikti normalią kūno svorį. Tikrųjų imbiu ūkienų ekstraktas padeda palaikti tonus, energijumą ir mažinti nuovargį, o chromas – palaikti normalią glikozės koncentraciją kraujelyje. Cholinas padeda palaikti normalią lipidų apykaitą. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną 30 min. priės valgį užgeriant stiklinę vandens.



**1+1**

Perkant pakuotę –  
antra tokia pati DOVANŲ!

## DIFOLIN

tabletės, N60

## DIFOLIN+

kapsulės, N30

### MAISTO PAPILDAI

„Difolin+“ – moters gerai savijautai: hemoglobinui, energijai, nervams, imunitetui. Mikrokapsuliota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B<sub>6</sub>, D<sub>3</sub>, C + varis. „Difolin+“ sudėtyje naudojama mikrokapsuliota liposomose geležis organizme efektyviai pasisavinama, neturi gamybinių elementų. Vitaminas B<sub>6</sub> padeda palaikti normalią raudonųjų kraujų kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobinio susidaryma, folatų elementai, nedirgina virškinimo trakto, neturi saivikos su maistu. Folio rūgštis, vitaminas B<sub>12</sub> – vieni būtiniausių kraujų gamybinių elementų, vitamina B<sub>6</sub> padeda palaikti normalią imuninės sistemės funkcijas, žinomiai žinduoliams moterims; folio rūgštis + vitaminas D<sub>3</sub>. Folio rūgštis padeda palaikti normalią kraujodara, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėštosišcos kraujų entrofūsuose yra besivystančio vaisiuis nerviniu vamzdžio defektu rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per para papildomai suvartojant 400 µg folio rūgštis ne trumpiai kai vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikti normalią imuninės sistemės veiklą, dalyvauja įstelčių daliųjimosi procese.

„DIFOLIN“ – MAISTO PAPILDAI MOTERIMS.



iki  
**-25%**

## COREGA

### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Reguliariai naudojant valomasis tabletėles „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka pilniems ir daliniams dantų protezams.  
 - Sunaikina 99,9 % biologų ląvaujų sukeliančių bakterijų.  
 - Podeis pašalinanti apsrašas ir giliai išgėrėja dantų.  
 - Suteikia dantų protezams galių metu kvaipą.  
 - Velkia per 3 minutes.

Fiksuojamieji kremai „Corega“ patikimai veikia iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams įstrigtį po protezais.

CHLT/CHPLD/0009/16. 2018/10

VALGYK, JUDKIS IR GYVENKI



**-25%**

## VITELLA

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Vitella Ictamo Forte“ pasta su baltuoju ixtoliu. Ši pasta ypač rekomenduojama esant padidėjusiui paraudimui ir niežėjimui. Ixtoliu tipu dermatitui, akni, rožinėl, palūnėjimo atvejais. Pagrindinės veiklosios medžiagos: oktopirokšas 0,5 %, baltasis ixtolis 3 %, dermasot decaletat 2 %, cinko oksidas. „Vitella Ictamo“ pasta su baltuoju ixtoliu. Ši pasta ypač rekomenduojama esant padidėjusiui paraudimui ir niežėjimui. Ixtoliu tipu dermatitui, akni, rožinėl, palūnėjimo atvejais. Rekomenduojama išgaluoti odos priekaičius. Produktas sudėtyje yra baltasis ixtolis, cinko oksidas. „Vitella Zn“ pasta ypač rekomenduojama išgaluoti odos priekaičius. Produktas sudėtyje yra cinko dextrins. Ypač rekomenduojama esant: ydutių bėrimais, žieminėmis atspalvių atsparumais, uždegimais, paraudimais. „Vitella Extreme“ kremas pradėkite naudoti sausose, atropinės odos priežiūrai jeigu odas yra dažniai veikiamo ekstremaluo salyga, pavysdžiu, sėklin, ar eis causo or arba ixtoliu valymo priemonėmis. „Vitella Extreme“ galia naudoti nuo gimbimo, tinka ligtakamai naudoti. „Vitella Extreme“ kremo sudėtyje nėra vandens, jis yra labai riebus, todėl ypač tinkla apsaugosi nuo žvarbus ir šalto oro. „Vitella Versi“ skirtas prūtinėti odas esant išvainiavaleivies dederivinėi. Vitella Versi godo sudėtyje esantis baltasis ixtolis ir oktopirokšas kartu su kitomis sudėtinėmis medžiagomis, tinka esant išvairiausiai vartoti ixtoliu ir oktopirokšas kompleksas kartu su kitomis sudėtinėmis medžiagomis, tinka esant išvairiausiai vartoti ixtoliu arba rožinės dederivinės (Tinea versicolor). Pityrasis versicolor) simptomams mažinti bei odos problemoms, kurios susijusios su niežėjimu, pvz.: seborejai ar atopija (atropinė odas). Produktas dermatologiskai patirkintas. „Vitella Ictogel“ tanka kasdienei į skre linksmiosios odos priežiūrai. Gal padėti sumazinti riebalų sekreciją, nesausinė odos PH 5,5. „Vitella Ictogel“ yra skirtas paagūžiamų ir susaugusiemų, kurie susiduria su ixtoliu akmenų formomis. „Vitella U“ losinės tinka vaikui ir susaugusiai odai, kai odas yra išsaukėjusi ir paraudusi, plėskančia, niežta. „Vitella U“ sudėtyje yra šlapalo, panterolio, vitamino A, E ir alkyngų aliejus.



iki  
**-25%**

## SUNSTAR GUM

### BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra burnos ertrinės higienos priemonių gamybos lyderė. „Sunstar Gum“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei dantenos, naudojant priemones, kurios remiantis naujausiais išradimais ir klinikinių tyrimų rezultatais. Priemones sukurto, siekiant užkirsti keliai ne tik ligų simptomams, bet ir ju priežastims!

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.



**-30%**

## SUDOCREM

### MEDICINOS PRIEMONĖS

Sudocrem® Multi-Expert® skirtas ixtoliu iššutimui ir vystyklių bėrimui ir profilaktikai. Tinka kūdikiui ir susaugusiuoju odos priežiūrai. Dėka subalansuotu sudėties, kremas švelnai gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinis gerai sugeria dregmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos dregmę ir nepaliekia riebalų slūksnio odos paviršiui kaip kitų kosmetinių kremų nuo iššutimų. Tepti plonu sluošku.



iki  
**-25%**

## MYCOSAN

5 ml + 10 dildžių

XL 10 ml + 10 dildžių

priešgybelinis pėdų gelis, 15 ml

PROTECT priešgybelinis pėdų purškalas, 80 ml



**-30%**

### MEDICINOS PRIEMONĖS

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinių infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo ju. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų nagų grybeliui. Serumas prasiskverbias į nagą ir pagerina jo struktūrą, todėl nagas atauga sveikas. Pažeistose vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebėgali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydyti praeiti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis nuo grybelių skirtas „atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėdai“ yra grybelių sukurta pėdos odos infekcija, kuria reikia gydyti, kad ji neišplisti.



iki  
**-15%**

## EUCERIN

ATOPIC CONTROL rankų kremas, 75 ml

ATOPIC CONTROL balzamas, 400 ml

ATOPIC CONTROL valomasis aliejus, 400 ml

## BELLA

### HIGIENOS PRIEMONĖS

BELLA higieniniai paketai ir kasdieniniai iklotai – ploni, diskretiški, daug sugeriantys, laidūs orui ir su kvapo kontrolės sistema. Vatos gaminių – iš 100 % medvilnės.

PATIKIMA IR ŠVELNI APSAUGA!

Pasiūlymai fizinėse vaistinėse galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems.

# Jūsų grožiui



-20%

## BEPANTHEN®

SENSICONTROL prausimosi gelis, 400 ml  
SENSICONTROL kremas, 200 ml

### MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Bepanthen SensiControl® prausimosi gelis, 400 ml. Kosmetikos priemonė. Kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaile prie jūsų odos PH bei apsaugo natūraliu odos barjeru ir mikrobiomu. Sudėtyje yra provitaminu B<sub>6</sub>, ir prebiotiku. Tinka visai šeimai.

Bepanthen SensiControl® kremas, 200 ml. Kosmetikos priemonė. Kremas skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Unikalų kliniku patirkintu „Dermo-Defense“ formulėje praturinti prebiotikų suteikia kasdiene odos apsauga; palaido odos apsaugine mikroforfa, stiprina odos barjerinę funkciją, užtinkina ligalaikį, iki 24 val. trukanti, drėkinimą ir nuramina sausa, niežtinčia odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūnui, veidui ir akinių vokams. Tinka visai šeimai. CH-20231129-85

BEPANTHEN® PRODUKTŲ LINIJA | EGZEMA, LINKUSIOS ODOS SVEIKATAI



-40%

## HAIR CARE PANDA

### MAISTO PAPILDAI

Maisto papildai skaniuoja guminukinio formoje Tavo plaukų grožiui, šeimos sveikatai, miegai, grožiui.  
HAIR CARE PANDA – TAVO SVEIKATAI IR GROŽIUI.

\* Šampūnų kiekis ribotas



iki -25%

## EUCERIN

AQUAPHOR, pH5, UREAREPAIR PLUS atrinktos prekės

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Individualiems odos poreikiams pritaikytais kūno odos priežiūros priemonėmis visai šeimai iš Eucerin®. Eucerin® Aquaphor priemonės atskira labai sausa, sutrūkinėjusi, sudrigusia odą. Eucerin® UreaRepair priemonės su slapalu aklimirinu nuramina nemalonius sausos ir itin sausos odos pojūčius. Eucerin® pH5 puoseleja jautria ir sausa odą.



iki -30%

## HELEN SEWARD SYNEBI

atrinktos prekės

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

HELEN SEWARD – nauji plauku grožio priežiūros sprendimai prasideda pačioje Viduržemio jūros širdyje. Ingredientai, gauti iš sertifikuoto ekologinio ūkio tampa dar veiksmingesni. Organiniai aliejai sustiprina kosmetinį poveikį plaukų pluoštui ir suteikia naujuojai. Kiekvienas HELEN SEWARD produktas yra sinergiškas, pažangų technologijų, tradicijų ir inovacijų. HELEN SEWARD specializuojasi novatoriškoje plauku priežiūros priemonėse profesionalams ir kasdieniam naudojimui namuose.



-25%

## MEDIKET

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Mediket Ictamo“ rekomenduojama naudoti esant ivairių tipų dermatitams, psoriazei, niežuliui, odos sudirgimams, sebumo gamybos atstumui. Prausimosi putos tinka visiems odos tipams. „Mediket Versi“ prausimosi gelis skirtas naudoti esant ivairių aplavčių dederinės požymiams (Tinea Versicolor) ar voko šeberėjai. „Mediket Plus“ šampūnas yra rekomenduojamas esant gausiam galvos odos pleiskanomajui, niežuliui mažinti, esant atopinės egzemos požymiais, per dideliam ribeilių išsiskyrimui galvos odose. Patirkintas dermatologas. „Mediket Prevent“ šampūnas naudotai, kai pleiskanomajai yra redidelis, sezoniškas, pvt., saltuojančios metu laiku. Taip pat šampūnas rekomenduojamas naudoti pleiskanomai profilaktikai, atopinėi egzemai, „Mediket Ictamo“ šampūnas, skirtas esant seborėjiniam dermatitui, psoriazei, galvos odos folikulitu, atopinėi egzemai, stipriam niežuliui slopiinti. Šampūnas gali padėti sumažinti ribeilių sekrecijos išsiskyrimą ir sumažinti pleiskanų atsridėmą.



-20%

## EMBRYOLISSE

### KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Embryolisse – tai Prancūzijos dermatologų sukurtos odos priežiūros priemonės, pukais tinkančios visai šeimai. Daugiafunkcinių odos priežiūros priemonė Lait-Crème Concentré (75 ml) veikla net 6 skirtinių būdais: dieninis ar naktinis kremas, makiazio pagrindas, drėkinamoji kaukė, kremas po saulės, makiazio valiklis ar net kremas po skutimosi. Lait-Crème Fluid (500 ml) – tai skystesnis Lait Crème Concentré variantas. Dėl savo minimalios ir švarios sudetės, šis losjonas tinka visų tipų odai, visai šeimai. Lait-Crème Multi-Protection (40 ml) – šis daugiafunkcis kremas suteikia nuolatinį drėkinimą ir apsaugo odą. Tai taršos skydas bei odos senėjimo prevencija. Intense Moisturizing Mask (50 ml) – intensyviai drėkinantį kaukė-gelį su hialuronu rūgtimi, padedantis atkurti drėgmės netekusią odą.

# Lojalūs klientai – gerose rankose!

## LOJALIEMS KLIENTAMS

-3%

VISOMS nereceptinėms prekėms

-15%

Kosmetikai

-10%

Maisto papildams

-5%

Nereceptiniams vaistams

-10%

Med. prekėms ir įrangai



Lojalumo kortelė

Lojalumo programa. Posūkiniams taikomas perkant pilnus pakuočius. Nuolaidos nesusekiama kitų akcijų prekėms bei pagal kompensuojamąjį receptą įsigijamomis prekėmis, skiepijimo paslaugomis, dovanų kuponais, išstatomuose, iš kurio yra nurodyti, nuolaidos nesumuoja. „Apotheka vaistinė“ turi teisę nešieksti specialius posūkius bei akcijas, kurių metu būtų taikomas didesnis, nei šiame punkte nurodytas, nuolaidos. Daugiau informacijos telefonu +370 682 82 144 arba elektroniniu paštu info@apotheka.lt arba teisėsaugos vaistininkui. Lojalumo programos taliskės ir privatumo politika rasite [www.apotheka.lt](http://www.apotheka.lt).