



Mėnesio pasiūlymai

BIOFARMACIJA atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Maisto papildai mineralais. Maksimalus magnio kiekis – 500 mg magnio citrato. Natūralios kilmės magnis iš Negyvosios Jūros padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų sistemų funkciją, padeda mažinti nuovargį ir išsekimą, palaikyti normalią energijos apykaitą bei gerą miego kokybę. Diosmino ir hesperidino kompleksas padidytas mineralų, vitaminų, kolageno ir 4 augalų ekstraktais – kojų nuovargiui mažinti, kojų venoms stiprinti, hemorojui ir normaliai venų mikrocirkuliacijai. Natūralios sudėties obuolių sūrio acto mišinys, inulinų skaidulų, kinino arbatmedžio ekstrakto kompleksas – medžiagų apykaitai ir svorio kontrolei, riebiųjų deginimui, normaliam cukraus kiekiui kraujyje palaikyti, magnio citrato – geriamasis tirpalas su vitaminu B₆ – normaliai energijos apykaitai, nervų sistemos veiklai, pavargimo jausmui bei nuovargiui mažinti.
BIOFARMACIJA MAISTO PAPILDAI – TIEMS, KURIEMS RŪPI KĄ VARTOJAI!

ISDIN atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
ISDIN – tai pasaulinė fotoapsaugos lyderė, siūlanti platų apsauginių priemonių nuo saulės asortimentą visai šeimai. Novatoriškų tekstūrų, puikiai odos toleruojamos priemonės užtikrina aukštą apsaugą nuo saulės ir malonią naudojimo patirtį.

NO-SPA
40 mg tabletės, N24 **5,99 €**
40 mg plėvele dengtos tabletės, N24 **6,48 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Drotaverino hidrochloridas. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje ir plėvele dengtoje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvilykapiaršties žarnos spenelio uždegimas), šalinimui, inkstų ir (arba) šlapimtakio akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukkelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimui, mėšlungiško nuro šlapintis slopinimui. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvilykapiaršties žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3–6 tabletės. **Kontraindikacijos:** alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. **Teksto parengimo data:** 2025 m. birželio mėn. 2506_SB_No-Spa_V01_LT
PILVO SKAUSMAS? GYDYKITE JĮ TINKAMAI SU „NO-SPA“.

DICLAC
50 mg/g gelis 50 g, N1 **5,99 €**
5 % gelis, 150 g, N1 **14,95 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g Diclac 5 % gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. **Terapinės indikacijos:** lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ploną Diclac 5 % gelio sluoksnį tepti 2 k/d. **Kontraindikacijos:** jautrumas diklofenakui ar pagalbinėms medžiagoms, jaunesni kaip 14 m. vaikai, 3 paskutiniai nėštumo mėnesiai. **Specialūs įspėjimai:** negalima tepti burnos, nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 263 6037. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069663. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 06. STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

Verta rinktis!

VIRŠKINIMUI



nuo
3,47 €

MEZYM

10 000 V, skrandyje neiros tabletės, N10 **3,47 €**
20 000 V, skrandyje neiros tabletės, N20 **7,49 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

MEZYM 10000V, MEZYM 20000V skrandyje neiros tabletės. Nereceptinis vaistas. Vienoje skrandyje neiroje Mezym 10000V tabletėje yra 80 mg 111,11 mg kiaušinių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip: 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Vienoje skrandyje neiroje Mezym 20000V tabletėje yra 160 mg 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaušinių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. **Mezym vartoti negalima:** jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušies (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepažeidimą. Esant simptomams, panašiams į žarnyno nepažeidimo požymius, reikia apsvaistyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neįprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusiskundimų pobūdis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės tikslu atsekti žarnų pažeidimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sąsė, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. **Dozavimas:** MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nurodyta, vaigant išgeriamos 2-4 plėvele dengtos MEZYM 10000V tabletės arba 1-2 plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimų sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nuryjamos nekrmant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmė nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas.

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasiensko g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com
LT-MEZ-3-2025_MFLOW_2025/12

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*
*Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų

NERVŲ SISTEMAI



6,75 €

NEURORUBINE FORTE LACTAB plėvele dengtos tabletės, N20

NERECEPTINIS VAISTAS**

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiarmino nitrato (vitamino B₁), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B₆), 1 mg cianokobalaminu (vitamino B₁₂). **Indikacijos:** Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1–2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti Neurorubine Forte Lactab, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaičių būklė turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepažeidžia, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Vaikų populiacija. Saugumas ir veiksningumas vaikams dar neištirtas, todėl neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija vitaminams B₁, B₆ ar B₁₂ arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B₆ dozė gali silpninti L-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B₆ gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojama izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami tiarmino antagonistais, gali trikdyti vitamino B₆ poveikį. Kartu su Neurorubine Forte Lactab vartojant vaistus, surišiančius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B₆ pasisavinimas. Teksto peržiūros data. 2024 02 01. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 m. sausis. NEUR-LT-00012

ODOS PAŽEIDIMAMS



5,89 €

BEPANTHEN

50 mg + 5 mg/g kremas 30 g, N1
50 mg/g tepalas 30 g, N1
Plus 50 mg + 5mg/g kremas 30 g, N1

NERECEPTINIS VAISTAS**

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g 1 g preparato yra 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išbėrimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikaliui esant. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kruopščiai nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-10 CH-20241030-71. Bepanthen Plus 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz. nubrozdinimų, įpjūimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalyti žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; giliai arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkšaus ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-10 CH-20241030-71

KRAUJOTAKAI



16,23 €

HESIO 900 mg plėvele dengtos tabletės, N30

NERECEPTINIS VAISTAS**

Hesio 1 000 mg plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje tabletėje yra 1 000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmino ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** Hesio skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Hemorojaus paūmėjimas. Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės per parą (1 tabletė tris kartus per parą arba 1 tabletė pirmą kartą ir 2 tabletės antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tabletė du kartus per parą (2 tabletės). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** Hesio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams Hesio vartoti nerekomenduojama. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepažeidžia ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 m. gegužė mėn. ID: 000853595

KEPENŲ VEIKLAI



13,88 €

LIVOSIL 140 mg kietosios kapsulės, N60

NERECEPTINIS VAISTAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekrantyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. **Reklamos teksto parengimo data:** 2017-07-12.

NERVŲ SISTEMAI



nuo
8,99 €

MAGNE B6

470 mg/5 mg dengtos tabletės, N60 **8,99 €**
geriamasis tirpalas ampulėse, N10 x 10 ml **10,59 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

Esant magnio trūkumui MAGNE B₆. **Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B₆); Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** MAGNE B₆ skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūnos svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištrinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgių. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgių. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B₆ medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. **Specialūs įspėjimai:** nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B₆ dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B₆ geriamoji tirpalas negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B₆ preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B₆, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-08. 2605_SB_Magne_B6_V01_LT MAGNE B₆ PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ




-35%

BERTIL'S

varis 2 mg CU tabletės, N100
hemoglobiini kraujodarai tabletės, N60

MAISTO PAPILDAI*

Bertil's – aukščiausios kokybės chelatiniai maisto papildai, pagaminti Suomijoje. Tai efektyviai pasisavinamos, koncentruotos mono medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį. Jų išskirtinumas – aminorūgščių chelatai. Unikalaus gamybos proceso dėka, naudojantis patentuota technologija, sukuriama aminorūgščių organinė molekulė – mineralų ir dviejų aminorūgščių kompleksas – chelatas. Tradicinių papildų įprasta mineralinė druska ištirpsta skrandyje, mineralas tampa jelektrintu jonu, kurio pasisavinimą gali blokuoti įvairūs maisto produktai (kava, pienas) bei kiti mineralai. Chelatiniai maisto papildai yra elektriskai neutralūs, jų mineralas nereaguoja su maistinėmis medžiagomis, nėra suardomas skrandžio rūgščių ir patekęs į žarnyną yra toliau efektyviai pasisavinamas. Nedirgina skrandžio. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.




-35%

PROVISOR geležis 28 mg + vitaminas C kapsulės, N60

MAISTO PAPILDAI*

Daugiau energijos – laimingesni Jūs!
PROVISOR maisto papildai, tai – geriausios ir išskirtinės sudėties, maksimaliai pasisavinamos formos.
ATRASKITE SAU TINKANTĮ PRODUKTĄ!




-30%

ECOSH bioaktyvus selenas, l-selenometioninas 150 µg kapsulės, N90

MAISTO PAPILDAI*

Ecosh – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškesnius ir efektyvesnius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami veganams.



iki **-40%**

SMARTHIT IV atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*

„Miosol“ technologijos dėka pagaminami produktai, kurie pasisavinami itin gerai. Be to, mikrokapsulės sumažina šalutinių poveikių riziką. Efektyvus pasisavinimo maisto papildų SMARTHIT IV® linija sudaro:
SMARTHIT IV® Curcumin – mikrokapsuluota kurkumino forma imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti.
SMARTHIT IV® Polifen – polifenolių šaltinis gerai savijautai.
SMARTHIT IV® Ferrum kapsulės arba **SMARTHIT IV® Ferrum Liquid** skysta geležies forma, tinkanti suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų. Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
SMARTHIT IV® Ferrum Strong – tai išmanus ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulės – 40 mg mikrokapsuluotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu.
SMARTHIT IV® – MENAS VEIKTI!



1+1


Perkant pakuotę -
antra tokia pati
DOVANŲ!

FORMULA VITALE

kalcio citratas + K₂+vitaminas D₃ BONES+ tabletės, N60
geležis 25 mg FERRUM+ tabletės, N30
magnis 400+ milteliai, N20

MAISTO PAPILDAI*

„Formula Vitale“ biologškai aktyvių medžiagų deriniai, kuriuose yra būtinų vitaminų, mineralų ir augalinių veikliųjų medžiagų, kurių kasdien reikia mūsų organizmui. Be gliitimo, be laktozės, be GMO. Tinka veganams!




1+1

Perkant pakuotę -
antra tokia pati
DOVANŲ!

BIOFARMACIJA bioMagnis 300 + bioKalis 300 mg, N60

MAISTO PAPILDAI*

Perkamiasius magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metai iš eilės (pagal UAB „Sofdent“ duomenis)! 1 pakelyje – net 300 mg magnio ir 300 mg kalio citrato. Magnis ir kalis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Be konservantų, be stabilizatorių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros.



-35%

KALCIKINON LIQUID skystas kalcis su vitaminais D₃, K₂, 150 ml
KALCIKINON + kalcis su vitaminais K₂ ir D₃, kapsulės, N60

MAISTO PAPILDAI*

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio, vitaminų D₃, K₂, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D₃, K₂, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D₃ – normalią kalcio, fosforo absorbciją, įsisavinimą, Kalcikilon Liquid – skystas kalcis su vitaminais D₃, K₂, fosforu papildo mitybą kaulams ir dantims reikalingomis medžiagomis. Skysta mikronizuota kalcio forma užtikrina geresnį, greitesnį kalcio įsisavinimą. Kalcikilon Liquid yra švelnus persikų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi kreidos skonio, nepalieka poskonio. Patiks tiek vaikams nuo 3 metų, tiek suaugusiems. Kalcikilon Liquid paprasta ir lengva vartoti – vaikams tik 1 arb., suaugusiems – 2. Kalcikilon+ kapsulės – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kurioje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims: optimalus kalcio bei didesnis vitamino D₃ kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K₂.
„KALCIKINON“ YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!



Pasiūlymai galioja 2026 06 01–2026 06 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fiziniame vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija "1+1" taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.

-20%

4,02 €

BEN'S apsaugai nuo erkių, uodų ir kitų vabzdžių įkandimų

BIOCIDAI
 BEN'S repelentai tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams nuo 3 metų amžiaus. Efektyviai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų. BEN'S MAX purškiamas skystis, 37 ml – didelės DEET koncentracijos (50 %) repelentas. BEN'S karščių išbandytas ekstremaliomis sąlygomis visame pasaulyje. Produktas efektyvus apsaugoti nuo erkių, uodų, atogrąžų uodų ir kitų kraują siurbiančių vabzdžių. BEN'S 30, 100 ml – 30 % koncentracijos DEET repelentas. Tinka visai šeimai.
 BEN'S SU CITRINKVAPIŲ EUKALIPTŲ ALIEJUMI, 100 ml – tinka visai šeimai, net ir tiems šeimoms nariams, kurių oda ypač jautri. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

BILASTINE STADA 20 mg tabletės, N10

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg bilastino. **Indikacijos:** vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra žiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginės slogos formų simptomams palengvinti. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūklių arba dilgėlinės) gydymui. Skirtas suaugusiems ir 12 metų bei vyresniems pasaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Tablečių reikia nuryti nevalgius. 1 valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą arba praėjus 2 valandoms po valgyto arba sulčių gėrimo. Nuryti tablečių užsigeriant stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti esant vidutinio sunkumo arba sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui. Kartu su bilastinu reikia vengti vartoti kitų vaistų (pvz., ketokonazolo, entromicino, diliazemo, ciklosporino, ritonaviro, rifampicino). **Reklamos teksto parengimo data:** 2024-12-15. 2603_SB_Bilastine_V01_LT
 PALENGVINKITE ALERGIJĄ IR MEGAUKITĖS GYVENIMU!

4,84 €

5,73 €

FENISTIL 1 mg/g gels, 30 g

NERECEPTINIS VAISTAS**
 Dimetindeno maleatas. **Indikacijos:** Niežulio, susijusio su odos išbėrimu, dilgėline, vabzdžių įkandimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu paviršinių odos nudegimų, trumpalaikis malšinimas. **Vartojimas:** Pažeistą odą plauti 2–4 k./dieną. **Kontraindikacijos:** Alergija dimetindeno maleatui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** Jei niežulys labai sunkus arba oda labai pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Jei geliu tepamas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikams ir vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, geliu tepėti draudžiama. Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir benzalkonio chlorido. **Teksto parengimo data:** 2025/02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

PSILO-BALSAM 1 % gels, 20 g

NERECEPTINIS VAISTAS**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg difenhidramino hidrochlorido. Pagalbinės medžiagos yra cetipiridino chloridas, makrogolio 6 glicerolio kaprilokapratas, poliakrilato rūgštis, trometamolis, išgrynintas vanduo. **Terapinės indikacijos:** PSILO-BALSAM yra lokalaus poveikio vaistas nuo alergijos. PSILO-BALSAM vartojamas niežėjimo ir skausmo malšinimui esant pirmojo laipsnio terminiam nudegimui ir nudegimui saulės spinduliais; vabzdžių įgėlimams ar įkandimams, dilgėlinei ar kitokiems nedideliams odos pažeidimams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams PSILO-BALSAM reikia tepėti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai trinti nuo 3 iki 6 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jūsų jautrumas cetipiridino chloridui yra padidėjęs, PSILO-BALSAM vartoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** PSILO-BALSAM 1 % gelio negalima tepėti ant atvirų žaizdų ar gleivinių, nes dėl didesnės defenhidramino absorbcijos, gali pasireikšti sisteminis jo poveikis; vengti patekimo į akis; jei patepus gelio ėmė peršėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. PSILO-BALSAM 1 % gelio negalima vartoti paskutinių nėštumo savaitių metu, kadangi yra galimi gimdos funkcijos sutrikimai. Žindančioms moterims vaisto vartoti nerekomenduojama. **Teksto parengimo data:** 2026-03. 2603_Psilo-balsam_V01_LT
 ĮKANDIMAI, NUDEGIMAI, NIEŽULYS? NEKASKYKITE – NURAMINKITE!

-15%

nuo 6,99 €

MOUSTICARE

daugkartinė apyrankė, N1
 50 ml purškalas (veikia iki 4 val.)
 75 ml purškalas (veikia iki 8 val.)
 125 ml purškalas su alijošiumi (veikia iki 6 val.)

INOVOX

MENTHOL 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės, N2 **6,99 €**
 HONEY LEMON 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės, N24 **7,49 €**
 ORANGE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg kietosios pastilės, N24 **7,49 €**

PREIMONĖS NUO VABDŽIŲ

Nugulėkite uodus ir erkes su „MoustiCare“ iš Prancūzijos! Tinka visai šeimai: vaikams, nėščioms moterims, suaugusiems. Efektyvus prieš uodus, erkes ir kitus geliančius vabzdžius. Sudėtyje 100 % augalinės veikliosios medžiagos. „MoustiCare“ naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
 „MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMINIUS REPELENTUS!

NERECEPTINIS VAISTAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. **Indikacijos:** gerklių skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklių ir burnos ertmės uždegimo būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** po 1 kietąją pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmių burnos ir gerklių žaizdų, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022-06-09. „INOVOX“ - EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

nuo 4,47 €

nuo 2,09 €

IBUSTAR VAIKAMS

20 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml + geriamasis švirkštas **4,47 €**
 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 100 ml + geriamasis švirkštas **7,49 €**

APAP

500 mg plėvele dengtos tabletės, N12 **2,09 €**
 express 500 mg minkštųjų kapsulių, N10 **2,56 €**
 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, N10 **5,63 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

Karščiavimo malšinimui ir skausmo malšinimui
 Nereceptinis vaistas. Ibustar 20 mg/ml, 40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams. Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40 mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasiūlymintis karščiavimo malšinamoms savybėms. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, svėriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (iki 9 metų), Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams svėriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), pasaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir pasaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtykite. Ibustar vartoti negalima jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetasalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra nesėkmingas kraujo daros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakūrimas, sutijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitokios kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daugiau skydžių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Švelnus poveikis gali sumažinti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtina simptomų kontrolė. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas plėve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slopinti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali veiktinai tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidinti komplikacijų riziką. Jei vartojate šį vaistą ilgą laiką infekcinė liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėžraupiais reikia vengti vartoti Ibustar.
 LT_ibu_01_2024_V1_print UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
 Jaisinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com **Reikiama paruošta** 2024 m. rugpjūčio mėn.
 GREIT IR VĖL KARALIAUS!

NERECEPTINIS VAISTAS**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP 250 mg“, vaikams“ yra 250 mg paracetamolio. **Indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Apap express, 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiems ir pasaugliams, svėriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė – 3 000 mg) kas 24 valandas. „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg, vaikams“ granuliuose paketėliuose vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granulės supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgerus vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamolui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** Prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaitinantems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpis; yra hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistiniais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Teksto parengimo data:** 2025-03-31.



-10%

DR.OHHIRA® DELUXE

probiotikai, kapsulės, N30 / N60

MAISTO PAPILDAI*

Dr.OHHIRA® DELUXE YPATINGA FORMULĖ: bakterijų + skaidulų kompleksas, pateikiamas minkštose augalinėse kapsulėse. Patentuotos kapsulės sienelės apsaugo bakterijas nuo skrandžio rūgšties poveikio ir leidžia bakterijoms saugiai pasiekti žarnyną. Skaidulų šaltiniai: daržovės, vaisiai, uogos, grybai, jūržolės ir 5 metų natūrali fermentacija be terminio apdorojimo stipri pagalba virškinimui ir gerai kasdieniui savijautai.

Dar DAUGIAU bakterijų AUGALINĖSE kapsulėse.

- GEROSIOS BAKTERIJOS: 12 RŪŠIŲ aktyvių ir gyvybingų probiotinių bakterijų, priklausančių *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* ir *S.thermophilus* šeimoms.
- GAUSI ĮVAIROVĖ skaidulinių medžiagų, kurios sudaro palankias sąlygas gerųjų bakterijų mitybai žarnyne.
- DAUGIAU KAIP 500 biogeninių metabolitų (organinių ir amino rūgščių, trumpos grandinės riebiųjų rūgščių, polifenolų ir pan.), bakterijų metabolizmo dėka susiformavusių per 5 natūralios fermentacijos metus.
- MOKSLIŠKAI pagrįstas veiksmingumas – Japonijoje atlikti in vivo ir in vitro klinikiniai tyrimai.
- MAŽA minkšta kapsulė – lengva praryti.
- Be GMO, pieno produktų ir gliutimo.
- Idealiai tinka VEGETARAMS ir VEGANAMS, nes sudėtyje nėra gyvūninės kilmės ingredientų.
- ATSPARUMAS temperatūrinei kaitai – produkto nereikia laikyti šaldytuve.



nuo
5,99 €

LINEX

kietosios kapsulės, N16 / N32 **5,99 € / 11,99 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

NORMALIZUOJA ŽARNYNO VEIKLĄ

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 10⁷ KSV liofilizuotų gyvybingų bakterijų (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*). Terapinės indikacijos: viduriavimui, pilvo pūtimui ar kitokiam virškinimo sutrikimui gydyti kaip pagalbinė priemonė. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** mažesniems kaip 2 metų vaikams gerti po 1 kapsulę 3 k/d, 2–12 metų vaikams – po 1–2 kapsules 3 k/d, o vyresniems nei 12 metų – po 2 kapsules 3 k/d. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** specialiu atsargumo priemonių reikia, jei išmatose yra kraujo ar gleivių. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El. paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069673. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.



nuo
6,99 €

LIVOSIL

140 mg kietosios kapsulės, N30 / N60 **6,99 € / 13,88 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. **Teksto peržiūros data:** 2017-07-12.



-40%

GASTROVAL

GASTROVAL kapsulės, N15
GASTROVAL FLUXUS kapsulės, N15
GASTROVAL FORTE kapsulės, N12
GASTROVAL HEPAR FORMULA kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAI*

GASTROVAL – sudėtyje net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys virškinimui, kurio naudą lengva pajusti. **GASTROVAL FORTE** – stipresnis fermentų ir augalinių ekstraktų derinys virškinimui. Sudėtyje papildintas kiekis fermentų – kai reikia stipresnės pagalbos. **GASTROVAL FLUXUS** – inovacija su DGL saldymedžiu. Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumą pusiausvyra dėka plačios sudėties: augalų sėklų ir šaknų ekstraktai, magnis, virškinimo fermentai, bifido bei lakto bakterijos, inulinas. **GASTROVAL HEPAR FORMULA** – tik 1 kapsulė per dieną! Geresnis pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažeidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštingumą. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažeidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. **GASTROVAL** – SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.



nuo
5,77 €

MAALOX

400 mg + 400 mg kramtomosios tabletės be cukraus, N40 **5,77 €**
40 mg + 35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml **6,66 €**

NERECEPTINIS VAISTAS**

Nuo rėmens. **Veiklosios medžiagos, stiprumas:** vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir pasaugiems nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suspensiją reikėtų gerti neskiasta. Buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. Tabletės: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmeni arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsiradimą kartą arba je neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitoms pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kitokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. **Teksto parengimo data:** 2024 m. gruodžio mėn. 2605_SB_Maalox_V01_LT

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!



1,66 €

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

NERECEPTINIS VAISTAS**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukažolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozė sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgai kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant šį vaistą ilgai kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant šį vaistą ilgai kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant šį vaistą ilgai kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. **Reklaminio teksto parengimo data:** 2018-08-30. GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI.



1+1

Perkant pakuotę -
antra tokia pati
DOVANŲ!

SALDUS MIEGAS

kapsulės, N15
eliksiyras, 150 ml
fitoMELATONINAS, 1 mg kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAI*

Linija „Saldus miegas“ - viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu). „Saldus miegas“ - net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių ramunų žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę. „Saldus miegas fitoMELATONINAS“ preparate yra 1 mg fitomelatonino. „Saldus miegas eliksiyras“ karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5-HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiką, reikalingą norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).




iki
-35%

MICROLIFE atrinktos prekės

MEDICINOS PRIEMONĖS

*Europos hipertenzijos draugijos kraujospūdžio matavimo gaires atitinkantys kraujospūdžio matuokliai. GYVENTI, TAI ŽINOTI!



Pasiūlymai galioja 2026 06 01–2026 06 30 Apotheka lojalumo programos nariams. Nuolaidos taikomos pagal Apotheka Pharma Vaistinė, UAB administracijos patvirtintą prekių sąrašą, kurio galite teirautis vaistinėse. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Įprastos kainos ir pasiūlymai gali skirtis atskirose vaistinėse ir www.apotheka.lt. Jei leidinyje nurodytos kainos ar kita informacija nesutampa su pateikta fiziniame vaistinėje, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o leidinyje pateiktus duomenis laikyti spaudos klaida. Akcija „1+1“ taikoma perkant dvi tas pačias pakuotes. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti pasiūlymus.



-20%

SWANSON atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Swanson maisto papildai pagaminti JAV, laikantis aukščiausių kokybės standartų. Ilgametė Swanson gamybos patirtis leidžia užtikrinti, kad visi produktai yra kokybiški, efektyvūs ir veiksmingi.



-50%

LIUBERIN SUPERIOR, kapsulės, N30 +LUTEIN 35 mg, kapsulės, N30

MAISTO PAPILDAI*
Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „Liuberin superior“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūriems akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies kraujotaką. O „Liuberin +LUTEIN 35 mg“ – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir mėlynių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną. **RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!**



-20%

OCUTEIN atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI* IR MEDICINOS PRIEMONĖS
Ocutein KRISTAL – kristalo tyrumo regėjimui!
Ocutein BRILLANT – brillantinė apsauga pavargusioms, daug dirbančioms akims.
Ocutein RETIN – patobulinta formulė daug dirbančių akių mikrocirkuliacijai.
Ocutein FORTE – trejopas poveikis sausoms, daug dirbančioms akims. Vartojimas: 1 kapsulė per parą.
Ocutein SENSITIVE PLUS – drėkinamieji akių lašai su hialuronu ir mėlynių ekstraktu jautrioms daug dirbančioms akims.
Ocutein RIBO-HYAL – regeneracija kiekvienam lašui!
OCUTEIN – DAUG DIRBANČIŲ AKIŲ APSAUGA!



-15%

HYPROMELOZA-P akių lašai (tirpalas), 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ
HYPROMELOZA-P akių lašai rageno ir junginės paviršiuje sudaro laikiną apsauginę plėvelę, sumažindami ašarų išgaravimą bei apsaugodami akies paviršius nuo tolimiesnio pažeidimo dėl sumažėjusio ašarų kiekio. Dėl drėkinamojo ir apsauginio poveikio priemonė tinkama esant nemaloniam pojūčiui akyse (pvz., deginimo, niežėjimo, svetimkūnio pojūtis) dėl dirginimo, kurį sukelia vėjas, dulkes, dūmai, oro tarša, kontaktiniai lęšiai ir kt.



nuo
7,79 €

OLFEN 140 mg transderminis pleistras, N2 / N5 / N10 7,79 € / 11,99 € / 20,27 €

NERECEPTINIS VAISTAS**
Olfen 140 mg vaistinis pleistras. Viename vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. **Indikacijos:** lokalus skausmas, sukeltas (pvz., sporto traumos) dėl ūmaus sausgyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių parinimo, mašinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. „Olfen“ pleistro jaunesniems kaip 15 metų pacientams naudoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitoms skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba acetilsalicilo rūgščiai; astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, kurie pasireiškė pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU; esama skrandžio ar žarnų opa; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; paskutiniai trys mėnesiai prieš operaciją. **Specialūs įspėjimai:** jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 3 d. arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchų spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro atsirado išbėrimai, gydyti reikia nedelsiant nutraukti. Gydymą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių spindulių [1 dieną], kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Vaistinį preparatą atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praeityje buvo pepsinė opa. Žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, kadangi yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Sudėtyje esantis propilenglikolis ir butilhidroksitoluensas gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginimą akis ir gleivine. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-01-22. OLF-LT-00048
TEISINGAS ĖJIMAS KOVojANT SU SKAUSMU!



1+1

Perkant pakuotę -
antra tokia pati
DOVANŲ!

SENI CARE drėgnos servetėlės, N80

HIGIENOS PRIEMONĖ
Skirtos odos valymui bei drėkinimui. Vitaminas E palaiko odos elastingumą. Pakuotė uždaroma su plastmasiniu dangteliu. Servetėlių dydis 20 x 30 cm.



nuo
9,66 €

HESIO 450 mg plėvele dengtos tabletės, N30 / N60 / N120 9,66 € / 17,39 € / 31,94 €

NERECEPTINIS VAISTAS**
Hesio 500 mg plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** Hesio skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per parą 2 mėnesius: viena tabletė vidudienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Jeigu po 6 savaičių Hesio vartojimo lėtinio venų nepakankamumo gydymui simptomai nepalengvejo arba pasunkėjo, pasitarkite su gydytoju. Hemorojus paūmėjimas. Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tabletės per parą). Kitas 3 dienas - 2 tabletės du kartus per parą (4 tabletės). Tabletės vartokite valgio metu. Jeigu vartojate Hesio paūmėjusio hemorojus gydymui ir po 7 dienų simptomai nepalengvejo arba pasunkėjo, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. **Kontraindikacijos.** Hesio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams Hesio vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2022 m. kovo mėn.



iki
-30%

SUDOCREM® MULTI-EXPERT 60 g / 125 g / 250 g

MEDICINOS PRIEMONĖ
„Sudocrem® Multi-Expert“ gydo odos sudirgimus ir pažeidimus. Apsaugo odą aplink žaizdos kraštus. Švelniai gydo sauskelnių dermatitą. Dėka subalansuotos sudėties, kremas gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emolientas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebiųjų sluoksnio odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai. Tepiti plonu sluoksniu. Naudoti atsiradus įvairiems odos sudirgimams, įvairių kūno vietų išūtimams, profilaktiškai nuo pragulų ar odos apsaugai aplink žaizdų kraštus. Skirtas naudoti tik išoriniam. SUD-LT-00102.
„Sudocrem®“ - NE TIK KŪDIKIAMS, KIEKVIENAM.



NORSAN atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
NORSAN Omega-3 žuvų taukai, pagaminti iš smulkių laukinių žuvų ir laukinių menkių kepenų. Į sudėtį įeinantis ekologiškas šalto spaudimo alyvuogių aliejus, kuris yra reikalingas kaip antioksidantas. Paros dozėje yra net 2000 mg omega-3. „NORSAN Omega-3 VEGAN“ jūros dumblių augalinis aliejus, kuriame yra didelis kiekis EPA ir DHA. Tinka žmonėms, kurie yra alergiški žuvis. 100% veganiškas. 5 ml yra 2000 mg omega-3. „NORSAN Omega-3 FISK“ sudėtyje – laukinių žuvų taukai ir ypač itin grynaso alyvuogių aliejus. Žuvų taukai gaminami iš tvarios laukinės žvejybos laimikio Norvegijoje. Šio, vaikams skirta, produkto sudėtyje yra pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, pagaminto Rafaelio ekologiškame ūkyje Ispanijoje. Švelnaus apelsinų skonio. **AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ IR GRYNUMAS.**



MÖLLER'S atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
„Möller's“ – jau 170 metų iš kartos į kartą puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. Omega-3 kapsulės išsiskiria puikia kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyviu medžiagų deriniais. Tyrl ir gerai išvalyti „Möller's“ skysti žuvų taukai puikiai tinka vartoti visai šeimai kasdien ir visą gyvenimą. Įvairaus skonio kramtomosios žuvelės „Möller's Junior“ yra omega-3 ir vitamino D – augančiam vaikui organizmui naudingų medžiagų. **OMEGA-3 EKSPERTAI JAU 170 METŲ!**



ECOSH atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
EcoSh – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškesnius ir efektyvesnius maisto papildus. Naujoji veganinė, augalinė kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami veganams.



PROVISOR atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Daugiau energijos – laimingesni Jūs!
PROVISOR maisto papildai, tai – geriausias ir išskirtinis sudėty, maksimaliai pasisavinamos formos. **ATRAKITE SAU TINKANTĮ PRODUKTĄ!**



BEROCCA

IMMUNITY šnypščiosios tabletės, N30
ENERGY šnypščiosios tabletės, N15 / N30

MAISTO PAPILDAI*
Berocca® Immunity yra apelsinų skonio 11-os vitaminų ir mineralų kompleksas imuninei sistemai palaikyti. Vitaminai A, B₆, B₁₂, C, D, foliatai, varis, geležis, selenas ir cinkas svarbūs normaliai imuninės sistemos veiklai. Vitaminai C, E, varis, selenas ir cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Neskirta vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Netinka sergantiems hemochromatoze ar inkstų ligomis.
Berocca® Energy yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas. Vitaminai C, B₆, B₁₂, niacinas, pantoteno rūgštis ir magnis padeda mažinti PAVARGIMO JAUSMĄ ir NUOVARGI. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią PROTINĘ VEIKLĄ. Vitaminai B₆, C, foliatai ir cinkas padeda palaikyti normalią IMUNINĖS SISTEMOS veiklą. Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nėštumo arba žindymo metu vartoti tik pasitarus su sveikatos priežiūros specialistu. Netinka sergantiems inkstų ligomis. CH-20251009-27



FORMULA VITALE atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
„Formula Vitale“ biologiška aktyvių medžiagų deriniai, kuriuose yra būtinų vitaminų, mineralų ir augalinių veiklių medžiagų, kurių kasdien reikia mūsų organizmui. Be glitimo, be laktozės, be GMO. Tinka veganams!



ATEROLIP atrinktos prekės

MAISTO PAPILDAI*
Cholesterolio kontrolė
Aterolip® complex caps sudėtyje esantis ciberžolės ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, taip pat normalizuoti kepenų lipidų kiekį.
Aterolip® Rythmo sudėtyje yra vienapiesčių gudobelė žiedų ir europinio alyvmedžio lapų ekstraktų, taip pat magnio ir vitaminų. Vienapiesčių gudobelės padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
Aterolip® Fiber sudėtyje esančių beta gliukanų iš avižių ar miežių vartojimas su maistu padeda mažinti padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto pavaičius.



GLOFIX SKIN BOOST kapsulės, N60

MAISTO PAPILDAI*
Maisto papildas GLOFIX® vitaminai, mineralai, antioksidantai odai ir plaukams „SKIN BOOST“.
Daugiafunkcis, moksliu pagrįstas ir pamiltas gausybės mūsų klientų papildas tavo odai, plaukams ir gerai savijautai!
• Net 11 skirtingų medžiagų viename produkte leidžia sutaupyti laiką, finansus ir vietą namuose!
• Maisto papildas patvirtintas biomedicininiais tyrimais – Glofix „Skin Boost“ maisto papildas pagerina moterų veido odą.



-25%

BIOCELL intensyvaus poveikio grožio kaukės

MAISTO PAPILDAI*

BioCell puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumą estetika ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobula. BioCell veldo kaukės - tai laiko sau ritualas, jau tapęs grožio klasika. Prisotintos aktyvių komponentų jos leidžia pajusti naudą odai iškart. Teikia pasirenkti, ko tavo odai reikia šiandien – gilus drėkinimo, regeneravimo, stangrinimo, rauskiųjų lyginimo ar valymo. TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.



26,47 €

MINOXIDIL AUXILIA

50 mg/ml odos tirpalas, 60 ml

NERECEPTINIAI VAISTAI**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml yra 50 mg minoksidilio. **Terapinės indikacijos:** „Minoxidil Auxilia“ vartojamas suaugusiųjų androgeninei alopecijai (plaukų slinkimui) gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyrams: 2 kartus per parą (ryte ir vakare) tepkite galvos odą 1 ml „Minoxidil Auxilia“. Maksimali minoksidilio odos tirpalo paros dozė yra 100 mg; moterims: 1 kartą per parą tepkite galvos odą 1 ml „Minoxidil Auxilia“. Maksimali minoksidilio odos tirpalo paros dozė yra 50 mg. Užtepkite odos tirpalą ant pažeistos vietos ir skirstykite pirštų galiukais, kad tolygiai padengtų. Patepę kruopščiai nusiplaukite rankas. **Kontraindikacijos:** vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bet kuriai sudedamajai šio vaisto medžiagai. Prieš vartodami „Minoxidil Auxilia“, įsitikinkite, kad jūsų galvos oda yra sveika. **Specialūs įspėjimai:** Jeigu sergate širdies liga (išemija, aritmija, staziniu širdies nepakankamumu ar širdies vožtuvų liga), vartojate kraujospūdį mažinančių vaistų, prieš pradėdami gydymą „Minoxidil Auxilia“, pasitarkite su gydytoju. Dėl hipertrichožės (didelio plaukuotumo) atveju reikia žiūrėti, kad vaikai neturėtų sąlyčio su tomis kūno vietomis, kuriose pacientai (globėjai) tepsi minoksidiliu. Pasakykite gydytojui, jei vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra tretinoino ar kitų retinoidų, kortikosteroidų, intensyvių odos vaistų, kraujo spaudimą mažinančių vaistų. Saugokite, kad minoksidiliu gydomos vietos neveiktų intensyvi saulės šviesa, nes galima padidėjusi minoksidilio absorbcija per odą, gali pasireikšti odos reakcijų (pvz., paraudimas) arba nudegimas saulėje. „Minoxidil Auxilia“ nėštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-06-25, SPRENDIMAS PLAUKŲ SLINKIMUI MAŽINTI.



-25%

LADY ANION atrinktos prekės

HIGIENOS PRIEMONĖS

„LADY ANION“ higieniniai paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anijonine juoste. Medvilnė sukuria komforto pojūtį, anijoninė juostelė kvapo kontrolei, laidūs orai, švelnus paviršius išlieka sausas. Rekomenduojami ginekologijai. „Parliner“ ♦ (24 vnt. ir 48 vnt.) – ploni įklotai kasdieniniam naudojimui. „Dayliner“ ♦♦ (16 vnt.) – įklotai su sparneliais gausioms išskyroms, negausioms menstruacijoms. „Active“ ♦♦♦ (15 vnt.) – ploni paketai idealiai tinka keliaujant, sportuojant, šokant ar menopauzės metu. „Day Use“ ♦♦♦♦ (10 vnt. ir 20 vnt.) – paketai dienai menstruacijų metu. „Night Use“ ♦♦♦♦♦ (8 vnt.) – paketai nakčiai menstruacijų metu. „Post Partum“ ♦♦♦♦♦♦ (10 vnt.) – paketai po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms. „LADY ANION“ – TAVO KASDIENIS PASIRINKIMAS.



nuo 5,33 €

CANESTEN

10 mg/g kremas, 20 g **5,33 €**

500 mg, makšties minkštoji kapsulė, N1 **11,89 €**

NERECEPTINIAI VAISTAI**

Canesten 500 mg makšties minkštoji kapsulė – 1-os dienos makšties grybelinės infekcijos gydymui klotrimazolas. **Terapinės indikacijos.** Makšties ir išorinių moters lyties organų infekcija, sukeltą klotrimazoliu jautrių mikroorganizmų gydymui. **Vartojimo būdas.** Makšties minkštoji kapsulė reikia įdėti kaip galima giliau į makštį, naudojant pateiktą aplikatorių, geriausia gulint, vakare prieš miegą. Jei laukiate, įdėkite makšties minkštoji kapsulė į makštį priešais. **Dozavimas.** Viena makšties minkštoji kapsulė, įvesta giliai į makštį vakare (vienkartinė dozė). **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju, jeigu: infekcija pasireiškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmą mėnesį po gimdymo; per pastaruosius šešis mėnesius infekcija pasikartoję daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas (≥ 38 °C); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonus kvapo išskyrių iš makšties; pasireiškia pykinimas; pasireiškia kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas. Nerekomenduojama gydyti menstruacijų metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Vartojant negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų. Vartojant rekomenduojama vengti lytinių santykių, nes partneris gali užsikrėsti. Jei Jūsų partneriai yra infekcijos simptomų, tai turi būti gydoma tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu naudojami latekso kontraceptinių priemonių, pvz., prezervatyvų ir diafragmų, efektyvumas ir patikimumas gali sumažėti. Negalima nuryti. **Kontraindikacijos.** Alergija klotrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Canesten 10 mg/g kremas – grybelinės infekcijos gydymui klotrimazolas. **Terapinės indikacijos.** Canesten skirtas suaugusiems, pasaugiems ir vaikams gydyti: grybelinės odos infekcijos, pvz., sportininko pėda, grybelis, grybelinis sauskelnių bėrimas ir grybelinis prakaitavimo sukeltas bėrimas; grybelis sukeltas šoriųjų moters lyties organų arba varpos galo uždegimas. Vartojimo būdas. Vartoti ant odos. **Dozavimas.** Kremu gliosai ir tolygiai tepkite pažeistas vietas 2-3 kartus per parą ir švelniai trinkite. Kremu juostelės (0,5 cm ilgio) pakanka maždaug delno dydžio plotui gydyti. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Canesten. Kremas gali sumažinti latekso gaminių, tokių kaip prezervatyvai ir diafragmos, veiksmingumą ir saugumą, jeigu jis tepamas lytinių organų srityje (moterims: lytinės lūpos ir srits apie vulvą; vyrams: apyvarpė ir varpos galvutė). Gydymo metu naudokite alternatyvias apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su akimis. Nedėti į burną, nenuryti. Vaikams (jaunesniems negu 12 metų) ir senyviems pacientams vartoti galima tik prižiūrint gydytoją. Vengti ilgalaikio gydymo dideliose odos plotuose, ypač kūdikiams ir vaikams. Vulvito atveju jaunesniems kaip 16 metų paaugūms galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Per pirmuosius tris nėštumo mėnesius prieš vartojant reikia pasitarti su gydytoju. Sudėtyje yra cetonarolio alkoholio, benzilo alkoholio. **Kontraindikacijos.** Alergija klotrimazolui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Registracijos. UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09238, Vilnius, Lietuva. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-06-27, CH-20250627-35.



-25%

URIAGE BARIESUN atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Dermatologinė kosmetika „Uriage“ gimsta Prancūzijos Alpių papėdėje. Ilgus metus kurta, pagrįsta moksliniais tyrimais, naudojama kas dien ir esant odos problemų, kūdikiams, vaikams, suaugusiems. KIEKVIENO POREIKIAMS, VISAI ŠEIMAI.



iki -35%

BIODERMA PHOTODERM atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalinamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. NAOS EKOBIOLOGIA – DERMATOLOGUOS ESMĖ.



-40%

HELEN SEWARD atrinktos prekės

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

HELEN SEWARD – nauji plaukų grožio priežiūros sprendimai prasideda pačioje Viduržemio jūros širdyje. Ingredientai, gauti iš sertifikuoto ekologinio ūkio tampa dar veiksmingesniais. Organiniai aliejai sustiprina kosmetinį poveikį plaukų pluoštui ir suteikia naujų pojūčių. Kiekvienas HELEN SEWARD produktas yra sinergija gamtos, pažangiu technologijų, tradicijų ir inovacijų. HELEN SEWARD specializuojasi novatoriškose plaukų priežiūros priemonėse profesionalams ir kasdieniam naudojimui namuose.



-10%

CANESBALANCE makšties ovulės, N7

MEDICINOS PRIEMONĖ

Gydo bakterinės vaginozės simptomus, atkurdamas normalią pH pusiausvyrą ir makšties mikroflorą. Todėl veiksmingai sumažina nemalonių kvapų, neįprastus išskyras ir nemalonus pojūčius makštyje. CH-20251201-16