BENU Vaistinė

LAPKRITIS 2026

LIETUVA 2026
VAISTINIŲ SEKTORIUS

BEST CUSTOMER SERVICE

Geriausias klientų aptarnavimas, remiantis „Dive“ slaptojo pirkėjo tyrimu

Dive

MAISTO PAPILDAMS

IMUNITETUI ir ŽUVŲ TAUKAMS

-35%

Perkant 2 prekes ir daugiau



Akcija galioja 2026 11 01 – 2026 11 30 *BENU PLUS* ir *Mano Rimi* lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

LAPKRIČIO

SUPERHEROJAI JŪSŲ SVEIKATAI

BENU vaistinė kiekvieną mėnesį pristato produktus SUPERHEROJUS, kurie ateis jums į pagalbą, kad kiekvieną dieną jaustumėtės gerai, o susirgę pasveiktumėte greičiau. **Produktai SUPERHEROJAI - ne tik efektyvi pagalba jums, bet ir**

TEISINGA KAINA KIEKVIENĄ MĖNESĮ.

SUPERHEROJUS BRONTEX - greitpji pagalba nuo kosulio visai šeimai

NUO **2,69 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai
BRONTEX 15 mg/5 ml sirupas;
BRONTEX 30 mg tabletės;
BRONTEX 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas;
BRONTEX 60 mg šnypščiosios tabletės.

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 5 ml sirupo yra 15 mg; 1 tab. yra 30 mg; 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg; 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. **Indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** 2–5 m. vaikams 3 k/p po 7,5 mg ambroksolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6-12 m. vaikams – 2–3 k/p po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tab.); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2–3 k/p po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tab., arba ½ šnypščiosios tab.) arba inhaliuoti lašus 1–2 k/p po 15–22,5 mg (po 2–3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Jei simptomai negerėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiąsias tabletes reikia ištirpinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** „Brontex" (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių - jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiųjų tablečių - jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „Brontex" negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustačius fruktozės netoleravimą, sergantiesiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusio su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. Brontex tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiųjų tab. (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Brontex 60 mg šnypšč.tab.: sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai nėščioms moterims ir žindyvėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Tekstų peržiūros data.** BRONTEX 15 mg/5 ml sirupas: 2024 07 22; BRONTEX 30 mg tab. ir BRONTEX 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas: 2021 08 02; BRONTEX 60 mg šnypščiosios tab.: 2022 10 29. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025 m. liepa. BRO-LT-00061
Greitoji pagalba nuo kosulio visai šeimai!

SUPERHEROJUS OTRIVIN – pagalba kvėpavimo takams

5,99 €



OTRIVIN MENTHOL

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
Nereceptinis vaistas

Ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos.** Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. Skirti vartoti suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams. **Vartojimas.** Po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima purkšti daugiau kaip 3 k./parą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos.** Alergija ksilometazolinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaro kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju arba atrofiniu rinitu). **Specialūs įspėjimai.** Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys, jei vartojate triciklių ir tetraciklių antidepresantų, jeigu vartojate arba per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. Labai jautriems pacientams gali sukelti miego sutrikimą, galvos svaigimą, tremorą. Sudėtyje yra benzalkonio chlorido. **Teksto parengimo data** 2025/02. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.

TOP MĖNESIO PREKĖ

-40%

~~16,99 €~~ **10,19 €**



LIVSANE

„IMMUNE SUPPORT LIQUID"

Maisto papildas. Apelsinų skonio ampulės 25 ml, N7
7 paruoštos vartoti ampulės, kuriose yra savaitinė dozė apelsinų skonio maisto papildo, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

TOP MĖNESIO PREKĖ

1+1

7,49 €



skineffect

Drėkinamasis rankų kremas, 75 ml

SUPERHEROJUS GRIPEX - pagalba nuo gripo ir peršalimo simptomų

NUO **4,79 €**



GRIPEX

GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės
GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. 1 tabletėje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31.
„GRIPEX“. VEIKIU!

SUPERHEROJUS NUROFEN - pagalba nuo skausmo ir karščiavimo

2,79 €



NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg dengtos tabletės
Nereceptinis vaistinis preparatas
Vienoje dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukelto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė); sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi pepsinė opa (du ar daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai.** Reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistinių preparatų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavoju. Gydant ibuprofenu buvo pranešta apie sunkias odos reakcijas, įskaitant eksfoliacinį dermatitą, daugiaformę eritemą, Stivenso-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaisto sukeltą reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (VRESS), ūminę generalizuotą egzanteminę pustuliozę (ŪGEP), kuri gali būti pavojinga gyvybei arba mirtina. Jei atsiranda šių reakcijų požymių ir simptomų, ibuprofeno vartojimą reikia nedelsiant nutraukti. Šis vaistas gali būti susijęs su nedideliu širdies priepuolio („miokardo infarkto“) ar insulto pavojaus padidėjimu. Šis vaistas gali maskuoti infekcijos simptomus, dėl to gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o tai gali pabloginti infekcijos gydymo rezultatus. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Vienoje tabletėje yra natrio, būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2026-10-20.

SUPERHEROJUS ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS - atrinktos arbatos

-20%



ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS NUO 1883

ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS ATRINKTOMS ARBATOMS

Kruopščiai rankomis atrinktos žolelės vaikams ir suaugusiems.
Sukurta fitoterapijos ekspertų pasitelkiant mokslą ir tradicijas nuo 1883 m.



1+1



ZAN™ – maisto papildų linija nervų sistemai, psichinei sveikatai bei miegui.

Maisto papildai

HypnoZAN Express N30 čiulpiamos tabletės su melatoninu ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti, o čiulpiama preparato forma užtikrina geresnį veikimą. **HypnoZAN N20** su melatoninu ir melisa padeda greičiau užmigti, palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. **ValeroZAN Drops 50ml** geriamasis tirpalas, augalinių ekstraktų derinys su valerijonais tinkamas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai ir atsipalaidavimui, skysta preparato forma užtikrina greitesnį veikimą. **ValeroZAN N60** Vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir paprastųjų apynių bei sukatžolių derinys padeda: atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę, palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę.

Imuninei sistemai

1+1



IMUNITAL | Maisto papildai

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant peršalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital" – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.

„Imunital SHOTS" – itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu, reishi ir shitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tinka vaikams nuo 3 metų

„Imunital FORTE+" – ypač didelės vitaminų D, C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veikdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei mažinti nuovargį.

Magiškai tvirtam imunitetui!

1+1



GREENIFY

GREENIFY - tai, ko reikia grožiui ir gerai savijautai: išgryninta sudėtis, efektyvus įsisavinimas, patoguva vartojimas.

COLLAGEN BEAUTY SHOTS – pažangi formulė odos švytėjimui, ląstelių atsinaujinimui, sveikam ir tolygiam odos spalvos tonui (odos pigmentacijai);
DEEP SLEEP SHOTS – kokybiškam miegui: greitam užmigimui, atsipalaidavimui, giliam miegui;
COLLAGEN JOINTS SHOTS – naudinga formulė sąnariams, lengvam judesiui;
BRAIN BOOSTER SHOTS – kasdieniam protiniam pajėgumui – augalinių ekstraktų ir folio rūgšties formulė, padedanti palaikyti normalią atmintį, susikaupimą ir mažinti nuovargį.
Taip pat išbandykite GREENIFY BOOSTERS – smūgines dienos dozes imuninei sistemai pastiprinti arba lengvesniam atsigavimui po vakarėlių.

GREENIFY – išgryninta Tavo kasdienybei

Imunitetui, kaulams, raumenims

1+1



OLIDETRIM®

Maisto papildai
OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių
Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.
Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.
Kaulams ir raumenims- vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2

Geriausia gynyba – stiprus imunitetas.

swiss'Ovit

-50%



Maisto papildai imunitetui

SwissOvit omega-3 TG 600 mg žuvų taukai, 30 kapsulių;
SwissOvit magnis + vitaminas B6, 30 kapsulių
SwissOvit vitaminas D3 4000IU, 30 kapsulių;
SwissOvit vitamino B kompleksas, 30 kapsulių
SwissOvit vitaminas C 500mg, 30 kapsulių

Šlapimo takams

1+1




SOLURO®

Soluro Duo, 15+15 kapsulių;
Soluro Mannose, 7 paketėliai;
Maisto papildai

Soluro DUO sudėtyje yra stambiauogių spanguolių uogų sausojo ekstrakto ir paprastųjų spanguolių uogų koncentrato.
Soluro Mannose sudėtyje yra didelės koncentracijos D-manozės, stambiauogių spanguolių ekstrakto, aminorūgščių ir vitaminų kompleksas. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

1+1



LIVSANE

hipertoninis jūros vandens nosies skalavimo purškalas, 120 ml

Medicinos priemonė

Nosies gleivinės paburkimą mažinantis tirpalas, skirtas išvalyti ir atverti nosies kanalus. Tinka nuo 3 metų amžiaus. 100% natūralus. Su mikroelementais. Be konservantų. Be propelento dujų.

MARSIEČIAI guminukai kasdien, kad vieną dieną vaikai mus praaugtų!

-50%



MARSIEČIAI

Maisto papildai

MARSIEČIAI guminukai su ežiuole ir vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

MARSIEČIAI guminukai su šaltalankiais ir vitaminais C, D ir cinku, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

MARSIEČIAI BoneActive guminukai su vitaminais D ir K, kurie padeda palaikyti normalią kaulų būklę.

MARSIEČIAI Imunactiv tabletės su beta gliukanais bei vitaminais ir mineralais vaikų imunitetui. Vitaminai C, D ir cinku padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

2603_SB_Marsieciai_V01_LT

Vitaminai ir mineralai visai šeimai.

-50%



WALMARK – žydėk sveikata!

Maisto papildai

„WALMARK Super Vitaminas C" - prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Papildytas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą.

„WALMARK Mega Vitaminas D 4000UI" – didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

„WALMARK Glucosamine + Collagen" Gliukozamino ir kolageno tabletės sąnariams ir kaulams: papildytos vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. Il tipo kolagenas yra viena pagrindinių sąnarių kremzlės sudedamųjų dalių.

„WALMARK Kalcis, magnis, cinkas FORTE", 100 tablečių - aukštos kokybės mineralai, papildyti vitaminu D. Kalcis padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Tinkami ir vaikams nuo 4 metų! 2610_SB_Walmark_V01_LT

1+1



PROPODEZAS

Maisto papildai, 50 tablečių

Propodezas – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais, naudingas ne tik gerklei ir imunitetui, bet ir gaiviai skanus.

Rinkis iš 4 skirtingų skonių arba stipresnę versiją – PROPODEZAS FORTE su šeivamedžiu ir bičių pieneliu.

Imbierai, šeivamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą.

Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų

Bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui!"

-50%



DETRICAL

Maisto papildai

DETRICAL vitaminas D3 2000 IU N60; DETRICAL vitaminas D 4000 IU N60. Didelė vitamino D dozė vienoje tabletėje. Imunitetui, kaulams ir dantims.

Akims

1+1



OCUVAL®

Maisto papildai

„Ocuval Hydro Max" – rinkitės pavargusių, jautrių, daug dirbančių akių drėgmės balansui palaikyti.

„Ocuval"– sveikam regėjimui palaikyti vartokite akims naudingų medžiagų kompleksą su liuteinu, dumblių ekstraktu ir beta karotenu.

Kai reikia stipresnės pagalbos akims, išbandykite **„Ocuval Strong Plus"** – su bene didžiausiu kiekiu liuteino – net 40 mg vienoje kapsulėje, didelės koncentracijos vitaminais ir augaliniais ekstraktais.

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA

1+1



MAISTO PAPILDAI
GASTROVAL, 15 kapsulių; GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių;
GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių;
GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių; GASTROVAL® Max, 15 kapsulių.

GASTROVAL®

GASTROVAL – net 7augaliniai fermentų ir ekstraktų derinys sklandžiam virškinimui.

GASTROVAL FORTE – stipresnis augalinių fermentų ir platesnis augalinių ekstraktų mišinys lengvam virškinimui.

GASTROVAL HEPAR FORMULA – sklandžiai kepenų veiklai. Kepenų apsaugai nuo oksidacinės pažaidos. Kepenų ląstelių regeneracijai.

GASTROVAL FLUXUS – skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai. Virškinimui lengvinti.

GASTROVAL® MAX – augalinių fermentų, ekstraktų ir prebiotiko kompleksas, padedantis palaikyti sklandų virškinimą, lengvumo pojūtį po valgio, žarnyno mikrofloros balansą, normalių virškinimą patiriantiems stresą.

„GASTROVAL" SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI, KEPENŲ VEIKLAI.

1+1



BERTIL'S

Bertil's – bisglicinatiniai maisto papildai. Tai efektyviai pasisavinamos, koncentruotos mono medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį. Jų išskirtinumas – amino rūgščių chelatai. Unikalaus gamybos proceso dėka, naudojantis patentuota technologija, sukuriama naujos formos organinė molekulė – mineralų ir dviejų aminorūgščių kompleksas – chelatas. Tradicinių papildų įprasta mineralinė druska ištirpsta skrandyje, mineralas tampa įelektrintu jonu, kurio pasisavinimą gali blokuoti įvairios maistinės medžiagos (kava, pienas, kiti mineralai). Chelatiniai maisto papildai yra elektriškai neutralūs, jų mineralas nereaguoja su maistinėmis medžiagomis, nėra suardomas skrandžio rūgščių ir patekęs į žarnyną yra toliau efektyviai pasisavinamas. Nedirgina skrandžio.

Nervų sistemai, psichologinei funkcijai

-35%



MAISTO PAPILDAI

BIOFARMACIJA

Magnus Rex 300 – natūralios kilmės magnio bisglicinatas iš Negyvosios jūros – be pridėtinių priedų! Net 300 mg gryno magnio kiekio!

ASHWA PRO600 – pirma bioaktyvi ašvaganda KSM-66® milteliais, kurioje net 600 mg gryno ekstrakto. Šis ekstraktas išsiskiria tuo, kad turi vieną didžiausių pasaulyje vitanolidų koncentraciją – net 5 % – bei inulino, gaunamo iš cikorijos šaknies.

ASHWA ADAXON – tai neuro adaptogenų kompleksas, kuriame yra ašvagandų KSM-66® šaknų, liūto karčių (Lion's mane) ir rausvųjų rodiolių ekstraktų.

„Biofarmacijos" ATLANT linija – stiprios sudėties formulės sąnariams ir širdžiai.

-40%



ATLANT ir ATLANT MAXIMUS – specializuotos formulės su hidrolizuotu kolagenu, gliukozaminu ir kalciu, praturtintos hialurono rūgštimi, bosvelijų ir ciberžolių ekstraktais bei vitaminais. Sukurtos aktyviai judantiems ir siekiantiems ilgiau išlaikyti sąnarių lankstumą.

ATLANT – klientų įvertintas ir tapęs Nr. 1 kolageno maisto papildu sąnariams Lietuvoje 2024–2025 metais! Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Sofdent" duomenis.

ATLANT ŠIRDIS – kompleksas, skirtas širdžiai, kraujagyslėms, kraujotakos ir nervų sistemai. Išsiskiria dideliu polifenolių kiekiu: net 260 mg resveratrolio ir 15 mg likopeno. Sudėtis papildyta kofermentu Q10, mineralais ir vitaminu B1.

-40%

39,99€ 23,99€



LIVSANE BEAUTY COLLAGEN LIQUID, N28

Maisto papildas su kolageno peptidais, hialurono rūgštimi, vitaminais ir cinku. Su cukrumi ir saldikliu. Vyšnių skonio.

1+1



ORIOVIT – D

Maisto papildai

Oriovit-D 2000 TV (50 µg), N100.
Malonaus citrusinių vaisių skonio kramtomosios tabletės su vitaminu D3.

Oriovit-D 4000 TV (100 µg), N100.
Malonaus citrusinių vaisių skonio kramtomosios tabletės su vitaminu D3.

Oriovit-D Neutral 2000 TV (50 µg), N200.
Nuryjamos tabletės su vitaminu D3.

1+1



BEOTEBAL® PLUS

Plaukams, odai, nagams, 30 +10 tablečių
MAISTO PAPILDAS

„Beotebal® PLUS plaukams, odai, nagams" rekomenduojamas kasdienei plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiu, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum" kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminyje nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.
Grožio formulė Tavo plaukams, odai ir nagams!



NUO 27⁸⁹ €

MINOXIDIL

Nereceptinis vaistas.
Minoxidil Inteli 20 mg/ml odos tirpalas, 60 ml
Minoxidil Inteli 50 mg/ml odos tirpalas, 60 ml

Minoxidil Inteli 20 mg/ml odos tirpalas vartojamas gydyti lengvo ir vidutinio stiprumo vyrų ir moterų nuplikimą, susijusį su hormonais (androgeninei alopecijai). Minoxidil Inteli 50 mg/ml odos tirpalas vartojamas tiktai, jeigu Minoxidil Inteli 20 mg/ml odos tirpalas yra nepakankamai veiksmingas arba siekiama, kad gydomasis poveikis pasireikštų greičiau. **Vartojimo būdas:** Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Minoxidil Inteli 50 mg odos tirpalo reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 dozavimo pompos paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks nuplikimo (alopecijos) plotas, rekomenduojama paros dozė visada tokia pati. Maksimali paros dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Jei manote, kad Minoxidil Inteli veikia per stipriai ar per silpnai, praneškite gydytojui. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, Minoxidil Inteli 50 mg/ml odos tirpalo moterims vartoti negalima. Jeigu galvos oda pažeista, gali rezorbuotis didesnis veikliosios medžiagos kiekis. Tirpalo galima tepti tik ant sveikos odos. Jeigu sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, pasakykite gydytojui, jis gali pradėti stebėti kraujospūdį ir širdies veiklą, įsitikinti, ar nėra kūno patinimo. Jaunesniems nei 18 metų asmenims, vaisto vartoti nerekomenduojama, nes minoksidilio saugumas ir veiksmingumas vaikams šioje amžiaus grupėje neištirti. Jeigu vaisto atsitiktinai pateko ant jautrios kūno vietos, kruopščiai ją nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Saugokite, kad vaisto nepatektų į akis. Teksto parengimo data 2024-09-03
MINOXIDIL INTELI... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...



NUO 17⁹⁹ €

Slenka plaukai?*
Pasitikėk vaisto gydomąja galia!

BEOTEBAL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 30 arba 60 tab.

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino.

Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL" priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnis, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perštėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletė „BEOTEBAL" per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL", nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingi mažesni. **Reklamos teksto parengimo data 2026-04.**

*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų.
„Beotebal" yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

VIRŠKINIMUI SUBALANSUOTI[1].

Tinka veganams
Tinka vegetarams
Be alergenų[2]
[1]Kalcis padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą
[2]Pagal reglamentą (ES) Nr. 1169/2011



-20%

~~24,99€~~ 19,99€

SYMBIOSYS® alflorex+™

Maisto papildas. 30 kapsulių. Grynasis kiekis: 19,7 g
Kiekis vienoje kapsulėje (paros dozėje):
Bifidobacterium longum 35624® padermės bakterijos – 1 × 109 KFV*; Kalcis – 120 mg [15 % RMV**]
Kuo alflorex+TM yra ypatingas? alflorex+TM sudėtyje yra specialiai atrinktų gyvų mikrokapsuliuotų *Bifidobacterium longum 35624®* padermės bakterijų ir kalcio, kuris padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. **Sudedamosios dalys:** kalcio karbonatas, kukurūzų krakmolas, kapsulės apvalkalas: hidroksipropilmetilceliuliozė, *Bifidobacterium longum 35624®* padermės bakterijos, lipnumą reguliuojanti medžiaga: riebalų rūgščių magnio druskos. **Vartojimas:** suaugusiesiems gerti po vieną kapsulę per dieną užgeriant stikline vandens mažiausiai keturias savaites. Vartoti nepriklausomai nuo maisto, bet kuriuo paros metu. Po vartojimo visada uždarykite buteliuką. Buteliukas buvo uždarytas sandariai pakavimo metu. Pradžioje gali pasireikšti švelnūs laikini žarnyno motorikos pokyčiai. Tai normali laikina reakcija, todėl svarbu nenutraukti alflorex+™ vartojimo. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Sudėtyje esančios bakterijos gali būti inaktyvuotos vartojant antibiotikus. Nevartokite, jei esate alergiški bet kuriai produkto sudedamajai medžiagai. Nerekomenduojama vartoti neščioms ar žindančioms moterims. Po pirmojo atidarymo geriausia suvartoti per 30 dienų. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nereikia laikyti šaldytuve. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija. Vietos atstovas: Biocodex UAB, info@biocodex.lt; Tel. +370 37 408681.
ID 133780737

Inovatyvūs maisto papildai energijai, nervų sistemai, širdžiai ir grožiui

1+1



WALMARK LONGEVIT

Maisto papildai
LONGEVIT Resveratrol Extra 500 mg, 60 kapsulių. Didelė dozė stabilaus trans-resveratrolio - 500mg dviejuose kapsulėse. Resveratrolis padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
LONGEVIT NAD+ Booster, 60 kapsulių. Kiekvienoje kapsulėje yra 160 mg niacino iš dviejų šaltinių – 111,75 mg nikotinamido ir 115,25 mg nikotinamido ribozido (NR) chlorido.
Niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir odos būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią psichologinę būklę, nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tik viena kapsulė per dieną!
LONGEVIT Beauty Collagen Shots, 14 buteliukų. Unikali formulė odai, plaukams ir nagams, kurioje yra net 11.000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenatūruoto II tipo kolageno viename buteliukyje. Papildyta vitaminais C, D, B6 ir selenu bei manganu. Juodųjų serbentų skonio. Tik vienas buteliukas per dieną! 2604_PM_WL Longevit_V01_LT
Walmark LONGEVIT. Ateitis prasideda šiandien!

Maisto papildai papildai sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu ir bosvelijos ekstraktu. Judėk laisvai!

-40%



ARTHROSTOP PROENZI®

Arthrostop Proenzi® Intensive tabletės, N30
Arhrostop Proenzi Collagen Shots 25g, N14
Arhrostop Proenzi Rapid tabletės, N90

Arthrostop Proenzi Intensive tabletės, N30 – sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijos ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik viena tabletė per dieną!
Arthrostop Proenzi Rapid tabletės, N90 - kompleksas su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijos ekstraktu sąnariams.
Arthrostop Proenzi Collagen shots, N14 – Unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenatūruoto antro tipo kolageno viename buteliukyje! Naujiena – juodųjų serbentų skonio.
2601_SB_Proenzi_V01_LT.

-40%



VitirON™ KIDS

Vaikams VitirON™ KIDS Maisto papildai, 50 kramtomųjų guminukų
VitirON™ KIDS Immunity imunitetui; VitirON™ KIDS School for BRAIN smegenims
VitirON™ KIDS grow UP kaulams; VitirON™ KIDS Sports for ENERGY energijai

VitirON™ Kids – tai vaisių ir uogų skonio, įvairių formų (meškutis, automobilis, triušis, lėktuvas, katinas, ančiukas) kramtomosios pastilės su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis vaikams nuo 4 metų. VitirON™ Kids sudėtyje derinami riebaluose ir vandenyje tirpūs vitaminai*.
Maisto papildų sudėtyje esantys vitaminai C, A, B12, folio rūgštis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų bei dantų būklę ir raumenų funkciją. Niacinas (vitaminas B3), biotinas, vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, o cinkas - normalią pažinimo funkciją. VitirON™ Kids patenkins augančio vaiko mikroelementų poreikį! VTR-LT-00155
MAISTO PAPILDAS NĖRA MAISTO PAKAITALAS. SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.
* VitirON™ Kids gamybos technologija

Sąnariams, kaulams, kremzlėms

-40%



MAGNEFLEX

Maisto papildas. 30 ir 90 kapsulių.
MAGNEFlex sudėtyje yra II tipo nedenatūruoto kolageno kartu su magniu, vitaminu C, D3 ir B6 užtikrinančių sinerginį maistinių medžiagų poveikį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.
Judėk Laisvai!

MÖLLER'S
Žuvų taukai

1+1



Atrinktiems žuvų taukams kapsulėse.

MÖLLER'S

Maisto papildai
Möller's – omega-3 ekspertai iš Norvegijos, jau daugiau kaip 170 metų puoselėjantys žuvų taukų gamybos tradicijas. „Möller's" omega-3 kapsulės išsiskiria aukšta kokybe, didele omega-3 koncentracija ir skirtingiems poreikiams pritaikytais veikliųjų medžiagų deriniais.

-30%



BLUEIRON

Maisto papildai
BLUEIRON skystoji geležis, mėlynių skonio, 330 ml
BLUEIRON PREGNANCY, skystoji geležis nėščiosioms, mėlynių skonio, 250 ml
Naujos kartos aukšto biologinio įsisavinimo maisto papildas su geležimi, neturintis sąveikos su maistu, švelnus skrandžiui ir lengvai toleruojamas, malonaus skonio.

Kiekvienai dienai. Kiekvienai mano versijai.

Pasiruošęs dienai.
365 kartus per metus.

LIVSANE



-40%

Vitaminas C



Maisto papildai

Vitaminas D_3



Maisto papildai

DI Žmonių atvaizdai sugeneruoti dirbtinio intelekto.

-40%



LIVSANE CINKAS IR SELENAS
Maisto papildai.

-40%



LIVSANE OMEGA-3 ŽUVŲ TAUKAI
Maisto papildai
LIVSANE OMEGA-3 + Vitaminas E žuvų taukai, N60
LIVSANE OMEGA-3 žuvų taukai EPA 352 mg DHA 264 mg High dosage, N60

-20%



Atrinktiems žuvų taukams

Lýsi

Žuvų taukai LYSI – tai nepakeičiamųjų riebalų rūgščių omega-3, vitaminų šaltinis. Riebalų rūgštys EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) vadinamos nepakeičiamosiomis, nes organizmas jų nepasigamina, žmogus turi gauti jų su maistu. EPR padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją, o DHR reikšminga smegenų ir regėjimo funkcijai.

LYSI produktų linijoje yra žuvų taukų su skirtingais riebalų rūgščių, vitaminų kiekiais, produktai yra įvairių formų -taigi galėsite pasirinkti tinkamiausią.

Tobula esi tu. BIOCELL tai išsaugo.

BIOCELL

-35%



BIOCELL Glampule – inovatyvi stiprios koncentracijos veido odos priežiūros linija!

BIOCELL Glampule Hydra Lifting – intensyviai drėkinančios, odos patempimo efektą suteikiančios glampulės.

BIOCELL Glampule Anti-aging Night Repair – senėjimo požymius mažinančios, regeneruojančios glampulės nakčiai.

BIOCELL Glampule Pigment Control – pigmentaciją kontroliuojančios ir odos atspalvį suvienodinančios glampulės.

-35%



BIOFARMACIJA

AKIMS, IMUNITETUI, ATMINČIAI, GERAI NUOTAIKAI
RETINA 50 mg / 20 mg, paketėliai N28
bioCINKAS 30 mg, miltelinai N20
reBRAIN+ 200 mg / 200 mg / 780 mg, kapsulės N60
Maisto papildai

RETINA – pažangi formulė regėjimui, jungianti net 50 mg liuteino, 20 mg „Pycnogenol®" pušų žievės ekstrakto, cinką bei vitaminus A ir B2. Išskirtinis derinys kasdienei akių priežiūrai. Vitaminai A ir B2 padeda išsaugoti normalų regėjimą.
bioCINKAS 30 mg – didelės koncentracijos cinko formulė patogiuose miltelių paketėliuose. Viename paketėlyje – net 30 mg cinko, padedančio palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Užtenka net 2 mėnesiams!
reBRAIN+ – naujos kartos nootropinio maisto papildo formulė protinei veiklai ir emocinei pusiausvyrai palaikyti, padedanti lengviau susidoroti su kasdieniu stresu ir palaikyti gerą nuotaiką. **reBRAIN** sudėtyje esančios sudedamosios dalys turi net **6 biomedicininius tyrimus* ir 10 patentų.**
BIOFARMACIJA – KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA

-35%



BIOFARMACIJA

Maisto papildai. Nuovargiui mažinti, nervų sistemai, kraujospūdžiui
Perkamiausi magnio ir kalio produktai iš klasikinės "Biofarmacija" linijos. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.
Produktų sudėtyse tik gryni mineralai, be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ir saldiklių.

"bioMagnesium Forte, bioKalis forte" – perkamiausi magnio, kalio maisto papildai Lietuvoje 2025 m.!
*Pagal UAB "Sofdent" 2025 m. duomenis.

BIOFARMACIJA - KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA

Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui

IKI -35%



FJØRD STRONG OMEGA-3

Maisto papildai
Kuo ypatingi?
- Išskirtiniai stiprios koncentracijos – su dideliu kiekiu bioaktyvių omega-3 rūgščių (EPR ir DHR).
- Sertifikuota aukščiausios kokybės žaliava, atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
- Ypač gerai pasisavinama reesterifikuotų trigliceridų forma, išlaikanti natūralią žuvų taukų struktūrą.
- Iš laukinių, riebių smulkių žuvų šaltinio. Žaliava sertifikuota pagal FOS (Friend of the Sea) standartą.

FJØRD STRONG OMEGA – 3 – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

SMARTHIT IV

Efektyvaus pasisavinimo maisto papildai

-30%



Naudojant patentuotą technologiją Miosol® pagaminamos mikrokapsulės, į kurias įterpiamos molekulės. Mikrokapsulių tikslas - apsaugoti veikliąją medžiagą nuo skrandžio rūgščių ir užtikrinti, kad jos nepažeistos pasiektų plonąjį žarnyną. Šis technologinis sprendimas leidžia kelis kartus pagerinti veikliosios medžiagos pasisavinimą bei sumažinti šalutinius poveikius.
SMARTHIT IV® Ferrum galima rinktis kapsulėmis arba skysčiu. **SMARTHIT IV® Ferrum** – vienoje kapsulėje yra 28 mg mikrokapsuliuotos geležies. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų.
SMARTHIT IV® Ferrum Strong – tai išmanus, stipresnis ir kompleksinis sprendimas, padedantis efektyviai palaikyti geležies atsargas organizme. 2 kapsulėse – 40 mg mikrokapsuliuotos geležies versija su bioaktyvia folio rūgštimi bei aminorūgštimi L-histidinu.
SMARTHIT IV® Ferrum Liquid – 5 ml skysčio yra 14 mg mikrokapsuliuotos geležies.
Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.
SMARTHIT IV® Vitamin D3 – skystas vitaminas D3 kaulams, dantims, raumenims;
SMARTHIT IV® Vitamins D3+K2 – sinerginis, vitaminų D3 ir K2 poveikis kaulams ir kraujotakai;
SMARTHIT IV® Vitamin B12 – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems;
SMARTHIT IV® Polifen – polifenolių šaltinis gerai savijautai.
Mikrokapsuliuotą kurkuminą galite rinktis **SMARTHIT IV Curcumin** skystą arba kapsulėmis - **SMARTHIT IV® Curcumin+Beta glucans.** Tai itin vertinga mikrokapsuliuoto kurkumino su beta gliukanais sudėtis imunitetui, cholesterolio kontrolei ir ne tik.
SMARTHIT IV® – menas veikti!

-30%



OILESEN VITAMINAS D3

Maisto papildai.
„Oilesen D3" – vitaminas D dėl geresnio pasisavinimo ištirpintas natūraliuose aliejuose lašiukais arba kapsulėmis.
„Oilesen D3 1000" – 1 kapsulėje yra 1000 TV vitamino D, ištirpinto extra virgin alyvuogių aliejuje. Tinka vartoti vaikams nuo 3 metų.
„Oilesen D3 400" – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Paprasta dozuoti pipete.
„Oilesen D3 su juodųjų ikrų aliejumi" – 1 kapsulėje yra 4000TV vitamino D, ištirpinto juodųjų ikrų aliejuje. Itin vertingas gerai savijautai.
„Oilesen D3+K2 su kanapių aliejumi" – itin vertinga sudėtis, apjungianti 3 svarbius komponentus – vitaminus D3 ir K2 bei didelį kiekį itin vertingo kanapių aliejaus. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų ir kau funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
„Oilesen D3 Forte" - 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3, ištirpinto kanapių aliejuje. Tinka vartoti žmonėms, turintiems padidintą vitamino D poreikį, pavyzdžiui, vyresniems.
Daugiau saulės su „Oilesen D3"!



NUO
5⁰⁹ €

Kaulams stiprinti

CALCIGRAN®

Nereceptinis vaistinis preparatas
Calcigran 500 mg/200 TV kramtomosios tabletės, N30 arba N100
Calcigran Forte 500 mg/400 TV kramtomosios tabletės, N60
Calcigran Forte Lemon 500 mg/800 TV kramtomosios tabletės, N60
Sudėtis: 1 tabletėje yra 500 mg kalcio (kalcio karbonato pavidalu) ir 200, 400 arba 800 TV vitamino D3 (cholekalciferolio). **Indikacijos:** vitamino D ir kalcio stokos profilaktika ir gydymas. Pagalbinis specifiniais preparatais nuo osteoporozės gydomų pacientų, kuriems yra vitamino D ir kalcio stokos pasireiškimo rizika, gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** „Calcigran" suaugusiesiems vartoti po 1 tabletę 1–3 kartus per parą, vaikams – po 1 tabletę 1–2 kartus per parą, „Calcigran Forte" suaugusiesiems vartoti po 1 tabletę 2 kartus per parą, vaikams ir paaugliams netinka. „Calcigran Forte Lemon" suaugusiesiems vartoti po 1 tabletę 1 kartą per parą, vaikams ir paaugliams netinka. Tabletes sukramtyti arba sučiulpti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šių vaistų medžiagai. Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Ligos ar būklės, sukeliančios hiperkalcemiją, hiperkalciuriją, inkstų akmenligė, vitamino D hipervitaminozė. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** gydant ilgai, reikia sekti kalcio kiekį kraujo serume ir sekti inkstų funkciją; būtina atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra hiperkalcemija arba inkstų funkcijos sutrikimo požymių; sarkoidoze sergantiems ligoniams skirti atsargiai, jų kraujyje ir šlapime būtina sekti kalcio kiekį; osteoporoze sergantiems imobilizuotiems ligoniams reikia skirti atsargiai; negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-07. LT-CALC-2200001

Odai, imunitetui, miegui, svorio kontrolei

-30%



ACORUS BALANCE

Maisto papildai
„Acorus Balance" produktų linija skirta subalansuotam gyvenimui.
Asortimente rasite skirtingų produktų, įvairioms organizmo funkcijoms palaikyti: kepenims, grožiui, virškinimo ir žarnyno funkcijai, svorio kontrolei, sąnariams. Produktai pasižymi išskirtinėmis vartojimo formomis – nuo guminukų ir vienadozių buteliukų (shot'ų).

Pagaminta Suomijoje!


-20%



UNITAL 1 mg

Unital 1 mg, 20 arba 50 tablečių
„Unital" sudėtyje yra 1 mg melatonino. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą). **Vartojimas:** suaugusiems rekomenduojama vartoti ½–1 tabletę. Dozė visada turėtų būti suvartota tuo pačiu metu vakare.

-20%
~~31,99€~~ 25,59€



BEAUTY OMEGA 7

Beauty Omega-7, maisto papildas, 120 kapsulių
Maisto papildas su šaltalankių uogų ir nakvišų sėklų aliejais ir juose esančiomis Omega riebalų rūgštimis, cinku, vitaminu A, B5 ir E. Cinkas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, o vitaminas E apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vartojimas: suaugusiems 1 kapsulė 2 kartus per dieną.

Pagaminta Suomijoje!

-15%
~~9,49€~~ 8,07€



VITABALANS VITA B_{12}

VITA B12 1 mg, maisto papildas, 30 pastilių
VITA B12 – mėtų skonio vitamino B12 pastilės. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, normalią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: suaugusiems 1 pastilė per dieną. Leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje.

2 produktų rinkinys už 1 produkto kainą



STOP STRESS® NIGHT N30+N30 kapsulių,
STOP STRESS® N30+N30 kapsulių,
STOP STRESS® HERBAL N30+N30 kapsulių rinkiniai.
Maisto papildai
STOP STRESS® sudėtyje esantys B grupės vitaminai – niacinas, tiaminas, riboflavinas ir vitaminas B6 - padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. STOP STRESS® NIGHT sudėtyje esantys valerijonų, apynių bei pasiflorų ekstraktai padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalų miegą. STOP STRESS® HERBAL – augalų ekstraktų kompleksas nervų sistemai! Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir protinę veiklą. Vaistinės melisos padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Paprastosios sukatžolės padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
Dienai be streso, ramiam miegui!

-15%



TRACE MINERALS

Maisto papildai
Maisto papildai TRACE MINERALS, praturtinti joniniais mikroelementais, mažina pavargimo jausmą, puoselėja sveiką nervų sistemos veiklą, padeda palaikyti subalansuotą mitybą. Papildai aprūpina organizmą trūkstamais mineralais, kurie išgaunami iš Didžiojo druskos ežero vandenų.

-30%



NORSAN, OMEGA-3 ŽUVŲ TAUKAI

Maisto papildai
Natūralūs laukinių žuvų, sugautų tvarios žvejybos būdu, taukai.

-30%



BEROCCA

Maisto papildai
Berocca® Immunity, 30 šnypščiųjų tablečių.
Vitaminų ir mineralų kompleksas imuninei sistemai palaikyti.
Berocca® Immunity yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas.
• Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
11 vitaminų ir mineralinių medžiagų, padedančių palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Neskirta vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Netinka sergantiems hemochromatoze ar inkstų ligomis. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Reklamos teksto parengimo data: 2024-07. CH-20240716-48
Berocca Energy, 15 arba 30 šnypščiųjų tablečių
Teigiamos energijos jūsų dienai
Berocca® Energy yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas, be cukraus.
• Vitaminai C, B2, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir magnis padeda mažinti PAVARGIMO JAUSMĄ ir NUOVARGĮ
• Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią PROTINĘ VEIKLĄ
• Vitaminai B6, C, foliatai ir cinkas padeda palaikyti normalią IMUNINĖS SISTEMOS veiklą
Vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams, po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
Reklamos teksto parengimo data: 2025-01. CH-20250115-36.

ANTRAI PREKEI -40%



LIFEPLAN

Maisto papildai
LIFEPLAN nakvišų aliejus 1000 mg kapsulės, N180
LIFEPLAN amino rūgščių komplekso tabletės su cinku, N30
LIFEPLAN alaus mielių tabletės, 300 mg, N300
LIFEPLAN folio rūgštis 400 mg, N90

-15%



~~16,99€~~ 14,44€

ALKYMER, 60 kapsulių

Maisto papildas, 60 kaps.

ALKYMER yra maisto papildas, kurio sudėtyje yra alkilgliceroliai, gaunami iš ryklių kepenų aliejaus. Alkilgliceroliai – tai natūralūs lipidai. Kiekvienoje ALKYMER kapsulėje (410 mg) yra 250 mg ryklių kepenų aliejaus, kuriame alkilglicerolių kiekis sudaro ne mažiau 20 % (50 mg). Pagaminta Švedijoje.
IŠSAUGOKITE GYVENIMO KOKYBĘ!

-35%



VIRIDIAN

Maisto papildai

FaringO spray | -30%





Maisto papildai
Faringospray KIDS, 20 ml - NAUJIENA! Natūralus, švelnios formulės purškalas gerklei sukurtas specialiai vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę sukurdami švelnų barjerą, kuris ramina sudirgimą. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
Faringospray ir Faringospray apelsinų skonio, 20 ml - natūralūs purškalai gerklei su šaltalankiais ir medetkomis skirti kasdienei burnos, gerklės ir ryklės gleivinės priežiūrai. Dygliuotasis šaltalankis padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos gleivinės būklę, o aliejinė produkto forma padeda sukurti apsauginį sluoksnį bei sudrėkinti sudirgusią gleivinę. Klasikinio arba apelsinų skonio. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių.
Faringo's ledinukai, N5 - natūralios sudėties šaltalankių ledinukai su vitaminu C. Imuniteto palaikymui - dygliuotasis šaltalankis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Gleivinės drėkinimui - dygliuotasis šaltalankis padeda drėkinti gleivinę ir palaikyti normalią jos būklę. Švelnus skonis ir patogi forma, pritaikyta mažosioms rankelėms. Rekomenduojama nuo 4m amžiaus.

1+1



ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS

Pagalba nervų sistemai
Maisto papildai.
Sukurta fitoterapijos ekspertų pasitelkiant mokslą ir tradicijas nuo 1883 m.

1+1



EMILI FITO ARBATOS

Kvapnios Emili Fito arbatos suaugusiems ir vaikams.

FIGURA

FIGURA 1 su senos lapais – 20 pak. po 3 g.
FIGURA 2 su šaltekšnio žieve 20 pak. po 3 g.
FIGURA 3 su kinrožės žiedais 20 pak. po 3 g.

-30%

~~6,69€~~ 4,68€



MIRAMILE®TONSIL

Burnos ir gerklės purškalas
Medicinos priemonė, 30 ml
Miramile Tonsil – burnos ir gerklės purškalas net su 8-iais aliejais: šaltalankių, miros, medetkų, apelsininių citrinmedžių, karčiųjų migdolų aliejais, čiobrelių bei pipirmėčių eteriniais aliejais padeda užkimus, mažina uždeginiuius gleivinės simptomus, palaiko gleivinės drėgmę, apsaugo sudirgintą gerklę nuo išorinių žalingų veiksnių ir patogenų. Tinka ir vaikams nuo 2 metų.

-20%

~~6,99€~~ 5,59€



MIRAMILE® KIDS

Burnos ir gerklės sirupas vaikams
Medicinos priemonė, 100 ml
Malšina gerklės skausmą ir palengvina kosulį.
Svilarožių ekstraktas, glicerolis bei ksantano lipai sukuria apsauginę plėvelę, kuri padengia ir saugo sudirgusią gleivinę bei padeda atkurti natūralias jos funkcijas.
Su čiobrelių, šeivamedžių ir juodųjų serbentų ekstraktais.
Tinka vaikams nuo 1 metų.
Patiks net mažiausioms gerklytėms!

-35%

~~7,79€~~ 5,06€



„OLEFAR® DUO“ OIL SPRAY

Med. priemonė, purškalas, 20 ml
„Olefar® DUO“ Oil Spray naudojimas sumažina burnos ertmės ir ryklės gleivinės uždegimą.
Sudėtis: šaltalankių aliejus, medetkų aliejus, cinamono aliejus, arbatmedžio aliejus, pipirmėčių aliejus. Aliejaus pagrindu sukurtą „Olefar® DUO“ Oil Spray sudaro natūralūs aliejai, padengiantys burnos ertmę ir ryklę. Šis preparatas padeda išlaikyti drėgną ir elastingą gleivinę, sumažina diskomfortą, skausmą bei perštėjimo ir dirgimo pojūtį gerklėje.

-30%



LIVSANE ARBATOS

Aukštos kokybės arbata LIVSANE yra pakuojama į dviejų kamerų arbatos maišelius, kurie dar supakuojami atskirai, kad išsaugotų arbatos šviežumą.

-40%

~~6,99€~~ 4,19€



LIVSANE gerklės pastilės su islandine kerpe, N40

Maisto papildas.
Vaistinė medicininė priemonė sausam kosuliui ir užkimimui gydyti. Su Islandine kerpena ir vitaminu C. Juodųjų serbentų - mėtų skonio. Be glitimo, laktozės ir cukraus. Tinka vegetarams ir veganams.

-30%



AROMATIKA

Aliejams ir aliejaus mišiniams.

-20%

~~1,95€~~ 1,56€



DINADAX

Maisto papildai

DINADAX ACTIVE. Kramtomos lazdelės su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais ir bičių pieneliu. DINADAX ENERGY. Kramtomos lazdelės su bičių pieneliu ir vitaminais. DINADAX SAPIENS. Kramtomos lazdelės su cholino bitartratu, Omega 3, linolo ir oleino rūgštimis, ir vitaminais.

-20%

Perkant 2 prekes ir daugiau



Kvėpavimo takams

DR.THEISS

Maisto produktai, 75 g

Įvairių rūšių: liepžiedžių ir citrinų; eukaliptų su mentoliu; apelsinų ir šalavijų; šalavijų ir melisų; šalavijų ir medaus.

-40%



LIVSANE PASTILĖS

Maisto papildai

LIVSANE citrinos skonio ledinukai, be cukraus 75 g

LIVSANE eukalipto ir mentolio skonio ledinukai, be cukraus 75 g

-35%



MIRAMILE® AUGALINĖS PASTILĖS

Maisto papildai, 12 pastilių

Miramile augalinės pastilės – gerklei, imunitetui, kvėpavimo takams.

Miramile Strong – stiprios sudėties augalinės pastilės, malonaus apelsinų, švelniai juntamų pipirmečių skonio.

Sudėtyje: beta gliukanai, cinkas, eteriniai aliejai (miramedžių, imbierų, gvazdikmedžių), medus, propolio ekstraktas, vitaminas C bei mentolis.

Gvazdikmedis, imbieras ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą.

Cinkas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Rekomenduojamos suaugusiesiems ir vaikams nuo 3 metų.

Ledinukams

-50%

-25%



SALVIASEPT

Med. prekės: SALVIASEPT SPRAY, gerklės purškalas, 20 ml; SALVIASEPT SPRAY KIDS, gerklės purškalas, 20 ml; SALVIASEPT kids gerklei, 6 ledinukai; SALVIASEPT kids kosuliui, 6 ledinukai; SALVIASEPT ACUT gerklės pastilės be cukraus, 12 vnt.; SALVIASEPT ACUT gerklės pastilės, 12 vnt.

Medicinos priemonių linija „SALVIASEPT", kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kerpenų ekstrakto, padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei perštėjimą, ramina sudirgusią gleivinę ir padeda gydant tonzilių, gerklės bei burnos gleivinės uždegimą, skausmą po tonzilių pašalinimo. Nanosidabras apriboja mikroorganizmų plitimą dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio.„Salviasept" spray KIDS purškalas skirtas vaikams nuo 2 m. „Salviasept" spray purškalas skirtas suaugusiesiems ir vaikams nuo 7 metų. „Salviasept kids" gerklei: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto, šalavijų ekstrakto, juodavaisių aronijų uogų sulčių, vaistinių svilarožių šaknų ekstrakto, vitamino C. Salviasept kids" užtikrina gerklės skausmo, perštėjimo ir sausumo mažinimą bei rijimo lengvinimą. „ Salviasept kids" kosuliui: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto, vaistinių svilarožių šaknų ekstrakto, čiobrelių ekstrakto, džiovintų juodavaisių aronijų uogų ekstrakto, vitamino C. „Salviasept kids" negalima vartoti vaikams iki 3 metų. Vartojimas: ledinukus „Salviasept kids" galima vartoti 1–3 kartus per dieną. SALVIASEPT ACUT 12 čiulpiamųjų pastilių. Čiulpiamosios pastilės, kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kerpenų ekstrakto. Nanosidabras yra žinomas dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio. Padeda gydyti gerklės uždegimą, kurį sukelia bakterinės ir virusinės infekcijos. SALVIASEPT ACUT BE CUKRAUS vartojimas: vartokite ne daugiau kaip 3 pastiles per dieną. Čiulpkite lėtai. SALVIASEPT ACUT pastilės skirtos vartoti tik suaugusiems asmenims.

-20%

~~6,99€~~ 5,59€



DECATYL™ NATURAL

Maisto papildas, 12 pastilių.

„Decatyl™ Natural" pastilių sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėtės, vaistinės svilarožės) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, suteikti raminantį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygoms. Šio produkto sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėtės, vaistinės svilarožės) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, taip pat suteikti malonų raminantį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygoms. Produkto sudėtyje nėra cukraus, dirbtinių skonio stipriklių, dirbtinių dažiklių bei konservantų. DCTL-LT-00024

TINKA VARTOTI VAIKAMS NUO 4 METŲ. BE CUKRAUS.

Imuninei sistemai

-20%



SAMBUCUS

„Sambucus Kids" sirupas, 120 ml;

„Sambucus Kids" guminukai, N60.

Maisto papildai, maisto produktas

Juoduogiai šeivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

1+1

8,79€



- **Palengvina kvėpavimą**
- **Veikia raminančiai**
- **Gerina miegą**

RINOQUICK

Medicinos priemonė, 5 priklijuojami pleistrai.

Pleistrai naudojami kvėpavimui pagerinti ir palengvinti diskomfortą, atsirandantį dėl nosies užgulimo. RinoQuick pleistro sudedamosios dalys (natūralūs eukaliptų, pipirmėčių ir levandų aliejai) sutraukia nosies ertmės kapiliarus ir taip slopina nosies sekreciją. Todėl RinoQuick pleistrai padeda sumažinti nosies užgulimą. RinoQuick pleistrai klijuojami tiesiai ant drabužių ir gali būti naudojami suaugusiesiems ir vyresniems nei 2,5 metų vaikams. Veikia net 6-8 valandas. Taip pat gerina miegą, veikia raminančiai.

NAUJIENA



NUO 7,19 €

LARYXIN

Nereceptiniai vaistai
Laryxin Strawberry 5 mg/1 mg suslėgtosios pastilės, N24
LARYXIN Lemon 2 mg/0,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas)

Sudėtis: suslėgtosios pastilės: vienoje suslėgtojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato; burnos gleivinės purškalas: viename išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digliukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. **Indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suslėgtosios pastilės: leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Suaugusiesiems – po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Burnos gleivinės purškalas: vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiesiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** Vaistą vartokite tik trumpalaikiam skausmo ir dirginimo malšinimui. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3-4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidų grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo reflekso valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. Laryxin Lemon suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrio (dėl mažko kiekio jis beveik neturi reikšmės). Laryxin Menthol suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). Laryxin Menthol burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96%) ir levomentolio. Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data: 12/2024.



NUO 7,19 €

LARYXIN

Nereceptiniai vaistai
Laryxin Lemon 5 mg/1 mg suslėgtosios pastilės, N24x1
Laryxin Menthol 5 mg/1 mg suslėgtosios pastilės, N24x1
Laryxin Menthol 2 mg/0,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30 ml N1

Sudėtis: suslėgtosios pastilės: vienoje suslėgtojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato; burnos gleivinės purškalas: viename išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digliukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. **Indikacijos:** gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suslėgtosios pastilės: leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Suaugusiesiems – po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 5 pastiles per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Burnos gleivinės purškalas: vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiesiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. **Kontraindikacijos:** alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** Vaistą vartokite tik trumpalaikiam skausmo ir dirginimo malšinimui. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3-4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidų grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo reflekso valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. Laryxin Lemon suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrio (dėl mažko kiekio jis beveik neturi reikšmės). Laryxin Menthol suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti mažiems vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). Laryxin Menthol burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96%) ir levomentolio. Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio. Reklamos teksto parengimo data: 12/2024.



NUO 6,99 €

SEPTABENE

Nereceptiniai vaistiniai preparatai. 3 mg/1 mg kietosios pastilės.

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius - skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. **Dozavimas suaugusiesiems.** Rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus **vieną arba du kartus.** Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **6-12 metų vaikams.** Rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, kadangi jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Teksto peržiūros data: 2024-03-15. **Tavo gerklė – tavo jėga!**



NUO 9,29 €

TANTUM VERDE®

1,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 30ml
3 mg, 20 kietųjų pastilių
Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml burnos gleivinės purškalo yra 1,5 mg benzidamino hidrochlorido. Vienoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido. **Indikacijos:** lokaliam simptominiam skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti į burną ir ryklę. **Purškalas:** reikia purkšti 2 – 6 kartus per parą. Suaugusiems: po 4 – 8 išpurškimus; 6 – 12 metų vaikams: po 4 išpurškimus; 3 – 5 metų vaikams: po 1 išpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus). **Pastilės.** Suaugusiems: 1 kietoji pastilė 3 – 4 kartus per parą. 6 – < 12 metų vaikams galima vartoti tik suaugusiam žmogui prižiūrint, jaunesniems negu 6 metų vaikams vartoti negalima. **Kontraindikacijos:** alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. **Specialūs įspėjimai:** per apsirikimą pavartojus (pvz., vaikui) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reikia saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 02 11.



Nuo gerklės skausmo

10,99 €

POLOVOX

8,75mg dozėje burnos gleivinės purškalas, 15 ml.
Nereceptinis vaistas.

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Viename išpurškime yra 2,92 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpurškimą neįkvėpti. PoloVox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** PoloVox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedant vartoti PoloVox: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sistemine raudonąja vilklige ar mišria jungiamojo audinio liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data 2026 05 mėn.



JOX

85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas) 30 ml
Nereceptinis vaistinis preparatas

8,89 €

Jox 85/1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas). 1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. I**ndikacijos.** Papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukelto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. Jox purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 metų vaikai. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems ir vyresniems kaip 8 metų vaikams įprastinė dozė - purkšti 2 4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 valandas), purkšti ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnė kaip 4 valandos. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių preparatų; jaunesniems kaip 8 metų vaikams (dėl farmacinės formos).

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu Jox atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, Jox purškalą reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, Jox vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti tik būtinu atveju. Reklaminio teksto parengimo data 2024-07. OTC-LT-00080
„Jox" – vienintelis toks!

NUO 4,10 €

FLAVAMED



Nereceptinis vaistas.
Flavamed 30 mg tabletės,
Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės.
Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas.
Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas

Flavamed 30 mg tabletės. Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės. Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2 -3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30 mg tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Flavamed 60 mg šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai. Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamajame tirpale bei šnypščiosiose tabletėse yra sorbitolio bei benzenkarboksirūgšties. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Flavamed šnypščiojoje tabletėje yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač nėščioms ar žindančioms moterims,asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos.

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC", Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com
LT-FLA-7-2025_MFLOW, 2025/12

Skystina gleives ir lengvina atsikosėjimą

ACC. PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

NUO 5,49 €

ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių
ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių
ACC 20 mg/ml geriamasis tirpalas, 100 ml
ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, 20 tablečių
ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės, 10 tablečių
ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės, 6 tabletės
Nereceptiniai vaistiniai preparatai



Veikliosios medžiagos, stiprumas: *ACC 100 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 200 mg milteliai geriamajam tirpalui, ACC 20 mg/ml geriamasis tirpalas, ACC 200 mg šnypščiosios tabletės, ACC 600 mg šnypščiosios tabletės,* acetilcisteinas. ***Terapinės indikacijos:*** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. ***Vartojimo būdas ir dozavimas:*** 2-5 m. vaikams 100 mg 2 k/d; 6-14 m. vaikams 200 mg 2 k/d; vyresniems kaip 14 metų 600 mg acetilcisteino. Vartoti per burną. ***Kontraindikacijos:*** jaunesni nei 2 metų vaikai; *ACC Long 600 mg* šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 metų vaikams; padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba pagalbinėms medžiagoms. ***Specialūs įspėjimai:*** bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069660. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.



NUO KOSULIO

NUO 4,41 €

STOPTUSSIN

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
STOPTUSSIN FYTO, sirupas, 100 ml
STOPTUSSIN, 20 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: sirupas: vaistinių čiobrelių skystasis ekstraktas, paprastųjų čiobrelių skystasis ekstraktas, gysločių skystasis ekstraktas; tabletės: 4 mg butamirato divandenilio citrato ir 100 mg gvajfenezino. **Terapinės indikacijos: sirupas:** atsikosėjimui lengvinti, kai kosulys yra sukeltas peršalimo; tabletės: slopina sausą, dirginantį kosulį. **Vartojimo būdas ir dozavimas: sirupas:** 1–4 m. amžiaus vaikams: 2,5–15 ml sirupo 3 kartus per parą po valgio (kad nedingtų apetitas), prižiūrint gydytojui; 4–12 m. amžiaus vaikams: 2,5–15 ml sirupo 3 kartus per parą po valgio (kad nedingtų apetitas); vyresniems kaip 12 m. paaugliams, suaugusiems ir senyviems pacientams: 15 ml sirupo ne daugiau kaip 4 kartus per parą. Tabletės: dozę reikia apskaičiuoti pagal kūno svorį. Jei kūno svoris mažesnis negu 50 kg – 0,5 tabletės 4 kartus per parą; 50–70 kg – 1 tabletė 3 kartus per parą; 70–90 kg – 1,5 tabletės 3 kartus per parą; didesnis negu 90 kg – 1,5 tabletės 4 kartus per parą. Tarp dozių būtina daryti 4–6 val. pertrauką. **Kontraindikacijos:** sirupas: jeigu yra alergija paprastiesiems arba vaistiniams čiobreliams, gysločiams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje); jeigu yra padidėjęs jautrumas kitiems notrelinių (Lamiaceae, Labiatae) šeimos augalams; vaikams iki 1 m. amžiaus. Tabletės: jeigu yra alergija gvajfenezinui, butamirato citratui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje); jeigu yra raumenų silpnumas (sergate sunkiąja miastenija); nėštumo laikotarpiu. **Specialūs įspėjimai:** sirupas: jeigu pacientas yra 1–4 m. amžiaus. Šios amžiaus grupės pacientams kosulys šiuo vaistu gali būti gydomas tik prižiūrint gydytojui; jeigu Jums yra įgimtas fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės-izomaltazės stygius. Prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju; jeigu atsiranda dusulys, karščiavimas, kraujingų skreplių arba kosulys išlieka ilgiau nei savaitę, kreipkitės į gydytoją. Tabletės: „Stoptussin" sustiprina vaistų nuo peršalimo bei skausmą malšinančių vaistų, kuriuose yra paracetamolio ir acetilsalicilo rūgšties, taip pat vaistų, kurie slopina centrinę nervų sistemą (pvz., raminamųjų, migdomųjų), alkoholio bei skeleto raumenis atpalaiduojančių vaistų poveikį. Vartojant gvajfenezino, tariamai gali padaugėti vanilmigdolų ir 5-hidroksiindolacto rūgšties kiekis šlapime, kai vartojamas reagentas nitrozonaftolis. Dėl šios priežasties šio vaisto vartojimą reikia nutraukti 48 val. prieš šlapimo paėmimą minėtam tyrimui. Reklamos teksto parengimo data 2025-01-13. OTC-LT-00087



NUO 8,59 €

OSCILLOCOCCINUM

Virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas.
Homeopatinis vaistinis preparatas, 6 arba 30 vienadozių talpyklių su piliulėmis

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (Anas Barbariae) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. Indikacijos: virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti kliniškai patikrintas priemones. Vartojimo būdas ir dozavimas. Dozė priklauso nuo ligos stadijos: inkubacijos laikotarpiu ir simptomams prasidėjus – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras. Vienos dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Neleisk virusams tavęs įveikti! Išbandyk „Oscillococcinum"!

-25%



BRONCHONORM

Maisto papildai

Bronchonorm Caps, N15 sudėtyje yra aguonų, kurios padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.

Bronchonorm, 250 ml yra pagamintas svarainių sulčių pagrindu. Sudėtyje esantys vaistinių čiobrelių, plačialapių gysločių ir paprastosios pušies sausieji ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją.

Jūsų kvėpavimo takų funkcijai palaikyti!

5,99 €



HERBION KIETOSIOS PASTILĖS

Nereceptinis vaistas

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5:1).

Terapinės indikacijos: Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiesiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams.

Dozavimas ir vartojimo būdas: Įprasta dozė 6-11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiesiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Vartoti ant burnos gleivinės. Leisti pastilei lėtai ištirpti burnoje. Jei simptomai išlieka šio vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip savaitę, pacientui būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems gebenių šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas.

Specialūs įspėjimai: Jei pasireiškia dispnėja (dusulys), karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. Gastritu ar skrandžio opalige sergantiems ligoniams vaistinio preparato rekomenduojama vartoti atsargiai.

Reklamos teksto parengimo data: 2023 12 07.



4 79 €

SEPTANAZAL®

Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:
- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.
Septanazal suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegininė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Reklamos teksto parengimo data 2023 10 16.
Atkemša užgulusią nosį ir švelniai gydo išsausėjusią nosies gleivinę!



NUO 4 49 €

OLYNTH

Olynth® HA 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml.
Olynth® HA 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
Olynth® 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
Olynth® 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml
Nereceptiniai vaistai

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 mililitre tirpalo yra 0,5 mg arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas sergant rinitu ar sinusitu. „Olynth® HA 0,5 mg/ml“ skiriamas vartoti 2-12 metų vaikams ir paaugliams. „Olynth®, 1 mg/ml“ ir „Olynth® HA, 1 mg/ml“ skiriamas vartoti suaugusiesiems bei 12 metų ir vyresniems paaugliams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** purkšti po vieną įpurškimą arba lašinti po vieną lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Vartoti ne ilgiau kaip 7 dienas. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač pacientams, sergantiems uždaro kampo glaukoma; sausasis nosies gleivinės uždegimas; jei per nosį ar burną buvo atlikta smegenų operacija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba per pastarąsias dvi savaites; vaistų, galinčių padidinti kraujospūdį, vartojimas; pacientai, sergantys uždegimu, susijusiu su nosies membranos suplonėjimu (atrofiniu rinitu) arba uždegimu, kurį sukėlė padidėjęs nosies kraujagyslių jautrumas (vazomotoriniu rinitu); „Olynth® HA 0,5 mg/ml“ negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams; „Olynth®, 1 mg/ml“ ir „Olynth® HA, 1 mg/ml“ negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai:** prieš pradėdami vartoti šį vaistą pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, jei jautriai reaguojate į simpatomimetikus (į adrenaliną panašius vaistus), turite širdies ar kraujagyslių problemų, padidėjusį kraujo spaudimą, sergate hipertiroze, cukriniu diabetu, antinkščių ligomis ar jei Jūsų prostata yra padidėjusi.
Teksto peržiūros data: 2026 09. LT-OLY-2026-356491.
Greitas palengvėjimas nosiai ir sinusams.



6 39 €

OLYDEX

Olydex 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
Nereceptinis vaistas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo (tirpalo) yra 1 mg ksilometazolino hidrochloridо ir 50 mg dekspantenolio. Viename išpurškime yra 0,1 ml nosies purškalo (tirpalo), kuriame yra 0,1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 5,0 mg dekspantenolio. **Indikacijos:** nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimų gijimui skatinti, nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti, kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos gydyti. Olydex 1 mg/50 mg/ml skirtas vartoti suaugusiesiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** purkšti po 1 įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausojo uždegimo pažeista nosies gleivinė (sausasis rinitas), pro nosį (transsfenoidaliai) buvo atlikta hipofizės pašalinimo arba kita chirurginė operacija, susijusi su kietojo smegenų dangalo atidengimu. Olydex 1 mg/50 mg/ml negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartojant Olydex, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, jeigu Jūs ar Jūsų vaikas vartoja monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI) ar kitų vaistų, galinčių didinti kraujospūdį; jei yra padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro akies kampo glaukoma; serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas, išeminė širdies liga, aukštas kraujospūdis), feochromocitoma, medžiagų apykaitos liga (pvz., cukriniu diabetu, hipertireoze), porfirija; yra padidėjusi prostata. Vartojant netinkamai arba vartojant pernelyg didelį purškalo kiekį, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis, ypač vaikams. Šį vaistą vartojant ilgą laiką arba vartojant didesnes dozes gali pasireikšti nosies gleivinės lėtinis paburkimas arba galimas suplonėjimas (pažeidimas). Nevartoti šio vaisto ilgiau nei 7 dienas. Jeigu per 7 dienas Jūsų, arba per 3 dienas Jūsų vaiko savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vaikai vartoti vaistą gali tik prižiūrint suaugusiajam. Vengti šio vaisto tiesioginio sąlyčio su akimis.
Teksto rengimo data: 2026 09. LT-OLY-2026-356358.

Nuo slogos



6 29 €

GALATHENAL, 1 mg/50 mg/ml

Nosies purškalas, 10 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. **Terapinės indikacijos:** „Galathenal“ skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyroms iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu ir ūminiu prienosiniu ančių uždegimu (rinosinusitu). **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galathenal“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. **Kontraindikacijos:** šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rhinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Galathenal“, jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga; jeigu yra antinkščių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2026 05 mėn.
Atkemša nosį ir atstato pažeistą nosies gleivinę.

Papildomam ūminio ar lėtinio sinusito gydymui



8 83 €

CINNABSIN N

Homeopatinis vaistas. 40 tablečių

Veikliosios medžiagos: Cinnabaris D3 25 mg, Hydrastis D3 25 mg, Kalium bichromicum D3 25 mg, Echinacea D1 25 mg. Indikacijos. Cinnabsin N yra homeopatinis vaistinis preparatas papildomam ūminio ar lėtinio sinusito gydymui. **Indikacijos** pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaug. ir paaugliams nuo 12 metų ūminės ligos metu po 1 tabl. kas pusv./val. (iki 6 tabl./d.), kol pagerėja savijauta. Toliau po 1 tabl. 3 k./d. Gydant lėtinę ligą po 1 tabl. 3k./d. Vaikams nuo 2 iki 5 m. ūminės ir lėtinės ligos metu, vartoti 1/2 suaug. dozės. Vaikams nuo 6 iki 11 m., ūminės ir lėtinės ligos metu, vartoti 2/3 suaug. dozės. Nerekomenduojama vartoti šio vaisto su maistu ir gėrimais. Vartoti mažiausiai pusę val. prieš valgį ar pusę val. po jo. Rekomenduojama leisti tabletėms lėtai ištirpti burnoje. Mažiems vaikams tabletes galima ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliosioms medžiagoms, pvz., chromui, ežiuolei arba kitoms astrinių šeimos augalams, arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Esant progresuojančioms sisteminėms ligoms, pvz., tuberkuliozei, baltųjų kraujo kūnelių sisteminėms ligoms (pvz., leukemijai), autoimuninėms ligoms (uždeginiui jungiamojo audinio ligai, vadinamajai kolagenozei, išsėtinei sklerozei), imuniteto deficitui (pvz., AIDS), imunineto nusilpimui (pvz., po organų arba kaulų čiulpų persodinimo, chemoterapijos), ŽIV infekcijai. **Specialūs įspėjimai.** Pavartojus vaistų, kurių sudėtyje yra ežiuolės, gali atsirasti odos išbėrimas, niežėjimas, retais atvejais, veido patinimas, dusulys, galvos svaigimas ir kraujospūdžio kritimas. Jeigu padidėja seilėtekis, sumažinkite dozę arba nutraukite vaisto vartojimą. Kviečių krakmolas ir medžiagos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio (Cinnabaris), gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijų. Pasitarkite su gydytoju, jeigu patinsta veidas, karščiuojama, atsiranda stiprus galvos skausmas arba atsiranda papildomų negalavimų. Vartojant homeopatinį vaistą, iš pradžių būklė gali laikinai pablogėti (pirminis homeopatinis pablogėjimas). Tokiu atveju, nutraukite Cinnabsin N vartojimą ir pasitarkite su gydytoju.
Reklamos teksto parengimo data 2026.08.12.

HUMER

HUMER 150 SUAUGUSIESIEMS, izotoninis nosies tirpalas, 150 ml
HUMER 150 VAIKAMS, izotoninis nosies tirpalas, 150 ml
HUMER 050, hipertoninis nosies purškalas, 50 ml
HUMER jūros vanduo kūdikiams vienadozėse ampulėse, 18 vnt., 5 ml
HUMER SINUSITAS, nosies purškalas, 15 ml

NUO 10 19 €



Medicinos prekės. „Humer“ – 100% neskiestas jūros vanduo, turtingas mikroelementų, tinkamas kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Rekomenduojamas kasdienei nosies higienai, drėkina išsausėjusią gleivinę, palengvina nosies išpūtimą, padeda pašalinti virusus bei alergenus. Natūraliai atkemša užgulusią nosį. Visi produktai saugūs ir tinkami naudoti vaikams ir nėščiosioms ir maitinančioms moterims.„Humer“ vienadozės ampulės (5 ml x 18) – sterilus jūros vandens tirpalas kūdikių nosyčių priežiūrai.„Humer Sinusitas“ – trejopo poveikio natūrali (iš augalinių ekstraktų) priemonė numalšina sinusų skausmą, greitai atkemša nosį, paskatina sekreto ištekėjimą bei padeda pašalinti bakterijas ir virusus. Veiksmingumas patvirtintas tyrimais. Veiksmingumas patvirtintas mokslinias tyrimais. Saugus nėščiosioms ir vaikams nuo 1 metų.



NUO **3⁹⁹ €**

GRIPEX THERMAL

Nereceptiniai vaistiniai preparatai
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai
GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių
GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai
GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg, milteliai geriamajam tirpalui, 12 paketėlių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: (1 paketėlyje): „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 650/50/10 mg“: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. „Gripex Thermal 300/20/5 mg“: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. „Gripex Thermal 650/50/10 mg“ arba „Gripex Thermal 1000/100/12,2 mg“: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar küdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data į 2025.11.04. **„GRIPEX“. VEIKIU!**



NUO **6¹⁹ €**

COLDREX MAXGRIP

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
COLDREX MAXGRIP LEMON 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10 ir N5
COLDREX MaxGrip MENTHOL & BERRIES 1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10

Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas.
Vartojimo būdas: suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens.
Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: po 1 paketėlį kas 4-6 val., jei reikia. **COLDREX MAXGRIP LEMON; COLDREX MaxGrip MENTHOL & BERRIES:** Didžiausia paros dozė: 4 paketėliai per 24 val.
Specialūs įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Reino (Raynaud) fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio küno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vartojant negalima gerti alkoholinių gėrimų dėl galimo kepenų pažeidimo. Nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu vartoti negalima.
Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu; sergate širdies liga; sergate uždaro kampo glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; esate nėščia ar žindote küdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-06

Skausmui ir/arba karščiavimui mažinti



NUO **4⁷⁹ €**

EFFERALGAN

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.
EFFERALGAN, 80 mg, 10 žvakučių
EFFERALGAN, 150 mg, 10 žvakučių
EFFERALGAN, 30 mg/ml, geriamasis tirpalas vaikams, 90 ml

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: vienoje „Efferalgan“ žvakutėje yra 80 arba 150 mg paracetamolio; 1 ml „Efferalgan“ geriamojo tirpalo vaikams yra 30 mg paracetamolio. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** geriamasis tirpalas: tinka tik 3–32 kg svorio (maždaug nuo gimimo iki 12 metų amžiaus) vaikams. Dozė vaikams apskaičiuojama pagal küno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė – 60 mg/kg. Ji išgeriama per 4–6 kartus lygiais intervalais (t. y. po 15 mg/kg kas 6 val. arba po 10 mg/kg kas 4 val.); žvakutės: nuo 2 mėn. iki < 24 mėn. – 80 mg žvakutės kas 6 val.; nuo 24 mėn. iki < 3 metų – 150 mg žvakutės kas 6 val.; **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai, sunkus kepenų nepakankamumas, sunkios kepenų ligos. Žvakutės: viduriavimas, neseniai persirgtas tiesiosios žarnos arba analinės angos uždegimas, neseniai buvęs kraujavimas iš tiesiosios žarnos, yra alergija žemės riešutams ar sojai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku jeigu Jums yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų sutrikimas, sergate Žilberto sindromu, sunkia inkstų liga; yra anoreksija, kacheksija, bulimija, badavimas, dehidratacija, lėtinis alkoholizmas, esant gliukozės-6 fosfato dehidrogenazės trūkumui, atsiradus odos reakcijos požymių arba jei vartojate flukloksaciliną (antibiotiką) kartu su paracetamoliu ar paracetamolį ilgą laiką, dėl ko gali atsirasti metabolinė acidozė. Žvakučių sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus) (žr. kontraindikacijos), dėl geriamąjame tirpale esančio cukraus, sergantiems cukriniu diabetu, reikia atsižvelgti į vaisto paros dozę. Nevartokite kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio, NVNU, acetilsalicilo r., atsargiai vartoti su flukloksacilinu. „Efferalgan“ geriamajame tirpale vaikams yra sacharozės ir propilenglikolio. Ilgą laiką vartojant skausmą malšinančių vaistų pacientams, sergantiems lėtiniu galvos skausmu, gali atsirasti arba paūmėti galvos skausmas. Prieš šių vaistų vartojimą pasitarkite su vaistininku arba gydytoju. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.
Reklamos teksto parengimo data 2025-09-17. PM-LT-2025-9-5688



NUO **2⁵⁹ €**

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių; APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės;
APAP express, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių; APAP, 250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių.

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg“ yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP, 250 mg“ yra 250 mg paracetamolio. **Indikacijos:** simptominio lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Apap express, 500 mg“ minkštosios kapsulės: suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė– 3 000 mg) kas 24 valandas. „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg küno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai.** Prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaitinantiems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; yra hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistiniais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Teksto parengimo data:** 2025-03-31.
„APAP“. Ir tu vėl savo vėžėse.



Nuo skausmo ir peršalimo

6²⁹ €

SOLPADEINE

Solpadeine tabletės, 12 tablečių
Nereceptinis vaistas

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kofeino. **Terapinės indikacijos:** silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (sąnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems: po 2 tabletes, jei reikia, iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tabletių per bet kurias 24 val. 12–15 m. paaugliams: po 1 tabletę kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 m. paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradedami vartoti vaistą: jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūslė; jei vartojate vaistų nuo depresijos, arba kvėpavimo sutrikimų, pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jeigu esate arba kada nors buvote priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtų cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotireoze, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį spaudimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir flukloksaciliną. Gauta pranešimų apie sunkų sveikatos sutrikimą – metabolinę acidozę. Gali sukelti mieguistumą ar svaigimą. Jei taip nutiko, nevaldykite mechanizmų. **Kontraindikacijos.** Vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms, skausmą malšinantiems opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kuri sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikta tulžies latakų operacija; yra lėtinis vidurių užkietėjimas; vaikams, jaunesniems kaip 12 metų; malšinti skausmo vaikams ir paaugliams (0-18 metų) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-20.



7⁹⁹ €

Tonufen 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės

Nereceptinis vaistas, 12 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos stiprumas: vienoje „Tonufen“ dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. **Indikacijos:** trumpalaikiam simptominiam nosies ir ančių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinusitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletės per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praeityje pasireiškusios alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertireoze, cukriniu diabetu, uždaro kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. **Specialūs įspėjimai:** atsargiau reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praeityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudonaja vilklige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Teksto parengimo data:** 2025-09-17.

-20%
~~19,99€~~ 15,99€



WAYA STOPREFLUX®

MEDICINOS PRIEMONĖ GASTROEZOFAGINIO REFLIUKSO GYDYMUI
14 paketėlių (geriamosios suspensijos) | Ledinių citrinų skonio
Be glitimo | Be laktozės

WAYA StopReflux® paketėliai (skysta geriamoji suspensija) yra medicinos priemonė, skirta palengvinti gastroezofaginio refliukso simptomus, tokius kaip: rėmuo, rėmuo nėštumo metu, skrandžio rūgšties refliuksas, refliukso sukeltas ezofagitas, rijimo pasunkėjimas ir skausmingas rijimas. Dėl sinergetinio ingredientų veikimo jis mechaniškai apsaugo nuo refliukso greičiau nei per 3 minutes, malšina rėmenį ir apsaugo bei gydo gleivinę (hialurono rūgšties ir chondroitino sulfato poveikis).

Specialios paskirties maistas

-15%



CUBITAN

CUBITAN braškių skonio, 4X200 ml
CUBITAN vanilės skonio, 4X200 ml

Daug baltymų turintis specialios medicininės paskirties maisto produktas, kurio sudėtyje yra arginino, mikroelementų ir vitaminų.

NUTRIDRINK

NUTRIDRINK Protein, 4x125 ml - įvairių skonių.

Daug baltymų turintis, didelės energinės vertės specialios medicininės paskirties maisto produktas. Tik mitybos reguliavimui esant su liga susijusiam mitybos nepakankamumui.

ANTRAI PREKEI
-50%



GASTROTUSS®

Med. paskirties prekė

GASTROTUSS® BABY sirupas nuo refliukso kūdikiams ir mažiems vaikams, 180 ml
GASTROTUSS® sirupas nuo refliukso vaikams ir suaugusiems, N20
GASTROTUSS® kramtomosios tabletės nuo refliukso, N24
Mechaninio poveikio medicinos priemonė skirta gydyti gastroezofaginio refliukso ligą, mažinant su liga susijusius simptomus, pvz., rėmenį, kosulį, atpylinėjimą.
KAD SKRANDŽIO RŪGŠTIS LIKTŲ SKRANDYJE!

-20%
~~2,99€~~ 2,39€



MAXINUTRITION

MAXINUTRITION baltyminiai batonėliai, 45 g

Baltyminis užkandis.

-40%
~~14,99€~~ 8,99€



LIVSANE Lactoactive Immune, N20

Maisto papildas su gyvomis pieno rūgšties bakterijomis, fruktooligosacharidais ir cinku.

„lactoactive immune" sudėtyje yra pieno rūgšties bakterijų, kurios pasiekia žarnyną gyvos, ir cinko.
Cinkas padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą.

MĖMELIO

-10%

Fermentuotas

Gerosios bakterijos skystoje avižų terpėje

Sudėtyje yra net 12 gyvų bakterijų rūšių.
Skirtas žarnyno mikrofloros atstatymui.



Kovoja su virusais.
Tinka ir vaikams.

10²⁹ €



ENGYSTOL

Homeopatinis vaistinis preparatas
Nereceptinis vaistinis preparatas, 50 tablečių

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: *Vincetoxicum hirundinaria D6* 75 mg, *Vincetoxicum hirundinaria D10* 75 mg, *Vincetoxicum hirundinaria D30* 75 mg, *Sulfur D4* 37,5 mg, *Sulfur D10* 37,5 mg. **Terapinės indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.** Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). 6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną). 1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tabletę galima susmulkinti ir ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH" (Vokietija). **Teksto parengimo data** 2021-10-08.



NUO **2,79 €**

IBUMETIN

IBUMETIN® 200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
IBUMETIN® 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
IBUMETIN® 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių
Nereceptinis vaistas

Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. **Indikacijos:** trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1 – 2 tabletė(s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1 200 mg ibuprofeno. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Anksčiau buvo pasireiškusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, alerginis rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš viršikinimo trakto ar kitoks kraujavimas, yra polinkis kraujuoti, antikoaguliantų vartojimas, per mažas trombocitų kiekis kraujyje, infekcinė liga, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti draudžiama. **Specialūs įspėjimai:** specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę viršikinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas, jei vartojama kitų NVNU ar vaistų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistų, sergama cukriniu diabetu, sistemine raudonąja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Pasireiškus alerginės reakcijos į vaistą požymiams, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas. Teksto parengimo data: 2025-06-03. LT-IBUM-2400001



2,58 €

PARACETAMOL ACTAVIS 500 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių

Paracetamol Actavis 500 mg tabletės. Vienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, mėnesinių) malšinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems: įprastinė dozė yra 500–1000 mg kas 4–6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vienkartinė – 1000 mg. Paracetamol Actavis saugumas ir veiksmingumas vaikams, sveriantiems iki 50 kg, neištirti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholį, intervalas tarp dozių vartojimo turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia ištirti dėl simptomus sukėlusios priežasties. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Ilgalaikis arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažaida. Tokiu atveju sąmonės pacientas nepraranda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas (įskaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizinė anemija ar dehidratacija, sergantiems astma bei kurie piktnaudžiauja alkoholiu arba nuolat blogai maitinasi, paracetamolio patariama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antrą parą arba dažniau, gali pasireikšti arba sustipréti galvos skausmas. Pacientams, kuriems nustatytas mažas glutationo kiekis, paracetamolio vartojimas gali didinti metabolinės acidozės riziką. Dėl sudėtyje esančios laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Paracetamol Actavis sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima vartoti kviečiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). Nereceptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros data 2025 01 02. Reklamos parengimo data: 2025 04 04. OTC-LT-00094

Olfen

NUO **4,99 €**



Olfen 23,2 mg/g gelis, Olfen® 140 mg vaistinis pleistras.

1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako natrio druskos. Viename vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. **Indikacijos.** Lokalaus skausmo, sukelto (pvz., sporto traumos) dėl ūmaus sausgyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių panirimo, malšinimui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 14-os metų Olfen reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Priklausomai nuo gydomos pažeistos vietos dydžio, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio. Be gydytojo patarimo Olfen gelio negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. 14 metų ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas trumpalaikiam gydymui. Suaugusiesiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. Olfen pleistro jaunesniems kaip 15 metų pacientams naudoti nerekomenduojama. Jeigu vartojant gelį arba pleistrą per 3-5 dienas simptomai nepagerėja arba net pablogėja, būtina gydytojo konsultacija. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas diklofenakui ar bet kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai. Jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) buvo sukėlę astmos priepuolį, angioneurozinę edemą, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema. Paskutinis nėštumo trimestras. Draudžiama vartoti jaunesniems kaip 14 metų vaikams ir paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės** reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijos, niežulys arba dilgėlinė. Kai Olfen vartojamas dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. Olfen galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Venkite, kad nepatektų į akis bei kontakto su gleivinėmis. Nesinaudokite orui nepralaidžiais tvarsčiais. Olfen vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas. Vartojant šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šiuo vaistu gydomų odos vietų. Vaistinį pleistrą atsargiai naudoti senyviems pacientams, kadangi yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Vaistinio pleistro sudėtyje esantys propilenglikolis ir butilhidroksitoluenas gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Nereceptiniai vaistiniai preparatai. **Teksto peržiūros data.** Olfen 23,2 mg/g gelis - 2025 10 10; Olfen® 140 mg vaistinis pleistras - 2024 09 05. **Reklaminio teksto parengimo data:** 2025. 11. OLF-LT-00054

Kelio sąnario osteoartritui



27,39 €

PATVIRTINTA KLINIKINIAIS TYRIMAIS

PIASCLEDINE®

300 mg, 30 kietųjų kapsulių
Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 300 mg neesterifikuoto avokadų ir sojų aliejaus. **Indikacijos:** papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz.: skausmui ir apsunkintam judėjimui, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Vieną kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistą gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. **Kontraindikacijos:** alergija bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; alergija žemės riešutams arba sojai. **Specialūs įspėjimai:** vaistas skirtas tik suaugusiesiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimo požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas/paraudimas, veido patinimas ir (arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėminių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas) gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Jeigu esate gydomas antikoaguliantais, pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui prieš pradėdami vartoti vaistą. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-03-19

„PIASCLEDINE“ MAŽINA SKAUSMĄ IR PALENGVINA JUDĖJIMĄ!



9,09 €

VOLTAREN EMULGEL

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis
Nereceptinis vaistas

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** *Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams:* skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). *Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems):* sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt. Teksto parengimo data 2025/03. Prekių ženklai priklauso HALEON arba HALEON turi jiems licenciją. ©2025 HALEON arba licencijos turėtojas.



7,49 €

NUROFLEX

Nereceptinis vaistinis preparatas.
Kiekvienam vaistiniame pleistre yra 200 mg ibuprofeno.

Farmacinė forma. Bespalvis, lipnus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austo pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. **Terapinės indikacijos.** Nuroflex skirtas trumpalaikiam lokalaus skausmo, sukelto ūminio raumenų patempimo arba lengvų viršutinės ar apatinės galūnės sąnario aplinkos audinių traumų, simptominiam gydymui suaugusiesiems ar 16 metų ir vyresniems paaugliams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiesiems ar 16 metų ir vyresniems paaugliams:* viena dozė yra lygi vienam vaistiniam pleistrui. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra vienas vaistinis pleistras. Pleistras gali būti vartojamas bet kuriuo dienos ar nakties metu, tačiau jį reikia nuimti ir naują pleistrą vėl užklijuoti kitą dieną tuo pačiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi būti naudojamas visas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai. Jeigu praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė) vartojant ibuprofeno, acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant įtrūkusios ar pažeistos odos. Trečiasis nėštumo trimestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei simptomai išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmas gali pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeno, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijavus vaistinį pleistrą atsiranda odos išbėrimas. Pacientai turi būti įspėjami apie gydomos zonos reakciją stipriems natūralaus ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., įdegio lempos) gydymo metu ir vieną dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jautrumo šviesai riziką. Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, žarnų uždegimas ar hemoraginė diatezė, prieš pradedant vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtų būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė nepageidaujamų poveikių tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2026-10-20.



NUO 3⁴⁷ €

MEZYM

MEZYM 10000V skrandyje neirios tabletės, N10
MEZYM 20000V skrandyje neirios tabletės, N20
Nereceptinis vaistas.

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!*

Vienoje skrandyje neirioje Mezym 10000V tabletėje yra 80mg-111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip:10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją.
Vienoje skrandyje neirioje Mezym 20000V tabletėje yra 160mg-222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją.
MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Mezym vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia apsvarstyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado nejprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusiskundimų pobūdis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės tikslu atmesti žarnų pažeidimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym būtinai reikia būtinai nuryti nekramčius. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122)gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2-4 plėvele dengtos MEZYM 10000V tabletės arba 1-2 plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nuryjamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas.
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“, Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com
LT-MEZ-3-2025_MFLOW, 2025/12
MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*!
**kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų*



VIENINTELIS VAISTAS LIETUVOJE SU ANTIBIOTIKŲ VARTOJIMU SUSIJUSIO VIDURIAVIMO PROFILAKTIKAI.

NUO 8³⁹ €

ENTEROL® 250 mg

Enterol 250 mg milteliai geriamajai suspensijai.
Enterol 250 mg kietosios kapsulės
Saccharomyces boulardii CNCM I-745.
Nereceptinis vaistas.

Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. **Enterol vartojamas su antibiotikų vartojimu susijusio viduriavimo profilaktikai. Vartojimo būdas.** Kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinto gėrimo arba į maistą. Mažiems (iki 6 metų) vaikams kapsulių negirdyti, kad vaikas neužspringtų, bet jas atidarius turinį supilti į gėrimą ar maistą. Miltelių geriamajai suspensijai paketėlio turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas.** Suaugusiesiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė vyra 1 kapsulė arba 1 paketėlis vartojami vieną arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Pacientams, kuriems įstatytas centrinės venos kateteris pasitaikė pavienių sisteminės grybelinės infekcijos atvejų. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Kietųjų kapsulių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra laktozės monohidrato, fruktozės ir sorbitolio. **Enterol vartoti draudžiama** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač *Saccharomyces boulardii*; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydomas ligoninėje; jei esate kritinės sveikatos būklės, arba Jums yra įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas.
Vietinis registruotojo atstovas: Biocodex Oy Lietuvos filialas, Savanorių pr. 349, LT 51480 Kaunas, Lietuva. Tel. +370 37 408681. El. paštas info@biocodex.lt. **Reklamos parengimo data:** 2026 m. spalio mėn. 19 d. ID 4f159748



-30%

SALUTIL®

Maisto papildai
„Salutil Hydra“ – elektrolitų ir gliukozės mišinys, papildytas vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir cholinu. Tinka vartoti po įtemptos veiklos ar jaučiant nuovargį.
„Salutil Shots“ – gyvybingosios bakterijos, prebiotikai ir vitaminai lengvai atidaromuose vienadoziuose flakonėliuose. Vaikams nuo 3 metų.
„Salutil Forte“ – kiekvienoje kapsulėje yra 5 mlrd. gyvybingųjų bakterijų.
„Salutil Premium 9“ sudėtyje yra 9 mikroorganizmų padermių ir vitamino D. 2610_SB_Salutil_V01_LT
„Salutil“ – probiotikai ir elektrolitai Jūsų šeimai!



-20%
~~15,89€~~ 12,71€

SmectaGo – stabdo ir gydo viduriavimą, kur bebūtumėte!

SmectaGo®

Medicinos priemonė.
Paruošta vartojimui geriamoji diosmektito suspensija paketėliuose. Suaugusiųjų ir vyresnių kaip 8 metų vaikų ūminiam viduriavimui gydyti, ne ilgiau kaip 3 dienas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 3 dienas, pasikonsultuokite su gydytoju. Suaugusiųjų lėtiniam viduriavimui arba pilvo skausmui gydyti, ne ilgiau kaip 2 savaites nesikreipiant medicininės pagalbos.
Praneškite apie šalutinį poveikį gamintojo vietiniam atstovui Mayoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com.
Teksto parengimo data 2024-02-13.
Reklamos teksto parengimo data: 2026.01.02 SCGO-LT-2026-0015



Virškinimo sistemai

NUO 7⁴⁹ €

GUTTALAX®

GUTTALAX 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas)
(Natrio pikosulfatas) 15 ml, 30 ml
Nereceptiniai vaistiniai preparatai

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** GuttaLax vartojama, jei pacientas kenčia nuo vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10 - 20 lašų per parą. 4 - 10 metų vaikams: 5 – 10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio.
Teksto peržiūros data : 2024 m. gruodžio mėn. 2604_SB_Guttalax_V01_LT
UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.



NUO 7²⁹ €

DUPHALAC

Duphalac 667 mg/ml geriamasis tirpalas (200 ml, 500 ml, 1000 ml)
Laktuliozė. Nereceptinis vaistas
1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktuliozės (skystosios laktuliozės 667 g/l pavidalu). **Terapinės indikacijos.** Vidurių užkietėjimo (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydymas, sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos. Kepenų encefalopatijos (kepenų liga sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusį sąmoningumo lygį, įskaitant komą) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. Duphalac geriamąjį tirpalą galima vartoti atskiestą ar neatskiestą. Vieną dozę reikia nuryti visą iškart, ilgai nelaikant burnoje. Vieną kartą per parą vartojamą dozę reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant Duphalac, tiekiamą buteliuke, gali būti naudojama matavimo taurelė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė 15–45 ml, palaikomoji paros dozė 15–30 ml. 7–14 metų vaikams pradinė paros dozė 15 ml, palaikomoji paros dozė 10–15 ml. 1–6 metų vaikams pradinė paros dozė 5–10 ml, palaikomoji paros dozė 5–10 ml. Kūdikiams iki 1 metų pradinė paros dozė iki 5 ml, palaikomoji paros dozė iki 5 ml. Be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams (iki 14 metų amžiaus) Duphalac vartoti negalima. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai: suaugusiesiems pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet pagalbinei medžiagai. Galaktozemija. Virškinimo trakto nepraeinamumas arba dalinio nepraeinamumo sindromai, virškinimo trakto perforacija ar perforacijos rizika, uždegiminė žarnyno liga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Duphalac, jei Jums skauda pilvą dėl nepaaiškinamų priežasčių, jei negalite suviršinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Kai vartojama daug didesnė dozė hepatinei encefalopatijai gydyti, būtina atsižvelgti į tai, kad pacientas serga diabetu. Ilgą laiką vartojant nepritaikytomis dozėmis ir netinkamai vartojant vaisto, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsižvelgti į tai, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimosi refleksas. Duphalac sudėtyje yra yra laktozės, galaktozės, fruktozės ir sulfitų. Duphalac vartoti negalima, jei yra: galaktozės arba fruktozės netoleravimas, visiškas laktazės trūkumas, gliukozės–galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktuliozę turi vartoti atsargiai.
Reklamos teksto parengimo data: 2025 06 16.



NUO
3 49 €

NOLPAZA 20 mg

7 arba 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviro, nelfinaviro, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų bioloģinis prieinamumas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytais atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikeitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tabletėse yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų bioloģinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. **Reklamos teksto parengimo data.** 2024-09-17

NOLPAZA užgesina rėmenį ilgam!



3 49 €

OMEPRAZOLE INTELI 20 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 14 skrandyje neirių kapsulių

Omeprazole Inteli sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. Omeprazole Inteli mažina rūgšties kiekį Jūsų skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. Omeprazole Inteli vartoti negalima: jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Omeprazole Inteli. Omeprazole Inteli gali paslėpti kitų ligų simptomus, todėl tuojau pat pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu: be aiškios priežasties gerokai sumažėja kūno masė arba sutrinka rijimas; skauda pilvą arba nevirškina; vemiate maistu arba krauju; išmatos tampa juodos arba su kraujo priemaiša; pasireiškia stiprus arba nepraeinantis viduriavimas (nes vartojant omeprazolo, šiek tiek padidėja infekcinio viduriavimo rizika); pasireiškia kepenų sutrikimų. Neštumas ir žindymo laikotarpis. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Kaip vartoti Omeprazole Inteli. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg skrandyje neiri kietoji kapsulė vieną kartą per parą, kol simptomai išnyksta, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų simptomai, gali tekti skrandyje neirių kietųjų kapsulių vartoti 2-3 paras iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite Omeprazole Inteli vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reto, bet sunkaus šalutinio poveikio atvejų: staiga prasidėjo švokštimas, lūpų, liežuvio, gerklų ar kūno tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutriko rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, nosies, lytinių organų pūslėtumas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2024-04-29.

Rėmens ir rūgšties atpylimo gydymui



11 99 €

CARSIL 110 MG

Lėtiniam hepatitui, kepenų cirozei ir toksiniam kepenų pažeidimui papildomai gydyti.

Vaistinis preparatas, 30 plėvele dengtų tablečių

Carsil veiklioji medžiaga yra iš tikrojo margainio (Silybum marianum) sėklų išskiriama augalinės kilmės veiklioji medžiaga silimarinas. Silimarinas stabilizuoja kepenų ląstelės membraną apsaugodamas kepenis nuo kenksmingų poveikių ir padėdamas atsistatyti pažeistoms kepenų ląstelėms. Carsil sudėtis

• **Veikliojі medžiaga yra silimarinas.** Vienoje kapsulėje yra 200 – 275 mg Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus (margainių vaisių) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35-50:1), atitinkančio 110 mg silimarino, išreikšto silibininu. Ekstrakcijos tirpiklis: metanolis.

• **Pagalbinės medžiagos.** Kapsulės turinys: karboksimetilkrakmolo A natrio druska, povidonas K25, polisorbatas 80, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, manitolis, natrio laurilsulfatas, natrio-vandenilio karbonatas, magnio stearatas. Kapsulės apvalkalas. Korpusas: raudonasis geležies oksidas (E172), titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172), želatina. Dangtelis: juodasis geležies oksidas (E172), raudonasis geležies oksidas (E172), titano dioksidas (E171), želatina.

Kad Jūsų kepenys būtų sveikos!

Kepenims



NUO
11 89 €

ESSENTIALE FORTE N

ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių, 90 kietųjų kapsulių

ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Terapinės indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje srityje po šonkauliais, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietąsias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N" saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neištirti. Dėl šios priežasties „Essentiale forte N" neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N" neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N" gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. „Essentiale forte N" sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamos teksto parengimo data 2023-09. 2602_SB_Essentiale_V01_LT.

Maksimali pagalba kepenims!

Gerosios bakterijos

-25%
~~10,50€~~ 7,87€



ACIDOLAC® JUNIOR

Acidolac®Junior , 20 meškiuko formos tablečių

Acidolac®Junior braškių skonio; 20 meškiuko formos tablečių

Maisto papildai

Acidolac®Junior meškiuko formos tabletės sudėtyje yra gerųjų žarnyno bakterijų *Lactobacillus acidophilus La-14TM ir Bifidobacterium lactis Bl-04TM*, inulino ir vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: vyresniems kaip 3 m. vaikams ir suaugusiesiems vartoti po 1 meškučio formos tabletę 2 kartus per parą. Be sacharozės ir glitimo.

PAGALBA NUO RĖMENS!



5 59 €

NEXMEZOL

Nexmezol 20 mg skrandyje neirios tabletės

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo. **Terapinės indikacijos:** vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę per parą bet kuriuo paros laiku, valgio metu arba nevalgius. Tablečių nekramtyti ir netraiškyti. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas ezomeprazolui (taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui) ar pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** sudėtyje yra sacharozės. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601079720. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 07.



8 46 €

FORLAX FAST

Medicinos priemonė

Forlax Fast mikroklizma, skirta esant retkarčiais pasitaikančiam vidurių užkietėjimui suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams, kurios sudėtyje yra glicerolio, vandens ir polisacharidų iš vaistinės svilarožės, turinčių šalinimąjį, minkštinamąjį, drėkinamąjį ir raminamąjį poveikį. Priemonė minkština išmatas, palengvina išmatų pašalinimą ir mažina diskomfortą užkietėjus viduriams. Naudoti į tiesiąją žarną. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams. Pagal poreikį naudokite vieną mikroklizmą. Jei vidurių užkietėjimas nepraeina, skirkite 2 dozes iš eilės. Praneškite apie bet kokį rimtą įvykį, susijusį su medicinos priemone vietiniam atstovui Mayoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. **Teksto peržiūros data:** 2024 m. liepos mėn. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-04-07

FFAST-LT-2026-0001



LIVSANE

1+1 4,99€

LIVSANE LAŠAI ŠIRDŽIAI

Maisto papildas, 40 ml
Apyniai padeda nuraminti nervų sistemą. Valerijonas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą bei normalią protinę veiklą.



NUO 2,89 €

Trombozės profilaktikai

HJERTEMAGNYL®

HJERTEMAGNYL 75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių
HJERTEMAGNYL 150 mg, 30 arba 90 plėvele dengtų tablečių
Nereceptinis vaistinis preparatas.
Veikliojo medžiaga: 1 tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. **Indikacijos:** trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos (kraujotakos sutrikimo) priepuolio. Vaistas slopina trombocitų (kraujo plokštelių) agregaciją (sukibimą), todėl jo vartojama krešulių, susidariusių iš sukibusių kraujo plokštelių, atsiradimo rizikai mažinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens; įprastinė dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, jeigu yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargiai vartoti, jei pacientas serga bronchų astma, šienlige, nosies polipais ar kita lėtine kvėpavimo takų liga, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ir (ar) inkstų arba virškinimo trakto funkcijai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001s



NUO 1,69 €

VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS

Nervinės įtampos simptomams malšinti
Tradicinis augalinis vaistinis preparatas. Geriamasis tirpalas, 30 arba 50 ml
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Nervinės įtampos simptomams malšinti gerti iki 3 kartų per parą po 0,5–1 arbatinį šaukštelį. Miegui pagerinti gerti 1 arbatinį šaukštelį valandą ar pusę valandos prieš miegą. Jei reikia, galima gerti 2 kartus: vakare ir prieš miegą. Maksimali paros dozė: 4 vienkartinės dozės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 65 iki 70 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-20.



1,99 €

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukatžolių tinktūra, 0,34ml+0,33ml+0,33ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos parengimo data: 2018-08-27
GERINA ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJAS, YPAČ ESANT NERVINEI ĮTAMPAI.

RECEPTINIAI VAISTAI

ŠIRDŽIAI

KASDIEN

IKI -20%

Pasiūlymas galioja *BENU PLUS* lojalumo programos nariams. Pasiūlymas galioja receptiniams vaistams. Pasiūlymas taikomas prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą. Produktų sąrašo teiraukitės BENU vaistininko. Pasiūlymas negalioja receptiniams kompensuojamiesiems vaistams ir med. prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu bei kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. BENU vaistinė pasilieka teisę bet kada keisti pasiūlymo sąlygas.



-35%
~~19,99€~~ 12,99€

VENOLEGS
750 mg/75 mg milteliai N28

Maisto papildas kojų venoms ir pavargusioms kojoms.
Didelio kiekio flavonoidų (diosmino net 750mg, o hesperidino net 75mg), mineralų, vitaminų, kolageno ir 3 augalų ekstraktų kompleksas pavargusioms kojoms, kojų venoms stiprinti ir normaliai venų mikrocirkuliacijai.

- Paprastasis kaštonas padeda normaliai kojų venų mikrocirkuliacijai
- Didžioji dilgėlė padeda mažinti kojų sunkumo pojūtį, padeda normaliai venų funkcijai.
- Ginkmedis padeda normaliai kraujo mikrocirkuliacijai
- Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą.

Tik aktyviosios medžiagos!

Lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti.

NUO **7⁰⁶ €**



LILANDOR

Lilandor 80 mg, minkštosios kapsulės, N14
Lilandor 80 mg, minkštosios kapsulės, N28
Nereceptinis vaistinis preparatas.

Lilandor 80 mg minkštosios kapsulės, *Lavandula angustifolia Miller,* eterinis aliejus. Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skyčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.
LT-LIL-10-2025_MFLOW, 2025/12
Atgauk ramybę ir ramų miegą

Magvit – Jūsų magnio šaltinis

-15%
~~16,99€~~ **14,44€**



MAGVIT® PLATINUM

Raumenims, nervų sistemai, energijai!
Maisto papildas

Greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Tik 1 tabletė per parą.

Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir kartu su vitaminais B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Magnis, biotinas ir niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą.

Esant magnio trūkumui

NUO **10⁰⁹ €**



MAGNE B6

MAGNE B6, 470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių
MAGNE B6, geriamasis tirpalas, 10 ampulių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6); 10 ml paketėlyje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** „Magne B6®" skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo paketėlio turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 3–4 paketėliai, kuriuos reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 paketėliai per 2–3 kartus tarp valgymų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Magne B6®" medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. **Specialūs įspėjimai:** neštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. „Magne B6®" dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 m. vaikams. „Magne B6®" geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradedant vartoti „Magne B6®" preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, galūnių drebulys ir koordinacijos sutrikimų. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2024-08. 2602_SB_Magne_B6_V01_LT
MAGNE B6® padės įveikti magnio trūkumą!

NUO **6⁷⁹ €**



SEDATIF PC

Nervinio neramumo lengvinimas.
Homeopatinis vaistinis preparatas, 40/90 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: *Abrus precatorius 6 CH,* 0,5 mg, *Aconitum napellus 6 CH,* 0,5 mg, *Belladonna 6 CH,* 0,5 mg, *Calendula officinalis 6 CH,* 0,5 mg, *Chelidonium majus 6 CH,* 0,5 mg, *Viburnum opulus 6 CH,* 0,5 mg. **Indikacijos:** nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC" veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** šio vaistinio preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės stygius. Teksto parengimo data: 2020 03 01
Įveik stresą, kol stresas neįveikė tavęs – Sedatif PC

7⁷⁹ €



NEURORUBINE™ FORTE LACTAB™

Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 plėvele dengtų tablečių.

Neurorubine Forte Lactab plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). **Indikacijos.** Dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti Neurorubine Forte Lactab, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaičių būklę turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. *Vaikų populiacija.* Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neištirtas, todėl neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti L-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami tiamino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su Neurorubine Forte Lactab vartojant vaistus, surišančius skrandžio rūgštis (antacidus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros data.** 2024 02 01. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 m. sausis. NEUR-LT-00012

NUO **4⁹⁹ €**



NEUROMULTIVIT

Plėvele dengtos tabletės (20 arba 100 tablečių pakuotės).
Nereceptinis vaistinis preparatas.

Indikacijos. Neuromultivit yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. Kaip ir kiti, šie vitaminai yra nepakeičiamos maisto medžiagos, kurios žmogaus organizme savaime nesusidaro. Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Yra duomenų, kad vitaminas B1 pasižymi skausmą malšinančiu poveikiu. B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams gydyti. **Vartojimas.** Rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Pavieniais atvejais paros dozę galima padidinti iki 3 tabletių. Tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgymo ir užsigerti skysčiu. **Kontraindikacijos.** Retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svaigulys. Mažiau tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 dažniausiai reiškiasi požymiais odoje. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Neuromultivit vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei Neuromultivit medžiagai. Negalima vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas.** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Vietinis registruotojo atstovas: UAB „GL Pharma Vilnius", A. Jakšto g. 12, Vilnius. Tel. +370 5 261 0705. El. paštas: office@gl-pharma.lt



-15%

DR. LUIGI ŠLEPETĖS

Speciali avalynė (įvairių spalvų).
39-44 dydis.

Anatomiškai išformuotos šlepetės:
– padeda sumažinti kojų nuovargį ir skausmą;
– minkštas ir elastingas padas – puikiai amortizuoja;
– šlepečių viršutinė dalis pagaminta iš natūralių medžiagų (natūrali oda arba „frotte“ audinys).

Kiekvienai dienai. Kiekvienai mano versijai.

Pasiruošęs dienai.
365 kartus per metus.

LIVSANE



-30%
Perkant 2 prekes ir daugiau

Pleistrams ir tvarsčiams



TENA

IKI -20%



TENA

Nepriekaištingai slaugai ir higienai „TENA“
Sauskelnės, skalbiamos apsauginės kelnaitės, įklotai, paklotai ir odos priežiūros priemonės – tai būtinos priemonės šlapimo nelaikymui kontroliuoti. „TENA“ sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria ir sulaiko šlapimą viduje, todėl paviršius išlieka sausas ir nedirgina odos. Kvapo neutralizavimo sistema efektyviai apsaugo nuo nemalonaus kvapo atsiradimo. „TENA“ odos priežiūros priemonės švelniai valo ir drėkina net gležną, sausą ir pažeidžiamą odą. Patikrinta dermatologų.

IKI -40%



EVOLU

Inhaliatoriams, termometrams (infraraudonųjų spindulių, be gyvsidabrio), kraujospūdžio matuokliams ir pulsoksimetrams (ant piršto).



VISIEMS SENJORAMS VISADA NUOLAIDA

IKI -20%
Receptiniai ir nereceptiniai VAISTAI

-20%
• Maisto papildai
• Kosmetika
• Medicinos prekės

-30%
LIVSANE
Visai produkcijai

LIVSANE | Maisto papildai | Medicinos priemonės | Peršalimo produktai | Probiotikai | Burnos priežiūros priemonės

Pasiūlymas galioja *BENU PLUS* lojalumo programos nariams. Pasiūlymas galioja tik fizinėse vaistinėse. Nuolaidos netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms ir rinkiniams. Pasiūlymas taikomas prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą. Produktų sąrašo teiraukitės BENU vaistininko. Pasiūlymas negalioja receptiniams kompensuojamiesiems vaistams ir med. prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu bei kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. BENU vaistinė pasilieka teisę bet kada keisti pasiūlymo sąlygas.

IKI -40%



VIZIK

Medicinos priemonė

Akių lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims 10 ml. Be konservantų. Indikacijos: ramina susdirgusias ir paraudusias akis, drėkina akių paviršių. Sudėtis: dekspantenolis (provitaminasB5), karbomeras, bevandenė citrinos rūgštis, sorbitolis, injekcinis vanduo.

Akių lašai sausoms ir pavargusioms akims 10 ml. Be konservantų. Indikacijos: ramina ir drėkina akis, padeda palengvinti simptomus susijusius su pavargusiomis akimis. Sudėtis: 0,15 % natrio hialuronatas ir 2% dekspantenolis (provitaminas B5), natrio chloridas, natrio citratas, citrinos rūgštis, injekcinis vanduo.

Allergy, 10 ml. Sumažina uždegimą,apsaugo nuo alergenų.Sudėtis 0,15% natrio hialuronato ir 2% ektoino. Be konservantų.

Pirmą kartą atidarę buteliuką naudokite jį ne ilgiau negu 12 mėn.

AKIŲ DIRGINIMUI, AŠAROJIMUI LENGVINTI

PATOGI PAKUOTĖ

13,39 €



OCULOHEEL

Homeopatinis vaistinis preparatas, nereceptinis vaistinis preparatas. Akių lašai.

3 paketėliai, kurių kiekviename yra 5 vienadožės talpyklės po 0,45 ml tirpalo. **Veikliosios medžiagos.** Vienoje talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra Euphrasia D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg. **Indikacijos.** Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akyse pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel" akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 min. pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolės (*Echinacea*), prieš skiriant jo ilgesniam kaip 8 savaičių laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai.** *Pagalbinės medžiagos.* Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vienadozėje talpyklėje yra 2,81 mg fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolės (*Echinacea*), prieš skiriant jo pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficito, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima vartoti tik vieną kartą, t. y. kartą įlašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudotą talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. Reklamos teksto parengimo data 2026-05-14.

-20%



OCUTEARS® ALO+ AKIŲ LAŠAI, 10 ml
OCUTEARS® HYDRO+ AKIŲ LAŠAI, 10 ml

Medicinos priemonės

OCUTEARS® ALO+ – tai akių lašai su hialuronu ir alaviju be konservantų paraudusioms ir išsausėjusioms akims, po akių chirurginių operacijų. OCUTEARS® ALO+ sudėtyje esantis hialuronas (klampumas, molekulinė masė, pasiskirstymas akies paviršiuje) veikia taip pat kaip ir natūralios ašaros - regeneruoja, drėkina, sutepa ir saugo nuo išsausėjimo akies paviršių. Alavijas, kuris yra „Ocutears ALO+" sudėtyje pasižymi priešuždegininiu, antiseptiniu, žaizdų gijimą skatinančiu poveikiu – ypač tinka paraudusioms ir išsausėjusioms akims, po kataraktos, regėjimo korekcijos lazeriu ir kitų akių chirurginių operacijų. **OCUTEARS® ALO+ tinka naudoti asmenims, nešiojantiems visų rūšių kontaktinius lešius.**

„Ocutears® Hydro+" yra akių drėkinamasis tirpalas, kurio pagrindą sudaro labai koncentruotas tinklinės struktūros natrio hialuronatas (0,2 %), sukurtas sausų akių simptomams, akių diskomfortui ir ragenos apsaugai palengvinti. Šis preparatas yra sterilus ir be konservantų. Tinklinės struktūros natrio hialuronatas suteikia preparatui didelį elastingumą, užtikrindamas intensyvų akių paviršiaus drėkinimą ir didelį patvarumą, kas ilgam palengvina sausų akių simptomus, tokius kaip skausmas, deginimas, dilgčiojimas, svetimkūnio pojūčiai, akių nuovargis arba ašarojimas.

-20%



SYSTANE®

Medicinos priemonės.

SYSTANE BALANCE drėkinamieji akių lašai, 10 ml;
SYSTANE HYDRATION drėkinamieji akių lašai, 10 ml;
SYSTANE ULTRA MDPF drėkinamieji akių lašai, 10 ml.

-40%

Perkant 2 prekes ir daugiau



LIVSANE

Medicinos priemonės

Kontaktinių lęšių tirpalas „LENS CARE", 360 ml arba 100 ml;
Lęšių valymo servetėlės „LENS WIPES", 50 vnt.

Vitaminai akims

-25%

~~25,99€~~ 19,49€



SUPEROPTIC

Maisto papildas, 60 minkštųjų kapsulių

- Natūralus liuteinas FloraGlo ir zeaksantinas
- Omega-3 rūgštys, jų sudėtyje yra DHR
- Vitaminai: A, C, E ir B grupės
- Mineralai: cinkas, manganas, varis, selenas

Dėka sudedamųjų dalių SuperOptic padeda išsaugoti normalų regėjimą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartoti po 1 kapsulę per dieną.

Pilna apsauga tavo akims!

-25%

~~22,99€~~ 17,24€



NUTROF TOTAL

Maisto papildas

NUTROF Total minkštos kapsulės, N30

Maisto papildas akims „Nutrof® Total" siūlo „viskas viename" formulę. „Nutrof® Total"" buvo sukurtas specialiai tam, kad padėtų užtikrinti, kad akys bus aprūpintos reikalingomis medžiagomis ir išlaikys akių sveikatą, ypač vyresnio amžiaus pacientams ir rūkantiems. Įrodyta, kad visos „Nutrof Total" sudedamosios dalys padeda palaikyti akių funkciją: liuteinas ir zeaksantinas yra būtini tinklainės geltonosios dėmės apsaugai nuo oksidacinio streso ir senėjimo požymių bei gali padidinti regėjimo gebėjimus; omega-3 riebalų rūgštys palaiko tinklainės sveikatą; vitaminai C, D ir E, cinkas ir varis padeda apsaugoti ląstelių sudedamąsias dalis nuo oksidacinės žalos; cinkas padeda palaikyti normalų regėjimą; selenas yra pagrindinis antioksidantas, taip pat palaiko vitamino E ir cinko poveikį; resveratrolis turi stiprų priešuždegiminį ir antioksidacinį poveikį ir apsaugo tinklainės ląsteles nuo oksidacinio streso. „Nutrof® Total"" yra unikalus ingredientų derinys, sukurtas išlaikyti sveikas akis ir normalų regėjimą. Sudėtyje nėra konservantų. Reikalinga vartoti tik 1 kapsulę per dieną.

5,70 €



ACICLOVIR ACTAVIS 5% KREMAS

Nereceptinis vaistinis preparatas, 5 g
Aciclovir Actavis 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiesiems.* Aciclovir Actavis 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per Šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Aciclovir Actavis 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** Aciclovir Actavis 5% kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai Aciclovir Actavis 5 % kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Aciclovir Actavis 5 % kremu nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju aciklovirų galimybę. Pagalbinės medžiagos cetostearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Teksto peržiūros data.** 2023 04 03. OTC-LT-00093 **Reklamos teksto parengimo data.** 2025 04 01

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ su „ACIC“!

6,19 €



ACIC 5 % KREMAS

Nereceptinis vaistinis preparatas
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos:** odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kuriems pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ su „ACIC“!

15,79 €



ACIC 200MG TABLETĖS

Nereceptinis vaistinis preparatas
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro **Terapinės indikacijos:** anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po vieną tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė - 5 paros. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** po viruso pažeistos vietos palietimo, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069662. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 06.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ IŠ VIDAUS!

NUO 11,49 €



NICORETTE

Nereceptiniai vaistiniai preparatai. NICORETTE COOLMINT 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų; NICORETTE INVISIPATCH 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras, 7 vienetai; NICORETTE FRESHFRUIT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų; NICORETTE FRESHMINT 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų. Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra 15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. **Indikacijos:** vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus - mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. nicorette coolmint geriausia vartoti kartu su elgesio palaikymo programa. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 įpurškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimus iš karto, per 24 valandas neviršyti 64 įpurškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. **Specialūs įspėjimai:** prieš vartodami nicorette, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertiroze, virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklijuokite nicorette pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos teksto parengimo data: 2025 05. LT-NIC-2025-153428.

Metantiems rūkyti

23,39 €



NIQUITIN

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
NiQuitin 14 mg/ 24 val. transderminis pleistras
Nikotinas
Terapinės indikacijos. NiQuitin naudojamas nikotino abstinencijos simptomams, įskaitant nenumaldomą norą rūkyti, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Pleistrą klijuoti 1 k. per parą tuo pačiu laiku ant neplaukuotos, švarios, sausos odos ir laikyti 24 val. Po 24 val. pleistrą nuplėšti ir kitoje vietoje užklijuoti naują. 1 gydymo etapas: NiQuitin 21 mg/ 24 val. - 6 sav. 2 etapas: NiQuitin 14 mg/ 24 val. - kitos 2 sav. 3 etapas: NiQuitin 7 mg/ 24 val. - paskutinės 2 sav. **Specialūs įspėjimai.** Terapijos pradžioje ir jos metu visiškai negalima rūkyti. Jei kartu vartojama kitų vaistinių preparatų, gali prireikti koreguoti jų dozę. Ilgiausiai gali būti gydoma 10 savaičių. Vartoti tik pasitarus su gydytoju pacientams, sergantiems: širdies ir kraujagyslių ligomis, arterine hipertenzija, dermatitu, inkstų ar kepenų pažeidimu, hipertiroze, feochromocitoma, cukriniu diabetu, ezofagitu, burnos ir ryklės uždegimu, gastritu, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige. Taip pat jeigu buvo traukulių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vaikams iki 12 metų, nerūkantiems ar retkarčiais rūkantiems žmonėms, pacientams, neseniai patyrusiems miokardo infarktą, sergantiems nestabilia ar progresuojančia krūtinės angina, Prinzmetalio angina, sunkia aritmija bei neseniai turėjusiems smegenų kraujotakos sutrikimą. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026-04-15

Metantiems rūkyti

11,29 €



NIQUITIN

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
NiQuitin Mint 4 mg vaistinė kramtomoji guma
Nikotinas
Terapinės indikacijos. Priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nikotino nutraukimo simptomus, įskaitant potraukį rūkyti kai bandoma mesti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiesiems (18 metų ir vyresniems). NiQuitin Mint 2 mg yra tinkama surūkantiems mažiau nei 20 cigarečių per parą. NiQuitin 4 mg yra surūkantiems daugiau nei 20 cigarečių per parą. Paprastai turėtų būti vartojama 8–12 gabalėlių per dieną, maksimaliai iki 15 gabalėlių per dieną. Paprastai naudojama 2–3 mėnesius. **Specialūs įspėjimai.** Būtina pasitarti su gydytoju asmenims, neseniai patyrusiems miokardo infarktą, sergantiems nestabilia krūtinės angina, Princmetalo angina, širdies aritmijomis, hipertenzija, neseniai patyrusiems insultą, sergantiems cukriniu diabetu, inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimu, feochromocitoma, hipertiroidizmu, ezofagitu, burnos ar ryklės uždegimu, gastritu, skrandžio ar pepsine opa, esant ar buvus traukuliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vaikai iki 12 metų, nerūkantieji arba rūkantys retai. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026-04-15



4 69 €

LORATADINE ACTAVIS 10 MG TABLETĖS

Nereceptinis vaistinis preparatas

Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** *Suaugusiems:* 10 mg tab. 1 kartą per parą. *6 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, sveriantiems daugiau negu 30 kg:* 10 mg tabletė 1 kartą per parą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg vartoti 10 mg tablečių nerekomenduojama.

Loratadino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 2 metų vaikams nenustatyti. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti draudžiama, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Loratadine Actavis, jeigu sergate kepenų liga; Jums numatoma atlikti kokius nors odos mėginius dėl alergijos. Nevartokite Loratadine Actavis 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. To reikia, nes šis vaistas gali paveikti šio tyrimo rezultatus. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. OTC-LT-00107. **Teksto peržiūros data.** 2024 07 11. **Reklaminės medžiagos parengimo data.** 2026.02



NUO
5 07 €

OPEXA®

Bilastinas 20 mg N10, Opexa 20 mg burnoje disperguojamos tabletės
Nereceptinis vaistas.

Opexa® vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, parausdusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūslių arba dilgėlinės) gydymui. Rekomenduojama paros dozė yra viena Opexa 20 mg burnoje disperguojama tabletė. Tabletę reikia išgerti vieną valandą prieš valgymą arba praėjus dviem valandoms po valgymo arba sulčių gėrimo. Burnoje disperguojamą tabletę reikia įdėti į burną; seilėse ji greitai disperguojasi ir tampa lengvai nuryjama. Kitu atveju burnoje disperguojamos tabletės prieš vartojimą gali būti ištirpintos vandenyje. Opexa® vartoti draudžiama, jeigu Jums yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradedant vartoti Opexa, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir Jūs vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Nevartokite Opexa ilgiau nei 10 dienų nepasitarę su gydytoju. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Nustatyta, kad bilastino 20 mg dozė nesutrikdo suaugusiųjų gebėjimo vairuoti. Tačiau kiekvieno paciento reakcija į vaistą gali būti skirtinga. Todėl prieš vairuodami ar valdydami mechanizmus turite patikrinti, kaip šis vaistas Jus veikia. Reklama paruošta 2026 m. sausio mėn. LT-OPE-1-2026_MFLOW UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163

SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

BAYER

Bepanthen® produktų linija į egzemą linkusios odos sveikatai!

-25%



BEPANTHEN®

Bepanthen SensiControl® prausimosi gelis, 400ml

Kosmetikos priemonė. Kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH bei apsaugo natūralų odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.

Bepanthen SensiControl® kremas, 200ml

Kosmetikos priemonė. Kremas skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Unikali kliniškai patikrinta „Dermo-Defense" formulė praturtinta prebiotiku suteikia kasdienę odos apsaugą: palaiko odos apsauginę mikroflorą, stiprina odos barjerinę funkciją,užtikrina ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą ir nuramina sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūnui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai. CH-20250902-15.

„Compeed®"
GELBSTI DIENĄ

-20%



COMPEED®

Compeed® pūslių pleistrai ir Compeed® nuospaudų pleistrai. Medicinos priemonės.

Hidrokoloidinė technologija. Pleistrai nedelsiant malšina skausmą, kurį sukelia pūslės ir nuospaudos, apsaugo nuo trinties ir ją sumažina, skatina greitesnį žaizdų gijimą. Išlieka vietoje kelias dienas.
Įspėjimai: diabetikai prieš naudodami pleistrus turėtų pasitarti su gydytoju. Pleistrų negalima dėti ant užkrėstų žaizdų, jų naudoti pakartotinai ar karpyti.



NUO
6 19 €

Gydo ir apsaugo odą BEPANTHEN®
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
BEPANTHEN®, 50 mg/g, kremas, 30 g
BEPANTHEN®, 50 mg/g, tepalas, 30 g
BEPANTHEN® PLUS, 50 mg/5 mg/g, kremas, 30 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Bepanthen®" kremo ir tepalo yra 50 mg dekspantenolio; 1 g „Bepanthen® Plus" kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Terapinės indikacijos: „Bepanthen®" kremas ir tepalas: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu uždegimo malšinamuoju ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pvz., nedideliems pažeidimams (nedideliems nudegimams arba nubrozdinimams), odos sudirgimams, išbėrimui nuo sauskelnių, skausmingiems ir įtrūkusiems speneliams gydyti. „Bepanthen® Plus" kremas: lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Bepanthen®" kremas ir tepalas: pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato 1 ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. „Bepanthen® Plus" kremas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu 1 arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. Kontraindikacijos: „Bepanthen®" kremas ir tepalas: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „Bepanthen® Plus" kremas: alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkęs ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Bepanthen®" kremas ir tepalas: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. „Bepanthen® Plus" kremas: saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2025-11. CH-20251104-84

Laimei, yra „Bepanthen®".



5 24 €

Helmintox 125 mg/2,5 ml geriamoji suspensija, 15ml
Pirantelis. Nereceptinis vaistinis preparatas.

Helmintox yra parazitines kirmėles veikiantis preparatas. Juo gydomos spalinių askaridžių ir dvylikapirštinių ankilostomų sukeltos parazitinės ligos. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Spalinių sukeltos ligos ir askaridozės gydymas:Vidutinė dozė yra 10 – 12 mg/kg kūno svorio (didžiausia dozė 1 g). Ji geriama vieną kartą. Dvylikapirštinių ankilostomų sukeltos ligos: Pasireiškus sunkiai dvylikapirštinių ankilostomų sukeltai ligai, 2 - 3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20 mg/kg kūno svorio dozę (didžiausia paros dozė 2 g). Jei sergama lengva dvylikapirštinių ankilostomų sukelta liga (taip būna vietovėse, kur liga nepaplitusi), gali pakakti vienos 10 mg/kg kūno svorio dozės. **Kontraindikacijos.** Helmintox vartoti negalima:jeigu yra alergija piranteliui arba bet kuriai pagalbinei; jeigu yra alergija žemės riešutams ir sojai. **Specialūs įspėjimai.** Jei yra kepenų funkcijos sutrikimas, dozę reikia mažinti, kadangi nedidelei daliai pacientų buvo pastebėta laikino kepenų fermentų aktyvumo padidėjimo atvejų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Reklamos teksto parengimo data: 2026 - 05.

Helmintox 125 mg plėvele dengtos tabl, N6; Helmintox 250 mg plėvele dengtos tabl, N3
Pirantelis. Nereceptinis vaistinis preparatas.

Helmintox yra parazitines kirmėles veikiantis preparatas. Juo gydomos spalinių , askaridžių ir dvylikapirštinių ankilostomų sukeltos parazitinės ligos. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Šis vaistas skirtas suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 6 metų vaikams ir paaugliams, geriamas. Spalinių sukeltos ligos ir askaridozės gydymas: Vidutinė dozė yra 10 – 12 mg/kg kūno svorio (didžiausia dozė 1 g). Ji geriama vieną kartą. Dvylikapirštinių ankilostomų sukeltos ligos: Pasireiškus sunkiai dvylikapirštinių ankilostomų sukeltai ligai, 2 - 3 dienas reikia gerti per 1 ar 2 kartus 20 mg/kg kūno svorio dozę (didžiausia paros dozė 2 g). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Helmintox. jei yra kepenų funkcijos pakenkimas, gali reikėti vartoti mažesnę dozę. Tokiu atveju pasitarkite su gydytoju. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Reklamos teksto parengimo data: 2026 - 05.

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

-40%
Perkant 2 prekes ir daugiau



Rankų ir lūpų priežiūros priemonėms.

URIAGE
EAU THERMALE

-40%



Rankų ir lūpų priežiūros priemonėms.

-40%



Maitinamasis rankų kremas „CREME MAINS“, 40 ml
Balzamas sausoms ir suskilinėjusioms lūpoms „NUTRITION INTENSE“, 10 ml
Maitinamasis balzamas sausoms lūpoms „NUTRITION INTENSE“, 3,8 g

Eucerin®

-40%



Rankų kremas atopinei odai „AtopiControl“, 75 ml
Rankų kremas jautriai odai „PH5“, 75 ml
Pieštukas lūpoms „LIP ACTIVE“, 4,8 g

-40%

~~35,99€~~ **21,59€**



FILORGA

Lūpų balzamas su putlinančiu efektu „NUTRI-FILLER LIPS“, 4 ml

-40%

~~20,99€~~ **12,59€**



NOVEXPERT

NOVEXPERT Lip'Up putlinamoji lūpų priežiūros priemonė su hialurono rūgštimi, 8 ml

Cetaphil

-30%



Valomieji ir drėkinamieji produktai pažeistai ir jautriai odai.

URIAGE
EAU THERMALE

-40%



Kūno priežiūros linija „XEMOSE C8+“

-30%



***skineffect* maitinamasis dušo aliejus, 200 ml**
***skineffect* maitinamasis kūno pienelis, 200 ml**

-40%

Perkant už 11 Eur
ir daugiau



SVR TOPIALYSE HUILE LAVANTE, aliejinis kūno prausiklis nieztinčiai, itin sausai, atopiškai odai, 1000 ml

SVR TOPIALYSE GEL LAVANT balzaminis kūno prausiklis sausai ir į alergijas linkusiai odai, 1000 ml

-40%

~~30,49€~~ **18,29€**



NOREVA drėkinamasis kūno kremas „AQUAREVA“, 400 ml

LABORATOIRE
A-DERMA

IKI -30%



A-derma tikslas – atkurti, nuraminti ir apsaugoti visą jautrią odą, pasitelkiant aukštos kokybės dermokosmetikos produktus ir kliniškai patvirtintas formules.

DUCRAY
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES

-35%



DUCRAY kosmetikos linijai „DEXYANE“

Labai sausos ir į atopinį dermatitą linkusios odos priežiūrai.

APIVITA NATURAL PRODUCTS

-40%



Tepamos veido ir paakių kaukės

-50%



IDUN MINERALS

IDUN Minerals suteikiantis apimties ir ryškumo blastienų tušas MAGNA Nr. 5008, 13 ml

Lūpų pieštukai IDUN Minerals, įvairių spalvų 0,35 g

DUCRAY SCIENCE DERMATOLOGIQUE

-40%



DUCRAY MELASCREEN

Veido odos priežiūros priemonės.
Padeda mažinti pigmentinių dėmių matomumą.

Eucerin®

-40%



EUCERIN Hyaluron-Filler + Elasticity itin lengvos tekstūros dieninis kremas SPF 50, 50 ml
EUCERIN Hyaluron-Filler + Longevity Epigenetic dieninis veido kremas SPF 30 su Epicelline ir hialurono rūgštimi, 50 ml
EUCERIN Hyaluron-Filler + Longevity Epigenetic naktinis veido kremas su Epicelline® ir hialurono rūgštimi, 50 ml
EUCERIN Hyaluron-Filler Epigenetic veido serumas, 30 ml



Akcija galioja 2026 11 01 – 2026 11 30 *BENU PLUS* ir *Mano Rimi* lojalumo programų nariams. Nuolaida taikoma antrai tokiai pačiai arba pigesnei prekei. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.

TIK FIZINĖSE VAISTINĖSE BENU



-50%

~~8,89€~~ 4,44€

APIVITA

APIVITA rankų kremas su medumi, 50 ml



-50%

~~17,39€~~ 8,69€

URIAGE
EAU THERMALE

Veido kremas „XEMOSE C8+ VISAGE“, 40ml



-50%

JORDAN

JORDAN Kids 50 ml - dantų pasta vaikams 0-5 m.
JORDAN Junior 50 ml - dantų pasta vaikams 6-12 m.



-40%

~~19,19€~~ 11,51€

Eucerin

EUCERIN šampūnas sausai galvos odai su 5% šlapalu DERMOCAPILLAIRE 250 ml

EUCERIN kreminis šampūnas nuo sausų pleiskanų DERMOCAPILLAIRE 250 ml



DEKORATYVINEI KOSMETIKAI

IDUN
MINERALS

-40%

Akcija galioja 2026 11 01 – 2026 11 30 *BENU PLUS* ir *Mano Rimi* lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.

-35%

BABE LABORATORIOS



BABÉ Healty Aging – dermokosmetikos linija brandžiai odai.

sesderma
listening to your skin

-30%



SESDERMA
C-VIT kosmetikos linijai

„SESDERMA C-VIT" – švytinti oda visus metus! Sudėtyje esantis liposomose patalpintas vitaminas C padeda efektyviau prasiskverbti į gilesnius odos sluoksnius, suteikia odai skaistumo, gyvybingumo ir natūralaus švytėjimo. Tinka naudoti visais metų laikais.

LABORATOIRES NOVEXPERT PARIS

IKI -40%



4 Prancūzijos mokslininkų gydytojų sukurti kosmeceutikos produktai Jūsų odos grožiui ir sveikatai!

VICHY LABORATOIRES

-20%



VICHY | Kosmetikos linijoms „NEOVADIOL" ir „LIFTACTIV SUPREME".

Linija specialiai sukurta moterims, patiriančioms menopauzės sukeliamus odos pokyčius. Šios priemonės, praturtintos aktyviais ingredientais, stangrina odą ir padeda sugrąžinti jai spindesį. „Neovadiol" linijoje rasite dieninių ir naktinių kremų, serumų ir kitų produktų, pritaikytų brandžiai odai.

Priemonių linija skirta brandžiai odai drėkinti, stangrinti ir glotninti. Ji puoselėja odą, kad raukšlės ir smulkios raukšlelės atrodytų mažiau pastebimos, o pati oda – stangresnė ir labiau elastinga. Visi linijų sudarantys produktai – koncentruoti serumai, dieniniai ir naktiniai kremai bei specializuotos paakių odos priežiūros priemonės – sukurti atsižvelgiant į jautrios odos poreikius.

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

-15%



LA ROCHE-POSAY | EFFACLAR linijos kosmetikos priemonėms.

Priežiūra riebiai ir aknės pažeistai odai. Kruopščiai sukurta produktų linija, skirta specialiai riebiai, į spuogus ir aknę linkusiai odai, net ir jautriai. Pagrindinis šios linijos tikslas – veiksmingai kontroliuoti odos netobulumus, reguliuoti riebalų išsiskyrimą, puoselėti odą, kad jos poros atrodytų mažiaus pastebimos.

LABORATOIRES FILORGA PARIS

-25%



FILORGA | Atrinktiems veido kremams ir serumams

URIAGE
EAU THERMALE

-30%



Atrinktoms URIAGE „Roseliane“ ir „Tolederm“ kosmetikos priemonėms

-30%



SENSILIS ETERNALIST A.G.E.

Antiglikacinis dieninis kremas brandžiai ir itin sausai odai, 50 ml;
Atkuriamasis, drėkinamasis, maitinamasis paakių kremas, 20 ml;
Stangrinamasis kremas kaklo, iškirptės ir rankų odai, 50 ml;
Atkuriamasis serumas, 30 ml; Senėjimą lėtinantis gelinis kremas su retinoliu, 50 ml.

-25%



BIODERMA

BIODERMA micelinis valomasis vanduo dehidratuotai odai HYDRABIO H2O, 500 ml
BIODERMA micelinis valomasis vanduo mišriai, riebiai odai SEBIUM H2O, 500 ml

-25%



EMBRYOLISSE

EMBRYOLISSE Cream-Milk, kreminis veido valiklis, 200 ml; EMBRYOLISSE Micellar Lotion, micelinis valomasis losjonas, 250 ml ir kosmetikos linijai „HYDRA“

SVR
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

-25%



Atrinktoms veido odos priežiūros priemonėms.

TRANSPARENT LAB

-25%



Atrinktoms veido priežiūros priemonėms

IKI **-40%**



LADY ANION

Higieniniai įklotai ir paketai su ekologiška medvilne ir anijonine juostele. Atraskite ir pajuskite skirtumą. LADY ANION paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anijonine juostele, sertifikuoti pagal visuotinai pripažintą ekologinį standartą Oeko-Tex® 100. Gaiva kasdien: LADY ANION PANTILINER ploni įklotai, 24 vnt. arba 48 vnt. , LADY ANION DAYLINER įklotai su sparneliais, 16 vnt. Tobulas paketas: LADY ANION dieniniai paketai, 10 vnt. arba 20 vnt., LADY ANION naktiniai paketai, 8 vnt. Ypatinga apsauga: LADY ANION ACTIVE ploni paketai su sparneliais idealiai prisitaiko keliaujant, sportuojant, šokant, 15 vnt. Po gimdymo arba esant itin gausioms menstruacijoms: LADY ANION POST PARTUM 10 vnt.

LADY ANION – tavo kasdienis pasirinkimas

IKI **-30%**



CUMLAUDE LAB

GINEKOLOGINĖS KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Ispanijos ginekologų sukurtos intymios sveikatos priemonės, iš kurių kiekviena moteris išsirinks sau tinkantį gaminį: nuo kasdienei higienai skirtų prausiklių iki produktų lytinių organų nemaloniems simptomams ir uždegimams malšinti bei jų išvengti.

Atraskite intymios higienos ritualą su Cumlaude Lab!
Patikrinta ginekologų. Be hormonų.
Cumlaude Lab – naujas požiūris į moters lytinę sveikatą

12^{39} €



CAGYNOL 300 mg ovulė, N1

NERECEPTINIS VAISTAS

Kiekvienoje ovulėje yra 300 mg sertakonazolo nitrato. **Indikacijos.** Vietiniam makšties grybelinės Candida infekcijos gydymui. Cagynol skirtas suaugusiesiems. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Viena ovulė vakare prieš miegą, vienkartiniam vartojimui, įterpiama giliai į makštį, geriausia gulint. Gydymo trukmė - vienkartinė dozė. Didžiausia vienkartinė dozė yra viena ovulė (300 mg sertakonazolo). Jei klinikiniai požymiai išlieka, antroji ovulė vartojama 7 dienų intervalu. Vartoti į makštį. Vartojant šį vaistinį preparatą negalima naudoti tamponų ir intravaginalinių dušų. Jei tuo pačiu metu yra infekuotos lytinės lūpos ar aplinkinės sritys, reikalingas vietinis gydymas atitinkama farmacine forma (makšties kremu). Seksualiniam partneriui taip pat reikalingas vietinis gydymas, jei pasireiškia tokie simptomai kaip niežulys, uždegimas ir kt. Gydymą galima taikyti menstruacijų metu. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas priešgrybeliniams imidazolo klasės vaistiniams preparatams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Latekso prezervatyvų arba diafragmų naudojimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kandidozė patvirtinta, reikia atidžiai ieškoti ekologinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas ir skatina grybelinės infekcijos vystymąsi. Norint išvengti atkryčių, labai svarbu nustatyti ir eradikuoti infekciją bei atsižvelgti į ją skatinančius veiksnius. Patartina vienu metu gydyti visą grybelinės infekcijos židinį, pripažintą sukėlėją, partnerį. Pasireiškus vietiniam netoleravimui ar alerginei reakcijai, gydymą reikia nutraukti. Nerekomenduojama naudoti rūgštinio pH muilo. **Nėštumas.** Tyrimais su gyvūnais teratogeninis poveikis nenustatytas. Sertakonazolo vartojimas nėštumo metu turėtų būti svarstomas tik esant būtinybei. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026.10.16.

VIENOS OVULĖS SĖKMĖS ISTORIJA

-30%

VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODAI!



RELIZEMA

Relizema™ baby care kremas 100 ml
Relizema™ spray&go – zinc + panthenol purškalas 100 ml
Kosmetikos priemonės

Relizema™ baby care ir Relizema™ spray&go – zinc + panthenol yra produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir pantenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti bei apsaugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskelnių srityje, ant odos sudarydami apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Kliniškai įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.

Relizema™ spray&go – zinc + panthenol purškalas - be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.

Relizema™ priemones rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia.

Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. LT_Rlz_22_2024_V1_pharma
UAB Berlin Chemie Menarini Baltic, J. Jasinskio str. 16a, LT-03163 Vilnius, Lithuania.

12^{99} €




COCILLO 10^8 KSV makšties minkštosios kapsulės, 6 kapsulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Makšties mikrobiotos normalizavimui ir palaikymui

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veikliojі medžiaga yra *Lactobacillus plantarum P 17630.* Kiekvienoje makšties kapsulėje yra 10^8 KSV (kolonijas sudarančių vienetų) *Lactobacillus plantarum P 17630.* **Terapinės indikacijos:** sutrikusios makšties mikrobiotos normalizavimas po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais; normalios makšties mikrobiotos palaikymas esant pasikartojančioms makšties infekcijoms. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusioms moterims po bakterinės vaginozės gydymo antibiotikais: 1 kapsulę reikia įstumti giliai į makštį nakčiai prieš miegą 6 paras; normaliai makšties mikrobiotai palaikyti esant pasikartojančioms makšties infekcijoms: 6 paras iš eilės nakčiai prieš miegą giliai į makštį reikia įstumti 1 makšties kapsulę. Jei reikia, ciklą galima kartoti kartą per mėnesį daugiau nei 2 mėnesius iš eilės. Moterys, turinčios menstruacijas, turi pradėti gydymą iškart po jų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; vaikams ir paauglėms iki 18 metų. **Specialūs įspėjimai:** nevartoti vietoje gydymo antibiotikais ar chemoterapijos, naudojamų infekcijoms gydyti, bet jiems papildyti; nenaudoti kartu su prezervatyvais ar kitais vietiniais kontracepcijos metodais (pvz., diafragma), nes gali sumažėti jų veiksmingumas; gydymo „Cocillo" metu makšties drėkinimo antiseptiniais preparatais negalima taikyti; kapsulės sudėtyje yra parahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti alerginių reakcijų (jos gali būti uždelstos).

Reklamos teksto parengimo data 2026-07-13.

13^{19} €



Būsimai mamytei

elevit PRONATAL, 30 plėvele dengtų tablečių

Nereceptinis vaistas. Multivitaminų, mineralų ir mikroelementų preparatas, kuriame yra 12 vitaminų bei 7 mineralai ir mikroelementai. **Terapinės indikacijos:** sutrikimų, atsiradusių dėl vitaminų arba mineralų disbalanso arba jų trūkumo maiste nėštumo ir žindymo laikotarpiu, profilaktika ir gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 tabletę per parą, geriausia valgio metu. Tabletes rekomenduojama vartoti mėnesį prieš pastojant (suplanavus nėštumą) ir visą nėštumo bei žindymo laikotarpį. **Specialūs įspėjimai:** negalima viršyti rekomenduojamos 1 tabletės dozės. Ypač atsargiai vartoti su bet kuriais kitais vitamino A arba D turinčiais produktais. Sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. **Kontraindikacijos:** alergija bet kuriai šio vaisto sudėtyje esančiai medžiagai; per didelis vit. A ir (arba) vit. D kiekis kraujyje; labai susilpnėjusi inkstų funkcija; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba šlapime; geležies ir (ar) vario apykaitos sutrikimai.

Reklamos teksto parengimo data: 2026-08. CH-20260818-42

Stipri, bet švelni kūdikio odelės apsauga!

-25%
~~7,69€~~ **5,77 €**



BEPANTHOL BABY

Bepanthol Baby tepalas, 30g. Kosmetikos priemonė
Tepalas su dekspantenoliu skirtas sausos, jautrios ir dirglios kūdikių odelės priežiūrai bei padeda apsaugoti kūdikio užpakaliuko odelę nuo paraudimo. Be kvapiųjų medžiagų, konservantų ar dažiklių. CH-20251201-17



-25%

Odos priežiūrai ir gydymui

SUDOCREM® MULTI-EXPERT

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 60 g
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 125 g
Tepti plonu sluoksniu, skirtas naudoti išoriškai

- Apsaugo esant odos pažeidimams
- Ramina įvairius odos sudirgimus
- Švelniai gydo įvairių vietų išsutimus



-30%
Perkant už 15 Eur ir daugiau

BABÉ PEDIATRIC

dermokosmetikos priemonėms
Itin saugios ir veiksmingos priemonės glėžnai vaikų ir kūdikių odai nuo pirmųjų gyvenimo dienų. Gerai toleruojamos odos. Patikrintos dermatologų ir pediatrų. Kai kurioms prekėms ši nuolaida bus taikoma su sąlyga - perkant už 15 eur ar daugiau.

Naujienos!



DENTINALE

DENTINALE NATURA dantų gelis, 20 ml. Higienos prekė.
Vaikų dantenų gelis su alavijų, bosvelijų ir ramunelių ekstraktu *Dentinale® natura* ramina tiesiogiai jautrias, sudirgusias dantenas bei dantis.

-25%
Perkant už 11 Eur ir daugiau



WINDI

Kateteriai kūdikiams, N10
natūralus sprendimas kūdikiams nuo pilvo pūtimo, diegliukų ir kitų problemų, susijusių su dujų kaupimusi

-15%
Perkant už 11 Eur ir daugiau



NOSEFRIDA

kūdikio nosies gleivių aspiratorius, N1
higieniniai aspiratoriaus filtrai, 20 vnt.
Vaikiškas daugkartinio naudojimo nazalinis aspiratorius, sukurtas kartu su otorinolaringologais ir pediatrais patogiam ir saugiam gleivių pašalinimui iš kūdikio nosies.

-20%
Perkant už 11 Eur ir daugiau



-30%
~~28,59€~~ **20,01€**

URIAGE EAU THERMALE

Gaivus gelis intymiai higienai „GYN PHY“, 500 ml



-30%
~~19,89€~~ **13,92€**

URIAGE EAU THERMALE

Aliejus nuo strijų „Bariederm Cica Huile“, 100 ml
Bariederm Cica masažinis aliejus specialiai sukurtas masažuoti odą, esant strijoms, neseniems randams, taip pat tinka vykstant įvairiems kūno pokyčiams (nėštumas, priaugus svorio, po operacijų...).



-40%

BABĖ

BABE intymios higienos gelis „BODY“, 250 ml
BABE intymios higienos prausiklis „PEDIATRIC“, 200 ml



-20%

~~18,99€~~ 15,19€

XYLIMELTS

Prilimpančios pastilės sausai burnai, 40 pastilių

~~6,39€~~ 3,19€

-50%

PARODONTAX

Burnos higienos priemonė



PARADONTAX „CLASSIC“ dantų pasta 75 ml
kasdienė dantų pasta be fluoro. Pasta padeda pašalinti dantų apnašų bakterijas, kurios gali sukelti dantenų kraujavimą.

~~8,59€~~ 5,15€

-40%



PLIDENTA

Dantų pasta „Pro-Balance Max Protection“, 75 ml

15,99€

1+1

VELYM®

Burnos higienos priemonė



VELYM pH neutro – klinikiniais tyrimais patvirtintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppM fluoro. Skirtas suaugusiems.

~~21,29€~~ 12,77€

-40%



BIOGAIA PRODENTIS

Čiulpiamos probiotinės pastilės burnai, suaugusiems, N30
Čiulpiamos probiotinės pastilės burnai, vaikams, N30

IKI -40%



BLEND-A-DENT

„Blend-A-Dent“ fiksuojamasis kremas dantų protezams – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-A-Dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų ir dantų protezų, bei apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.

-40%



ORAL-B iO serija

Elektriniai dantų šepetėliai ir jų galvutės
Dantų priežiūros priemonės padeda užkirsti kelią dantų ėduoniui ir kovoti su dantenų problemomis. Burnos priežiūros priemonės „ORAL–B“ šalina apnašas ir dantų paviršiaus dėmes, neleidžia formuotis dantų akmenims ir per dideliam jautrumui, gaivina burnos kvapą. Priemones galite rinktis iš didelio asortimento, kuris pritaikytas įvairių poreikių turintiems žmonėms.

IKI -40%



KIN

Efektyvūs novatoriški produktai burnos priežiūrai.

1+1



ROYAL DENTA
Burnos priežiūros priemonėms.
ROYAL DENTA - AUKSO VERTA ŠYPSENA!

1+1



TePe
Tepe rūpinasi sveika Jūsų šypsena!

Visoms burnos priežiūros priemonėms.
Tepe produkcija pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Tarpdančių šepetėlis – veiksmingiausias būdas pašalinti apnašas tarp dantų, kur įprastas dantų šepetėlis nepasiekia. Kasdienis naudojimas gali padėti pašalinti iki 40% daugiau apnašų nei vien dantų valymas. Dantų pastos švelnios, neputojančios arba mažai putojančios, be SLS, be mikroplastiko.

1+1



LACALUT
Burnos priežiūros priemonėms.
„Lacalut“ – odontologas tavo namuose!

-50%



CURASEPT BOOSTER
Burnos skalavimo skysčiai ir dantų pastos

~~17,99€~~ **8,99€**

-40%



GUM DANTŲ PASTOS
GUM Activital dantų pasta su kofermentu Q10, 75 ml
GUM dantų pasta „SENSIVITAL+“, švelnaus mėtų skonio, 75 ml

~~8,99€~~ **5,39€**

-40%



PARODONTAX
Parodontax Gum Strengthen and Protect mouthwash Icy Mint, 500 ml;
Parodontax Gum Strengthen and Protect Whitening dantų pasta, 75 ml

Kiekvienai dienai. Kiekvienai mano versijai.

Pasiruošęs dienai.
365 kartus per metus.

LIVSANE



-35%





Burnos priežiūros priemonėms ir protezų priežiūros priemonėms

DI Žmonių atvaizdai sugeneruoti dirbtinio intelekto.

-30%



CURASEPT

Burnos priežiūros priemonėms „ADS“.
Skalavimo skystis su 0,12% chlorheksidino „ADS 212“, 200 ml
Skalavimo skystis su 0,20% chlorheksidino „ADS 220“, 200 ml
Dantų pasta su 0,12% chlorheksidino „ADS 712“, 75 ml
Dantų pasta su 0,20% chlorheksidino „ADS 720“, 75 ml

-35%



LISTERINE

Burnos skalavimo skysčiai LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekia vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti.
Su šepetėliu tik pusė darbo - naudok ir Listerine.

Prancūzų dermatologų sukurta kosmetika NOREVA padės susigrąžinti sveiką odą – greitai ir ilgam. Gydytojų dermatologų palankiai vertinamos priemonės padės palengvinti aknės simptomus, apsisaugoti nuo pigmentinių dėmių, suvaldyti seborėją, žvynelinę, rožinę, nuraminti jautrią ir atopišką odą, išlaikyti odos sveikatą ir jaunystę.

Jūsų švytinti ir sveika oda!



noreva
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS*

-30%

Akcija galioja 2026 11 01 – 2026 11 30 *BENU PLUS* ir *Mano Rimi* lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.

* - kai kurioms prekės nuolaida bus taikoma perkant už 11 Eur ir daugiau.

HÅRKONTROLL®

-40%
Perkant 2 prekes ir daugiau



Kosmetika

Maisto papildai

Hårkontroll - Švedijoje sukurta integruota plaukų priežiūros sistema, apjungianti moksliškai pagrįstus maisto papildus ir išorines priežiūros priemones. Kosmetikos formulės sukurtos taip, kad intensyviai drėkintų, maitintų ir apsaugotų plaukus bei galvos odą, o maisto papildai veikia iš vidaus, padėdami palaikyti plaukų struktūrą ir augimą. Juose esantis patentuotas keratinas Cynatine® HNS, kartu su būtinais vitaminais ir mineralais, aprūpina plaukus svarbiausiomis medžiagomis. Tai subalansuotas, veiksmingas sprendimas tiek moterims, tiek vyrams, siekiantiems sveikesnių ir stipresnių plaukų.

PŪRING

– TYRIAUSIA MEILĖ PLAUKAMS –

Plaukų puoselėjimui bei grožiui **kasdien.**

-30%



LABORATOIRES

KLORANE

-35%
Perkant 2 prekes ir daugiau



KLORANE plaukų priežiūros priemonėms su chininu.



NUO **13⁹⁹ €**

NIZORAL®

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Nizoral, 20 mg/g šampūnas, 60 ml; Nizoral, 20 mg/g šampūnas, 100 ml; Nizoral, 20 mg/g šampūnas, 200 ml

Veikliosios medžiaga,stiprumas: ketokonazolas, 20 mg/g. **Indikacijos:** vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti: séleniniam galvos odos pleiskanojimui (*Pityriasis capitis*); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (*Pityriasis versicolor*) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės); tinka *Pityriasis capitis* ir seborėjinio dermatito profilaktikai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti Nizoral šampūnu ir palaikyti 3-5 min., kad įsigertų. Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelilų rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. **Kontraindikacijos:** šampūno vartoti draudžiama jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Nizoral. Reikia saugotis, kad Nizoral, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022 lapkričio mėn. 2602_SB_Nizoral_V01_LT.

Nugalėk pleiskanas su Nizoral!

BENU.lt

Pristatymas per 1 valandą!



BENU Vaistinė

Leidinyje pateiktos kainos, galiojančios fizinėse vaistinėse, su PVM. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Jei leidinyje pateiktos kainos ir kita informacija nesutampa su vaistinėje esančia, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o informaciją leidinyje laikyti spaudos klaida. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Nuolaidos netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Nuolaidos ir akcijos galioja 2026 11 01–2026 11 30. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Akcijos „-50%/-60%/-70% antrai prekei, 1+1, 2+1“ ir pan. taikoma tiek pat kainuojančiai arba pigesnei prekei. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Prašome įdėmiai perskaityti informacinį lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Jei simptomai neišnyksta arba atsiranda šalutinis poveikis, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Už BENU Vaistinės leidinyje pateikiamos informacijos apie produktus teisingumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako atitinkamų produktų rinkodaros teisių turėtojai (arba jų atstovai Lietuvoje).

BENU Vaistinė

LIETUVA 2026
VAISTINIŲ SEKTORIUS

BEST CUSTOMER SERVICE

Geriausias klientų aptarnavimas, remiantis „Dive“ slaptojo pirkėjo tyrimu

Dive

KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

IKI -40%



Akcija galioja 2026 11 01 – 2026 11 30 *BENU PLUS* ir *Mano Rimi* lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis.