

## LIVSANE MAGNIS

— MAISTO PAPILDAI —

# 1+1



Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida taikoma antrai tokiai pačiai arba pigesnei prekei. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

# GEGUŽĖS SUPERHEROJAI JŪSŲ SVEIKATAI

BENU vaistinė kiekvieną mėnesį pristato produktus SUPERHEROJUS, kurie ateis jums į pagalbą, kad kiekvieną dieną jaustumėtės gerai, o susirgę pasveiktumėte greičiau. **Produktai SUPERHEROJAI - ne tik efektyvi pagalba jums, bet ir**

**TEISINGA KAINA KIEKVIENĄ MĖNESĮ.**

**VOLTAREN -  
pagalba nuo skausmo**

**849 €**



## VOLTAREN EMULGEL

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g gelis, 50 g  
Vaistinis preparatas

Diklofenako dietilaminas. **Indikacijos.** Suaugusiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). *Tik suaugusiems (18 m. ir vyresniems):* sąnarių (pvz., kelio) degeneracinės ligos sukeltam skausmui malšinti. **Vartojimas.** Vartoti ant odos. Tepti 2 k./parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapeliuose. **Kontraindikacijos.** Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba kraščiavimo; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. **Specialūs įspėjimai.** Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos vietos, didelių odos plotų, burnos, saugoti, kad nepatektų į akis, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; nenaudoti su oro nepralaidžiančiais tvarščiais. 23,2 mg/g gelio sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. NP-LT-VOLT-20-0003

**ACONITUM -  
aukštos kokybės lietuviški  
produktai**

**1+1**



## ACONITUM

**Maisto papildai**

ACONITUM nuo 1999 metų kuria ir gamina augalinius vaistus, maisto papildus ir biomedicinius preparatus. Kiekviena formulė gimta iš žinių, patirties ir atsakingo požiūrio į žmogaus sveikatą, o kokybę užtikrina griežti Geros gamybos praktikos (GMP) standartai ir nuosekli žaliavų kontrolė.

**Aukštos kokybės lietuviški produktai, kuriuos sukūrėme Jums!**

**BIOFARMACIJA SUPERHEROJAI -  
vitaminai ir mineralai Jūsų organizmui**

**1+1**



## BIOFARMACIJA

**Maisto papildai**

ATLANT, 28 pakeliai;  
ATLANT MAXIMUS, 28 pakeliai;  
ATLANT ŠIRDIS, 28 pakeliai

Didžiausią kolageno kiekį turintis produktas Lietuvoje - „Atlant“. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C.

Populiariausio produkto ATLANT stipresnė ir galingesnė versija **ATLANT MAXIMUS**: dar daugiau mokslškai įrodyto poveikio sąnariams kolageno (net 15 000mg)! Be to kompleksas papildytas hialurono rūgštimi (net 500mg!), ciberžolės (500mg) ir bosvelijos (100mg) ekstraktais.

**Naujiena! ATLANT ŠIRDIS** – širdžiai, kraujagyslėms, kraujotakai ir nervų sistemai SU DIDŽIAUSIU POLIFENOLIŲ kiekiu\*.

Resveratrolio net 260 mg, likopeno net 15 mg.

\*ATLANT ŠIRDIS sudėtyje didžiausias resveratrolio ir likopeno kiekis lyginant su visais Lietuvoje platinamais maisto papildais. Nustatyta pagal UAB „Softdent“ 2022 m duomenis.



**-30%**

## BERTIL'S

Bertil's – bisglicinatiniai maisto papildai. Tai efektyviai pasisavinamos, koncentruotos mono medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį. Jų išskirtinumas – amino rūgščių chelatai. Unikalaus gamybos proceso dėka, naudojantis patentuota technologija, sukuriami naujos formos organinė molekule – mineralų ir dviejų aminorūgščių kompleksas – chelatas. Tradicinių papildų įprasta mineralinė druska ištirpsta skrandyje, mineralas tampa įelektrintu jonu, kurio pasisavinimą gali blokuoti įvairios maistinės medžiagos (kava, pienas, kiti mineralai). Chelatiniai maisto papildai yra elektriškai neutralūs, jų mineralas nereaguoja su maistinėmis medžiagomis, nėra suardomas skrandžio rūgščių ir patekęs į žarnyną yra toliau efektyviai pasisavinamas. Nedirgina skrandžio.



**-30%**

## VIRIDIAN

Maisto papildai

**SUPERHEROJUS QUIXX -  
kvėpuok lengvai!**

NUO **712 €**



## QUIXX®

Nosies užgulimui mažinti ir kasdieni prižiūrai

Medicinos priemonės

Quixx® efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx® Acute** padeda sumažinti dėl peršalimo, gripo, alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies ląsčių užsikimšimą. Vaikams nuo 3 metų ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai. **Quixx® Extra** su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1 – 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną, suaugusiems ir paaugliams: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną. **Quixx® Soft** su alavijų ekstraktu – natūrali priemonė, drėkinanti jautrias nosies sienelės ir apsauganti nuo peršalimo sukeltų simptomų nosyje. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Kūdikiams ir vaikams nuo 6 mėnesių bei suaugusiems: esant reikalui, 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. **Quixx® Daily** kruopščiai praskalauja nosį ir sumažina bakterijų, virusų, alergenų bei žiedadulkių, kietųjų dalelių, dulkių kiekį. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiems. Vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina sausa ar sudirgusi nosies ertmė. **Quixx® baby** – mažųjų nosies prižiūrai ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio. Natūralios priemonės. Be konservantų. LT\_QUI\_24\_2024\_VI\_pharma  
Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB "Berlin Chemie Menarini Baltica" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163  
Quixx® medicinos priemonių negalima vartoti jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai.

**OPEXA -  
pagalba nuo alergijos**

**522 €**



## OPEXA®

Bilastinas 20 mg N10, Opexa 20 mg burnoje disperguojamos tabletės  
Nereceptinis vaistas.

Opexa® vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūklių arba dilgėlinės) gydymui. Rekomenduojama paros dozė yra viena Opexa 20 mg burnoje disperguojama tabletė. Tabletę reikia išgerti vieną valandą prieš valgymą arba praėjus dviem valandoms po valgymo arba sulčių gerimo. Burnoje disperguojama tabletė reikia įdėti į burną; selėse ji greitai disperguojasi ir tampa lengvai nurijama. Kitu atveju burnoje disperguojamos tabletės prieš vartojimą gali būti išstipintos vandenyje. Opexa® vartoti draudžiama, jeigu Jums yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pastartkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Opexa, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalis, magnis, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir Jūs vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Nevartokite Opexa ilgiau nei 10 dienų nepadavus su gydytoju. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Nustatyta, kad bilastino 20 mg dozė nesutrukdė suaugusiųjų gebėjimo vairuoti. Tačiau kiekvieno paciento reakcija į vaistą gali būti skirtinga. Todėl prieš vairuodami ar valdydami mechanizmus turite patikrinti, kaip šis vaistas Jus veikia. Reklama paruošta 2026 m. sausio mėn. LT-OPE-1-2026\_MFLW UAB "Berlin Chemie Menarini Baltica" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163  
**SUTRAMDYK ALERGIJĄ!**

**SUDOCREM® -  
pagalba sudirgusiai odai**

**-40%**

Medicinos priemonė. Odos prižiūrai ir gydymui

## SUDOCREM® MULTI-EXPERT

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 60 g  
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, kremas, 125 g  
Tepti plonu sluoksniu, skirtas naudoti išoriškai

- Apsaugo esant odos pažeidimams
- Ramina įvairius odos sudirgimus
- Švelniai gydo įvairių vietų išsūtimus

SUD-LT-00124



Ne tik  
kūdikams,  
kiekvienam



Nervams, raumenims, energijai

**-30%**



Perkant 2 prekes ir daugiau

**NEW NORDIC MAGNESIUM™**  
Maisto papildai

NEW NORDIC MAGNESIUM™ – INDIVIDUALIEMS JŪSŲ POREIKIAMS!

**NAUJIENA**

Inovatyvūs maisto papildai energijai, nervų sistemai, širdžiai ir grožiui

**-30%**



## WALMARK LONGEVIT

Maisto papildai

**LONGEVIT Resveratrol Extra 500 mg, 60 kapsulių.** Didelė dozė stabilaus trans-resveratolio - 500mg dvejiose kapsulėse. Resveratolis padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

**LONGEVIT NAD+ Booster, 60 kapsulių.** Kiekvienoje kapsulėje yra 160 mg niacino iš dviejų šaltinių – 111,75 mg nikotinamido ir 115,25 mg nikotinamido ribozido (NR) chlorido.

Niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir odos būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią psichologinę būklę, nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Tik viena kapsulė per dieną!

**LONGEVIT Beauty Collagen Shots, 14 buteliukų.** Unikali formulė odai, plaukams ir nagams, kurioje yra net 11.000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenaturuoto II tipo kolageno viename buteliukyje. Papildyta vitaminais C, D, B6 ir seleno bei manganu. Juodujių serbentų skonio. Tik vienas buteliukas per dieną! 2604\_PM\_WL Longevit\_V01\_LT  
**Walmark LONGEVIT. Ateitis prasideda šiandien!**



1+1

**VITIRON™**  
**Maisto papildai**  
 Vitiron™ Active Suscabs 100% daily dose; VITIRON KIDS GROW UP GUMINUKAI, N50; VITIRON KIDS IMMUNITY GUMINUKAI VAIKAMS, N50; VITIRON D3 OLIVE SUN 4000IU SPRAY, 10ml; VITIRON D3 OLIVE SUN 2000IU SPRAY, 10ml; VITIRON D3 OLIVE SUN 1000IU SPRAY, 10ml; VITIRON IMMUNITY STRONG, N30; VITIRON KIDS SPORTS, N50; VITIRON KIDS SCHOOL, N50; VITIRON MIND & BODY FORTE CAPS., N30; VITIRON D3+OMEGA3 STRONG, N60.

1+1

**BIOFARMACIJA SPORT linija**  
**MAISTO PAPILDAI MILTELIAIS.**  
 Biofarmacijos SPORT linija skirta tiems, kuriems rūpi atstatyti prarastus mineralus, druskas. Išsirinkite sau reikalingiausią: „Sport & Cardio“ – elektrolitai su gudobelėmis ir L-glicinu; „Sport & Joints“ – elektrolitai su kalciumu ir gliukozaminu; „Sport & Basic“ – šarminiai elektrolitai su vitaminu C! Elektrolitų tirpalai padeda papildyti organizmą reikalingomis medžiagomis (magniu, kalciumu, natriu, cinku ir kt.). „Sport & Creatine“ – kreatino, gudobelės ekstrakto ir vitamino B1 kompleksas, sukurtas didinti fizinį pajėgumą ir saugoti širdį. „Sport & Protein“ – kolageno, pieno baltymų, magnio ir vitamino C kompleksas raumenų masei auginti ir išlaikyti, kremzlėms ir odai. „Sport & Amino W.H.O.“ – bene vienintelis net 8 amino rūgščių kompleksas su folio rūgštimi. Be konservantų, be stabilizatorių, be dirbtinųjų saldiklių. Pagaminta Izraelyje.  
**Tiems, kam svarbu, ką vartoja!**

1+1

**HYDROLESS**  
**Maisto papildai**  
**HYDROLESS, 30 kaps.**; **HYDROLESS SLIM, 60 kaps.**  
 Naudojant augalinius ekstraktus, organizmui padedama palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, bei palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.  
**HYDROLESS – skysčių balansui!**

-50%

**LIVSANE**  
 Sukurta Jums!  
**Arthro Complex 3**  
 19,99€ **9,99€**  
**LIVSANE ARTHRO COMPLEX 3**  
**Maisto papildas. Tabletės su vitaminu C, gliukozaminu, chondroitinu ir MSM, N90**

-50%

**LIVSANE**  
 Sukurta Jums!  
**Lašai širdžiai**  
 3,99€ **1,99€**  
**LIVSANE LAŠAI ŠIRDŽIAI**  
**Maisto papildas, 40 ml**  
 Apyniai padeda nuraminti nervų sistemą. Valerijonas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą bei normalią protinę veiklą.

1+1

**KEPENIMS**  
**HEPASAN**  
**Maisto papildas**  
**Hepasan forte, 30 arba 60 kapsulių;**  
**HEPASAN Intense, 30 kapsulių;**  
**Hepasan Forte** sudėtyje yra cholino ir augalinių (tikrojo margainio sėklų, kiaulpienių šaknų, artišoko) ekstraktų. Cholinas padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apykaitą bei normalią kepenų funkciją.  
**Hepasan INTENSE** sudėtyje tikrųjų margainių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. Foliatai ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą.  
**Taikius pasirinkimas jūsų kepenims!**

1+1

**Sąnariams, kaulams, kremzlėms**  
**MAGNEFLEX**  
**Maisto papildas. 30 ir 90 kapsulių.**  
**MAGNEFlex** sudėtyje yra II tipo nedenatūruoto kolageno kartu su magniu, vitaminu C, D3 ir B6 užtikrinančių sinerginį maistinių medžiagų poveikį. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų funkciją.  
**Judėk Laisvai!**

**TOP MĖNESIO PREKĖ**

**-50%**

~~3,99 €~~ **1,99 €**

**LIVSANE**  
šnypščiosios tablečių  
**SPORT ACTIVE N20**  
MAISTO PAPILDAS SU VITAMINAIŠ IR  
MINERALAIS. SU SALDIKLIJIS.

\*Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. Be glitimo ir be laktozės. Tinka vegetarams.



**TOP MĖNESIO PREKĖ**

**-40%**

~~14,99 €~~ **8,99 €**

**SOLERO drėkinamasis veido kremas nuo saulės SPF 30, 50 ml**

Kosmetika



Imuninei sistemai



**1+1**

**IMUNITAL | Maisto papildai**

Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz., esant persalimo ligų sezonui) gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. „Imunital“ – skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai, skirti imuninei sistemai.

„Imunital SHOTS“ – itin stipri programa imunitei su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu, reishi ir šitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tinka vaikams nuo 3 metų

„Imunital FORTE+“ – ypač didelės vitaminų D, C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veikdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei mažinti nuovargį.

„Imunital plus“ – su kininiais kordicepsais ir ežiulės ekstraktu.

**Magiška tvirtam imunitetui!**

Odai, plaukams, nagams



**1+1**

**BIOCELL®**

**Maisto papildai**

**BIOCELL Beauty Shots** – jaunystės ir grožio eliksyras. Geriamas hidrolizuotas kolagenas, hialurono rūgštis, vitaminai, mineralai bei antioksidantai.

**BIOCELL Hair Shots** – biologiška aktyvus geriamas hidrolizuotas keratinas, SOD (superoksido dismutazė), vitaminai ir mineralai Tavo tobuliems plaukams.

**BIOCELL Hair** – kompleksas nepakeičiamų aminorūgščių, vitaminų, mikroelementų, kurie padeda Tau puoseleli plaukus iš vidaus.

**BIOCELL Platinum** – ypatingas mažos molekulinės masės hialurono rūgštis, ceramidų aliejaus ir biotino kompleksas odai.

Imuninei sistemai



**1+1**

**DIFOLIN**

**DIFOLIN+, 30 kapsulių; DIFOLIN, 60 tablečių.**

**Difolin maisto papildai moterims**

**Difolin+** moters gerai savijautai: hemoglobiniui, energijai, nervams, imunitetui: mikrokapsuluota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C + varis. **Difolin+** sudėtyje naudojama mikrokapsuluota liposomose geležis, kuri organizme efektyviai pasisavinama, neturi geležies poskonio, nedirgina virškinamojo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio rūgštis, vitaminas B12 – vieni iš būtiniausių kraujo gamybai elementų. Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis - hemoglobino susidarymą, foliatai - kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis - nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 - energijos apykaitą.

**Difolin** planuojantioms pastoti, nėščioms, žindančioms: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 µg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese.

Odai, plaukams, nagams



**1+1**

**BIOCELL® KOLAGENAS**

**Maisto papildai**

**BIOCELL Collagen Biotic, milteliai, 222 g**

10 000 mg aukštos kokybės biologiška aktyvių I ir III tipo hidrolizuoto kolageno peptidų su bioaktyviu kompleksu iš 35 fermentuotų augalų, hialurono rūgštis, vitaminas C, biotinas, niacinas.

% % % % % % % % % % % % %



-25%

34,00€ 25,50€

## BEOTEBAL® PLUS

Plaukams, odai, nagams, 30 +10 tablečių  
MAISTO PAPILDAS

„Beotebal“ PLUS plaukams, odai, nagams\* rekomenduojamas kasdieniui plaukų, odos ir nagų būklės bei išvaizdos priežiūrai. Ypač tinkamas laikotarpiui, kai plaukus, odą ir nagus veikia aplinkos veiksniai (saulė, vanduo, vėjas, šaltis, sniegas, lietus) ar po intensyvių kirpyklos procedūrų (pvz.: dažymo, tiesinimo, džiovinimo) ir kosmetinių nagų procedūrų. Sudėtyje yra originalus koncentruotas „NutriAminoBiotinum“ kompleksas, kuriame yra daug aminorūgščių, mineralų ir vitaminų – įskaitant biotiną ir natūralų silicį, turintį naudingą poveikį plaukams, odai ir nagams. Gaminys nėra glitimo ir laktozės. Tinka vegetarams ir veganams.

**Grožio formulė Tavo plaukams, odai ir nagams!**

Odai, imunitetui, miegui, svorio kontrolei



-30%

## ACORUS BALANCE

Maisto papildai

ACORUS BALANCE kolagenas odai, plaukams COLLAGEN BEAUTY SHOTS, 25 ml, N14

ACORUS BALANCE imunitetui IMMUNO SHOTS, 25 ml, N14

ACORUS BALANCE magnis MAGNESIUM + B6 LIPOSOMAL, 25 ml, N14

ACORUS BALANCE guminukai odai ir miegui SLEEPING BEAUTY, N60

ACORUS BALANCE odai, plaukams, nagams COLLAGEN BEAUTY GUMMIES, 60 guminukų

ACORUS BALANCE skaidulos svorio kontrolei SLIM DETOX FIBER, 180 g



NUO  
16<sup>59</sup> €

Slenka plaukai?\*

Pasitėkėk vaisto gydomyja galia!

## BEOTEBAL

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS, 30 arba 60 tab.

BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tableteje yra 10 mg biotino.

**Terapinės indikacijos.** „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminių preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiems. Biotino trūkumas gali sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnį, konjunktyvitą (akies uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, parestezijų (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, peršėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tablete „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliąjai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingai mažesni. **Reklamos teksto parengimo data 2025-01.**

\*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų.

„Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.



NUO  
27<sup>59</sup> €

## MINOXIDIL

Nereceptinis vaistas.

Minoxidil Inteli 20 mg/ml odos tirpalas, 60 ml

Minoxidil Inteli 50 mg/ml odos tirpalas, 60 ml

Minoxidil Inteli 20 mg/ml odos tirpalas vartojamas gydyti lengvo ir vidutinio stiprumo vyrų ir moterų nuplikimą, susijusį su hormonais (androgeninei alopecijai). Minoxidil Inteli 50 mg/ml odos tirpalas vartojamas tiksliai, jeigu Minoxidil Inteli 20 mg/ml odos tirpalas yra nepakankamai veiksmingas arba siekiama, kad gydymasis poveikis pasireikštų greičiau.

**Vartojimo būdas:** Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Minoxidil Inteli 50 mg odos tirpalo reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 dozavimo pompos paspaudimų) kas 12 valandų. Nesvarbu, koks nuplikimo (alopecijos) plotas, rekomenduojama paros dozė visada tokia pati. Maksimali paros dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Jei manote, kad Minoxidil Inteli veikia per stipriai ar per silpnai, praneškite gydytojui. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, Minoxidil Inteli 50 mg/ml odos tirpalo moterims vartoti negalima. Jeigu galvos oda pažeista, gali rezorbuotis didesnis veikliosios medžiagos kiekis. Tirpalo galima tepti tik ant sveikos odos. Jeigu sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, pasakykite gydytojui, jis gali pradėti stebėti kraujospūdį ir širdies veiklą, įsitikinti, ar nėra kūno patinimo. Jaunesniems nei 18 metų asmenims, vaisto vartoti nerekomenduojama, nes minoksidilio saugumas ir veiksmingumas vaikams šioje amžiaus grupėje neištirti. Jeigu vaisto atsitiktinai pateko ant jautrios kūno vietos, kruopščiai ją nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Saugokite, kad vaisto nepatektų į akis. Teksto parengimo data 2024-09-03

**MINOXIDIL INTELI... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...**

Pagaminta Suomijoje!

-20%



## BIOTIN STRONG BIOTIN COLLAGEN CRANBERRY STRONG

Maisto papildai

Biotin Strong – maisto papildas plaukams ir nagams, 60 tablečių

Biotin Collagen – maisto papildas odai, 120 tablečių

Cranberry Strong – maisto papildas su spanguolių ekstraktu, 60 kapsulių

IKI  
-30%



## BLUEIRON

Maisto papildai

BLUEIRON skystoji geležis, mėlynių skonio, 330 ml

BLUEIRON PREGNANCY skystas maisto papildas su geležimi, 250 ml

Nauros kartos aukšto biologinio įsisavinimo maisto papildas su geležimi, neturintis sąveikos su maistu, švelnus skrandžiui ir lengvai toleruojamas, malonaus skonio.

-20%



## LIFEPLAN

Maisto papildai

LIFEPLAN nakvišų aliejus 1000 mg kapsulės N180

LIFEPLAN amino rūgščių komplekso tabletės su cinku, N30

LIFEPLAN Raudonųjų dobilų ekstraktas 550 mg, kapsulės, N30

LIFEPLAN folio rūgštis 400 mg, N90



Atminčiai ir protinei veiklai

-40%



## CLEAR BRAIN™ | CLEAR BRAIN™ MEGA

Maisto papildai. 60 ir 30 tablečių.

Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai „Clear Brain“ gaminamas iš granatmedžių vaisių, graikinių riešutų, pajūrinio pušų žievės, juodųjų pipirų ekstraktų, jodo ir vitaminų. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Tiaminas, niacinas, vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. **Sveiški vitaminai atminčiai ir protinei veiklai!**

Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui

-35%



NAUJIENA ASORTIMENTE

## FJØRD STRONG OMEGA-3

Maisto papildai  
Išbandykite NAUJIENAS!

FJØRD STRONG OMEGA-3 Immunity – stiprios koncentracijos omega-3 (EPR ir DHR), vitamino D ir ypač gryno alyvuogių aliejaus derinys (dar geresniam įsisavinimui) – jūsų **stipriam imunitetui**. FJØRD STRONG OMEGA-3 SPORT – stipriausios koncentracijos žuvų taukai iš visų FJØRD, su didžiausiu EPR ir DHR kiekiu – **išvermei, fiziniam pajėgumui, nuovargio mažinimui**. FJØRD STRONG OMEGA-3 – **gali daugiau nei tikiesi**.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Kininiai ženšeniai padeda palaikyti organizmo išvermę, fizinį pajėgumą, padeda mažinti nuovargį.

-40%



## GERIMAX ENERGIJAI

Maisto papildai

GERIMAX Ginseng 200 mg, N30; GERIMAX tabletės EXTREME ENERGY N10 arba N30;

GERIMAX Multi Active tabletės N30; GERIMAX GINSENG TONIC tonizuojantis gėrimas, 250 ml

Augalinės kilmės produktas nuovargiui mažinti ir gyvybingumui didinti. Sudėtyje – daug standartizuoto Azijos ženšenų šaknų ekstrakto, priklausancio adaptogenų grupei, todėl padeda organizmui lengviau prisitaikyti prie įvairių emocijų ir fizinio pokyčių. Tinka naudoti prieš intensyvią darbą, sumažėjus energijai bei susikaupimui. Produkte naudojama veiksmingiausia „baltojo“ ženšenio rūšis Panax ginseng C. A. Meyer dėl didžiausio ir labiausiai subalansuoto ginsenosidų kiekio.

Imunitetui, kaulams, raumenims

-30%



## OLIDETRIM®

Maisto papildai

OLIDETRIM® 2000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių

OLIDETRIM® 4000 D3 + K2 OMEGA-3, 30 minkštųjų kapsulių

OLIDETRIM® 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių

Imunitetui – vitaminas D 2000 ir 4000 TV.

Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys.

Kaulams ir raumenims- vitaminai D ir K2.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildų naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.

Geriausia gynyba – stiprus imunitetas.



LIVSANE

Sukurta Jums!

# MULTIVITAMINAI

-35%

## Sukurta Jums!

Sveikatos produktai Jums ir Jūsų šeimai



Maisto papildai. LIVSANE multivitaminų sudėtyje yra svarbiausi vitaminai, kurie puikiai dera tarpusavyje itin gerai subalansuotu santykiu. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.



-30%

**EMILI FITO**

Atrinktiems arbatų mišiniams

ODOS NIEŽULIUI MALŠINTI

6<sup>19</sup> €



**GRIVIX 1 mg/g gelis**

Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 g

**Sudėtis:** kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. **Pagalbinės medžiagos:** benzalkonio chloridas ir propilenglikolis. **Terapinės indikacijos:** Dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukeltą niežėjimo trumpalaikis malšinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Vaikams, suaugusiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX reikia tepti plonu sluoksniu 2 - 4 kartus per parą. **Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniams nei 2 metų amžiaus)** reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. **Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei GRIVIX gydymas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniams nei 2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, gelio tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris dirgina, gali sukelti odos reakciją, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Teksto parengimo data 2025 06mėn.

Metantiems rūkyti



22<sup>49</sup> €

**NIQUITIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NiQuitin 21 mg/ 24 val. transderminis pleistras

Nikotinas

**Terapinės indikacijos.** NiQuitin naudojamas nikotino abstinencijos simptomams, įskaitant nenumaldomą norą rūkyti, lengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Pleistrą klijuoti 1 k. per parą tuo pačiu laiku ant neplaukuotos, švarios, sausos odos ir laikyti 24 val. Po 24 val. pleistrą nuplėsti ir kitoje vietoje užklijuoti naują. 1 gydymo etapas: NiQuitin 21 mg/ 24 val. - 6 sav. 2 etapas: NiQuitin 14 mg/ 24 val. - kitos 2 sav. 3 etapas: NiQuitin 7 mg/ 24 val. - paskutinės 2 sav. **Specialūs įspėjimai.** Terapijos pradžioje ir jos metu visiškai negalima rūkyti. Jei kartu vartojama kitų vaistinių preparatų, gali prireikti koreguoti jų dozę. Ilgiausiai gali būti gydoma 10 savaitių. Vartoti tik pasitarus su gydytoju pacientams, sergantiems: širdies ir kraujagyslių ligomis, arterine hipertenzija, dermatitu, inkstų ar kepenų pažeidimu, hipertiroze, feochromocitoma, cukriniu diabetu, ezofagitu, burnos ir ryklės uždegimu, gastritu, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige. Taip pat įeigu buvo traukulių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vaikams iki 12 metų, nerūkantiems ar retkarčiais rūkantiems žmonėms, pacientams, neseniai patyrusiems miokardo infarktą, sergantiems nestabilia ar progresuojančia krūtinės angina, Prinzmetalio angina, sunkia aritmija bei neseniai turėjusiems smegenų kraujotakos sutrikimą. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026-04-15



-20%



**ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS ARBATOMS**

Kruopščiai rankomis atrinktos žolėlės vaikams ir suaugusiems. Sukurta fitoterapijos ekspertų pasitelkiant mokslą ir tradicijas nuo 1883 m.



-20%

**BEN'S, AFTERBITE**

**BEN'S** tai priemonės skirtos apsaugai nuo erkių, uodų ir kitų kraujasiurbių vabzdžių. **BEN'S** repelentai tinka visai šeimai, kurie maksimaliai saugo nuo įkandimų iki 6 valandų.

**AFTER BITE** produktų linija suteikia raminantį bei simptomus lengvinantį poveikį įsidiuginus, po uodų, musių, vapsvų, bičių, medūzų ir skruzdėlių įkandimų bei įgelimų.

Metantiems rūkyti



10<sup>79</sup> €

**NIQUITIN**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NiQuitin Mint 2 mg vaistinė kramtomoji guma

Nikotinas

**Terapinės indikacijos.** Priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nikotino nutraukimo simptomus, įskaitant potraukį rūkyti kai bandoma mesti. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems (18 metų ir vyresniems). NiQuitin Mint 2 mg yra tinkama surūkantiems mažiau nei 20 cigarečių per parą. NiQuitin 4 mg yra surūkantiems daugiau nei 20 cigarečių per parą. Paprastai turėtų būti vartojama 8–12 gabalėlių per dieną, maksimaliai iki 15 gabalėlių per dieną. Paprastai naudojama 2–3 mėnesius. **Specialūs įspėjimai.** Būtina pasitarti su gydytoju asmenims, neseniai patyrusiems miokardo infarktą, sergantiems nestabilia krūtinės angina, Prinzmetalio angina, širdies aritmijomis, hipertenzija, neseniai patyrusiems insultą, sergantiems cukriniu diabetu, inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimu, feochromocitoma, hipertirozimu, ezofagitu, burnos ar ryklės uždegimu, gastritu, skrandžio ar pepsine opa, esant ar buvus traukuliams. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, vaikams iki 12 metų, nerūkantieji arba rūkanti retai. Informacija sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data.** 2026-04-15



**BEROCCA**

**Maisto papildai**  
**Berocca® Immunity, 30 šnypščiųjų tablečių.**  
**Vitaminų ir mineralų kompleksas imuninei sistemai palaikyti.**  
**Berocca® Immunity** yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas.  
 - Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.  
 11 vitaminų ir mineralinių medžiagų, padedančių palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.  
**Vartojimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Neskirta vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu. Netinka sergantiems hemochromatoze ar inkstų ligomis. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakeičiamas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Reklamos teksto parengimo data: 2024-07. CH-20240716-48

**Berocca Energy, 15 arba 30 šnypščiųjų tablečių**  
**Teigiamos energijos jūsų dienai**  
**Berocca® Energy** yra apelsinų skonio vitaminų ir mineralų kompleksas, be cukraus.  
 • Vitaminai C, B2, B12, niacinas, pantoteno rūgštis ir magnis padeda mažinti PAVARGIMO JAUSMĄ ir NUOVARGĮ  
 • Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią PROTEINŲ VEIKLĄ  
 • Vitaminai B6, C, foliatas ir cinkas padeda palaikyti normalią IMUNINĖS SISTEMOS veiklą  
**Vartojimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams, po 1 tabletę per parą, ištirpinus stiklinėje vandens. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Reklamos teksto parengimo data: 2025-01. CH-20250115-36.



**RINKINIAI**

**2 produktų rinkinys už 1 produkto kainą**

**Maisto papildai**  
**STOP STRESS®**, **STOP STRESS® HERBAL** ir **STOP STRESS® NIGHT N30+N30 kapsulių**, **KARDIO START® N30+N30 kapsulių**, **IMMUNECO® N30+N30 kapsulių**, **OCULO START® N30+N30 kapsulių**, **HEPA START® N60+N60 kapsulių**, **FLEX® N60+N60 kapsulių**, **Beautyinol® N30+N30 kapsulių rinkiniai.**  
**STOP STRESS®** ir **STOP STRESS® HERBAL** sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. **STOP STRESS® NIGHT** sudėtyje esantis pasiflorų ekstraktas padeda palaikyti normalų miegą. **KARDIO START®** sudėtyje esantis valgomųjų cesnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. **IMMUNECO®** sudėtyje esantis vitaminas A, D, cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. **OCULO START®** sudėtyje esantis vitaminas A padeda palaikyti normalų regėjimą. **HEPA START®** sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. **FLEX®** su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlės funkcijai, susidarymą. **Beautyinol®** sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę.  
**Dienai be streso, ramiam miegui, širdžiai, imunitetui, akims, kepenims, sąnariams ir grožiui!**



**LIVSANE BALTYMINIAI KOKTEILIAI**  
**LIVSANE vanilės skonio baltyminis kokteilis milteliais, 450 g**  
**LIVSANE šokolado skonio baltyminis kokteilis milteliais, 450 g**  
**Maisto papildai**  
 Labai kokybiškai parinktoje sudėtyje esantys vitaminai, mineralai ir baltymai organizmui užtikrina reikiamo gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų kiekio suvartojimą. Sudėtyje esantys augalinės ir gyvulinės kilmės baltymai padeda išsaugoti raumenų masę ir palaikyti normalią kaulų būklę. Sudėtyje esantis cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių ir riebalų rūgščių apykaitą. Sudėtyje esantis kalcis padeda palaikyti normalų virškinimo fermentų veikimą.



**Ledinukams**

**1+1**

**SALVIASEPT**  
**Med. prekės: SALVIASEPT SPRAY, gerklės purškalas, 20 ml; SALVIASEPT SPRAY KIDS, gerklės purškalas, 20 ml; SALVIASEPT kids gerklei, 6 ledinukai; SALVIASEPT kids kosuliui, 6 ledinukai; SALVIASEPT ACUT gerklės pastilės be cukraus, 12 vnt.; SALVIASEPT ACUT gerklės pastilės, 12 vnt.**  
 Medicinos priemonių linija „SALVIASEPT“, kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kepenų ekstrakto, padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei peršėjimą, ramina sudirgusią gleivinę ir padeda gydančiomis tonzilių, gerklės bei burnos gleivinės uždegimą, skausmą po tonzilių pašalinimo. Nanosidabras apriboja mikroorganizmų plitimą dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio. „Salviasept“ spray KIDS purškalas skirtas vaikams nuo 2 m. „Salviasept“ spray purškalas skirtas suaugusiesiems ir vaikams nuo 7 metų. „Salviasept kids“ gerklei: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kepenų ekstrakto, šalavijų ekstrakto, juodavaisių aronių uogų sulčių, vaistinių svilarožių šaknų ekstrakto, vitamino C. Salviasept kids“ užtikrina gerklės skausmo, peršėjimo ir sausumo mažinimą bei rijimo lengvinimą. „Salviasept kids“ kosuliui: 1 ledinuko sudėtyje yra islandinių kepenų ekstrakto, vaistinių svilarožių šaknų ekstrakto, čiobrelių ekstrakto, džiovintųjų juodavaisių aronių uogų ekstrakto, vitamino C. „Salviasept kids“ negalima vartoti vaikams iki 3 metų. Vartojimas: ledinukus „Salviasept kids“ galima vartoti 1–3 kartus per dieną. SALVIASEPT ACUT 12 žulpiamųjų pastilių. Čulpiamosios pastilės, kurių sudėtyje yra nanosidabro ir islandinių kepenų ekstrakto. Nanosidabras yra žinomas dėl savo antibakterinio ir antiseptinio poveikio. Padeda gydyti gerklės uždegimą, kurį sukelia bakterinės ir virusinės infekcijos. SALVIASEPT ACUT BE CUKRAUS vartojamas: vartokite ne daugiau kaip 3 pastiles per dieną. Čulpkite lėtai. SALVIASEPT ACUT pastilės skirtos vartoti tik suaugusiems asmenims.



**MAXINUTRITION**  
**MAXINUTRITION baltyminiai batonėliai, 45 g**  
 Baltyminis užkandis.



**ISEREN® CR**  
**Maisto papildas, 30 tablečių**  
 ISEREN c.r. yra maisto papildas, padedantis moterims susigrąžinti pusiausvyrą menopauzės, kuri prasideda apie 50-uosius gyvenimo metus, metu ir jai pasibaigus. Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų. Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.



**DINADAX**  
**Maisto papildai**  
**DINADAX ACTIVE.** Kramtomos lazdelės su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais ir bičių pieneliu. **DINADAX ENERGY.** Kramtomos lazdelės su bičių pieneliu ir vitaminais. **DINADAX SAPIENS.** Kramtomos lazdelės su cholino bitartratu, Omega 3, linolo ir oleino rūgštimis, ir vitaminais.



8<sup>99</sup> €

**SEPTABENE**

kolos skonio 3 mg/1 mg kietosios pastilės, N16

Nereceptinis vaistas

3 mg/1 mg kietosios pastilės;

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius - skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti; jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu); prieš dantų traukimą ir pojo. **Dozavimas suaugusiems.** Rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **6-12 metų vaikams.** Rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 valandas. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Šauveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia šauveika. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, kadangi jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Teksto peržiūros data: 2024-03-15

Tavo gerklė – tavo jėga!



5<sup>79</sup> €

**HERBION KIETOSIOS PASTILĖS**

Nereceptinis vaistas

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5-7,5:1).

**Terapinės indikacijos:** Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikojėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams.

**Dozavimas ir vartojimo būdas:** Įprasta dozė 6-11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Vartoti ant burnos gleivinės. Leisti pastilę lėtai ištirpti burnoje. Jei simptomai išlieka šio vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip savaitę, pacientui būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

**Kontraindikacijos:** Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems gėbenių šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas.

**Specialūs įspėjimai:** Jei pasireiškia dispėja (dusulys), karščiavimas arba atkosma pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. Gastritu ar skrandžio opalige sergantiems ligoniams vaistinio preparato rekomenduojama vartoti atsargiai.

Reklamos teksto parengimo data: 2023 12 07.

Visai šeimai



NUO 5<sup>29</sup> €

**PROSPAN®**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

PROSPAN 7 mg/ml sirupas, 100 ml; PROSPAN 65 mg šnypščiosios tabletės, N10;

PROSPAN 35 mg/5 ml geriamasis tirpalas, N21; PROSPAN 26 mg kietosios pastilės, N20

**Veikliosios medžiagos stiprumas:** 1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5-7,5 : 1); 1 šnypščiojoje tabletėje yra 65 mg Hederae helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5-7,5 : 1); 5 ml geriamojo tirpalo (viename paketyje) yra 35 mg Hederae helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5-7,5 : 1); 1 kietojoje pastilėje yra 26 mg Hederae helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5-7,5 : 1). **Terapinės indikacijos:** ūminio bronchito sukeltos kosulio lengvinimas, atsikojimo gerinimas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** Prospan 7 mg/ml sirupas: 1-6 m. vaikams vartoti po 2,5 ml 2 kartus per dieną; 6-12 m. vaikams – po 5 ml 2 kartus per dieną; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams – po 5 ml 3 kartus per dieną. Sirupui matuoti naudoti matavimo taurėlę, esančią paketoje. Prieš vartojimą buteliuką gerai supurtyti. Prospan 65 mg šnypščiosios tabletės: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams vartoti po 1 šnypščiąją tabletę 2 kartus per parą, 4-12 m. vaikams – po pusę tabletės 3 kartus per parą. Tabletės ištrinamos vandeniu (apie 200 ml kiekio); jas galima tirpinti tiek karštame, tiek šaltame vandenyje. Prospan 35 mg/5 ml geriamasis tirpalas: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams vartoti po 1 šnypščiąją tabletę 2 kartus per parą, 4-12 m. vaikams – po pusę tabletės 3 kartus per parą. 6-11 metų vaikams vartoti po 1 paketylį tirpalo (5 ml) du kartus per parą. Prieš vartojant paketylį lengvai pamaigyti! Vartoti per burną. Geriamąjį tirpalą reikia išgerti neatkiesi tyte (arba priešpiečių metu) ir vakare. Prospan 26 mg kietosios pastilės: suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – 1 kietoji pastilė 4 kartus per parą; vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 12 metų – 1 kietoji pastilė 2 kartus per parą. Vaistinis preparatas neskirtas jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąsias pastiles reikia sučiulpti. Vartoti po valgio. **Kontraindikacijos:** Prospan sirupo, šnypščiosių tablečių, geriamojo tirpalo, kietųjų pastilių vartoti draudžiama, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) gėbenių lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustačius fruktozes netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusiu su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. BronTEX tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiosių tab. (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. BronTEX 60 mg šnypšč. tab.: sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai neščioms moterims ir žindydėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Teksto peržiūros data.** BRONTEX 15 mg/5 ml sirupas: 2024 07 22; BRONTEX 30 mg tab. ir BRONTEX 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas: 2021 08 02; BRONTEX 60 mg šnypščiosios tab.: 2022 10 29. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025 m. liepa. BRO-LT-00061

Greitoji pagalba nuo kosulio visai šeimai!

**BRONTEX**

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

BRONTEX 15 mg/5 ml sirupas;

BRONTEX 30 mg tabletės;

BRONTEX 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas;

BRONTEX 60 mg šnypščiosios tabletės.



NUO 3<sup>69</sup> €

**Veikliosios medžiagos, stiprumas.** 5 ml sirupo yra 15 mg; 1 tab. yra 30 mg; 1 ml tirpalo (14-oje lašų) yra 7,5 mg; 1 šnypščiojoje tabletėje yra 60 mg ambrosolio hidroklorido. **Indikacijos:** kvėpavimo takų sekreto skystinimas pacientams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** 2-5 m. vaikams 3 k/p po 7,5 mg ambrosolio (1 ml lašų arba 2,5 ml sirupo); 6-12 m. vaikams – 2-3 k/p po 15 mg (2 ml lašų arba 5 ml sirupo, arba po ½ tab.); suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2-3 k/p po 30 mg (4 ml lašų arba 10 ml sirupo, 1 tab., arba ½ šnypščiosios tab.) arba inhaliuotai lašus 1-2 k/p po 15-22,5 mg (po 2-3 ml lašų). Sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozė mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambrosolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4-5 paras. Jei simptomai negėrėja arba po 5 parų pablogėja, reikalinga gydytojo konsultacija. Šnypščiasias tabletes reikia ištirpinti stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos.** „BronTEX“ (visų formų) negalima vartoti jaunesniems kaip 2 m. vaikams, tablečių - jaunesniems kaip 6 m. vaikams, šnypščiosių tablečių - jaunesniems kaip 12 metų vaikams. „BronTEX“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambrosoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartoti atsargiai, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, sutrikusi inkstų veikla, sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai, nustačius fruktozes netoleravimą, sergantiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Pasireiškus odos išbėrimui (kartais susijusiu su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais), reikia nedelsiant nutraukti gydymą. BronTEX tablečių (dėl sudėtyje esančios laktozės) ir šnypščiosių tab. (dėl sudėtyje esančių laktozės ir maltodekstrino) negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. BronTEX 60 mg šnypšč. tab.: sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų. Vartoti atsargiai neščioms moterims ir žindydėms. Dėl sudėtyje esančio sorbitolio, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas įgimtas fruktozės netoleravimas. **Teksto peržiūros data.** BRONTEX 15 mg/5 ml sirupas: 2024 07 22; BRONTEX 30 mg tab. ir BRONTEX 7,5 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas: 2021 08 02; BRONTEX 60 mg šnypščiosios tab.: 2022 10 29. **Reklamos teksto parengimo data.** 2025 m. liepa. BRO-LT-00061

Greitoji pagalba nuo kosulio visai šeimai!



-25%

7,79€ 5,84€

**„OLEFAR® DUO“ OIL SPRAY**

Med. priemonė, purškalas, 20 ml

„Olefar® DUO“ Oil Spray naudojimas sumažina burnos ertmės ir ryklės gleivinės uždegimą.

Sudėtis: šaltalankių aliejus, medetkų aliejus, cinamono aliejus, arbatmedžio aliejus, pipirmėčių aliejus. Aliejus pagrindu sukurtą „Olefar® DUO“ Oil Spray sudaro natūralūs aliejai, padengiantys burnos ertmę ir ryklę. Šis preparatas padeda išlaikyti drėgną ir elastingą gleivinę, sumažina diskomfortą, skausmą bei peršėjimo ir dirgimo pojūtį gerklėje.



-20%

6,99€ 5,59€

**DECATYL™ NATURAL**

Maisto papildas, 12 pastilių.

„Decatyl™ Natural“ pastilių sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėtės, vaistinės svilarozės) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, suteikti raminantį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygomis. Šio produkto sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai (pipirmėtės, vaistinės svilarozės) gali palengvinti gerklės ir ryklės dirginimą, taip pat suteikti malonų raminantį poveikį gerklei, ryklei ir balso stygomis. Produkto sudėtyje nėra cukraus, dirbtinių skonio stipriklų, dirbtinių dažiklių bei konservantų. DCTL-LT-00024

TINKA VARTOTI VAIKAMS NUO 4 METŲ. BE CUKRAUS.



Nuo alergijos



559 €

## CLARITINE 10 mg

**Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas.** Vienoje tableteje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei peršėjimo) lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukeltos odos niežulio, paraudimo ir pūkiščių mažinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 metų, kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę vieną kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg, tablečių vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos.** Alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei sergate kepenų liga, prieš pradėdami vartoti vaistą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite Claritine 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Nėštumo metu Claritine geriau nevartoti. Loratadino patenka į motinos pieną, todėl žindytėms vartoti nerekomenduojama. Sudėtyje yra laktozės.

**Reklamos teksto parengimo data:** 2024-06. CH-20240603-131

Nuo alergijos



629 €

## TAVEGYL, 1 MG

**Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių**

**Veiklioji medžiaga, stiprumas:** 1 tableteje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. **Indikacijos:** tinka šienligei ar kitokiai alerginei rinopatijai, įvairių priežasčių sukeltai dilgelinei, įskaitant dermatografinę dilgelinei, niežuliui, niežėjimą sukeliančiai dermatozei, vabzdžių įgėlimui ir įkandimui gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – 2 kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg); 6–12 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 (0,5 mg) arba 1 (1 mg) tabletę; 3–6 m. vaikams – prieš pusryčius ir vakare prieš miegą po 0,5 tabletes (0,5 mg). Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. **Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai:** padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 m. vaikas. Atsargiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozė sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegyl tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas, visiškai laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia atsargiai skirti epilepsijai sergantiems arba praėityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data 2022-08-01.

**Reklamos teksto parengimo data:** 2024-02. 2604\_SB\_Tavegyl\_01\_L1T

**Patikima pagalba nuo alergijos visai šeimai!**



469 €

## LORATADINE ACTAVIS 10 MG TABLETĖS

**Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje tableteje yra 10 mg loratadino. **Terapinės indikacijos.** Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems: 10 mg tab. 1 kartą per parą. 6 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, sveriantiems daugiau negu 30 kg: 10 mg tablete 1 kartą per parą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg vartoti 10 mg tablečių nerekomenduojama.

Loratadino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 2 metų vaikams nenustatyti. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė 10 mg dozė kas antrą dieną. **Kontraindikacijos.** Loratadino tablečių vartoti draudžiama, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Loratadine Actavis, jeigu sergate kepenų liga; Jums numatoma atlikti kokių nors odos mėginius dėl alergijos. Nevartokite Loratadine Actavis 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. To reikia, nes šis vaistas gali paveikti šio tyrimo rezultatus. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškai laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. OTC-LT-00107. **Teksto peržiūros data.** 2024 07 11. **Reklaminės medžiagos parengimo data.** 2026.02



399 €

## ACETERIN EXPRESS 10 MG TABLETĖS

**Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 tablečių**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje tableteje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 12 metų - po 1 tabletę per dieną, 6-12 metų vaikams - po pusę tabletes 2 k/d. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pagalbinei medžiagai, hidroksizinui arba bet kuriam piperazino dariniumi. Pacientai, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai vartoti sergantiems epilepsija ir pacientams, kuriems yra traukulii pavojus. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069661. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.



779 €

## Tonufen 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės

**Nereceptinis vaistas, 12 plėvele dengtų tablečių**

**Veikliosios medžiagos stiprumas:** vienoje „Tonufen“ dengtoje tableteje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido. **Indikacijos:** trumpalaikiam simptominiams nosies ir akių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinusitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų mėnumu ir skausmu, gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletes per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpiu negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praėityje pasireiškusių alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertenzioze, cukriniu diabetu, uždaro kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. **Specialūs įspėjimai:** atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praėityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudonąja vilkige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviams pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. **Teksto parengimo data:** 2025-09-17.



570 €

## ACICLOVIR ACTAVIS 5% KREMAS

**Nereceptinis vaistinis preparatas, 5 g**

**Aciclovir Actavis 5% kremas.** 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. **Terapinės indikacijos.** Lokalus odos ir lūpų pūslėlinės gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems. Aciclovir Actavis 5% kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. Aciclovir Actavis 5% kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. **Kontraindikacijos:** Aciclovir Actavis 5% kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai Aciclovir Actavis 5% kremo pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Aciclovir Actavis 5% kremo nerekomenduojama tepti gleivines, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu Jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. Jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs), tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydyto mo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos cetostearyl alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. **Teksto peržiūros data.** 2023 04 03. OTC-LT-00093 **Reklamos teksto parengimo data.** 2025 04 01

Abra kadabra, ir ausų skausmo kaip nebūta!



578 €

**OTIPAX 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas). Nereceptinis vaistas.**

**Sudėtis.** Veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrokloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidroklorido. Farmacinė forma. Ausų lašai (tirpalas). **Terapinės indikacijos.** OTIPAX yra ausų lašai, skirti vietiniam simptominiam gydymui ir pasišymintys skausmą malšinančiu veikimu. Jie skirti ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo gydymui; pūšinio virusinio ausies uždegimo gydymui; slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukeltos ausies uždegimo gydymui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Paprastai lašinama po 4 ausų lašus 2–3 kartus per dieną į išorinę ausies landą. **Kontraindikacijos.** OTIPAX vartoti draudžiama jeigu yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių susirgimų; jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrokloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje). **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Prieš vartojant OTIPAX Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistas ausies būgnelis. Jei jis yra pažeistas, ausų lašų vartoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos sąveikos su vidurinės ausies struktūromis. **Įspėjimas.** Šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių. **Registruotojas.** Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija. **Reklamos teksto parengimo data:** 2025-11-18. ID 03fbd4f

KANKINA ALERGINĖ SLOGA? METAS TAI PAKEISTI!



749 €

**NASOMETIN**

**Nasometin 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas**

**Nereceptinis vaistinis preparatas**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** kiekvienoje išpurškiamoje dozėje yra 50 mikrogramų mometazono furoato. **Terapinės indikacijos:** vaistas skirtas anksčiau gydytojo diagnozuoto suaugusiųjų sezoninio alerginio rinito simptomams gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** 2 įpurškimai į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą, vėliau – po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, neišgydota vietinė nosies gleivinės infekcija ar neužgijusi žaizda po nosies operacijos ar traumos. **Specialūs įspėjimai:** kvėpavimo takų tuberkuliozė arba kita infekcija. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601079716. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 07.



469 €

**SEPTANAZAL®**

**Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml**

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.

Septanazal suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrokloridui, deksantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Reklamos teksto parengimo data 2023 10 16.

**Atkėms užgulusių nosį ir švelniai gydo išsausėjusią nosies gleivinę!**

NUO

449 €



**XYMELIN®**

**XYMELIN MENTHOL 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml**  
**XYMELIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml**  
**Nereceptiniai vaistiniai preparatai**

**Sudėtis:** 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidroklorido. **Indikacijos:** susirgus peršalimo ligomis, paburkus nosies gleivinei arba pasireiskus nosies ančių uždegimui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 10 metų paaugliams (XYMELIN MENTHOL atveju – vyresniems kaip 12 metų paaugliams) 1 įpurškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. **Kontraindikacijos:** alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, atrofinis rinitas (XYMELIN MENTHOL atveju), jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną; XYMELIN MENTHOL: jaunesniems kaip 12 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** Vartoti atsargiai, jei yra antinksčių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaureja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaisto gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. XYMELIN nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 10 metų vaikams. XYMELIN MENTHOL: Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei vartojate arba per pastutines dvi savaites vartojote vaistų nuo depresijos, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI). Reklamos teksto parengimo data: 2024.03.28 **Pažusk pasaulio kvapus su XYMELIN®!**



IKI -30%

**HUMER**

**Medicinos prekės**

**HUMER 150 SUAUGUSIESIEMS, izotoninis nosies tirpalas, 150 ml**

**HUMER 150 VAIKAMS, izotoninis nosies tirpalas, 150 ml**

**HUMER 050, hipertoninis nosies purškalas, 50 ml**

**HUMER jūros vanduo kūdikiams vienadozėse ampulėse, 18 vnt., 5 ml**

**HUMER SINUSITAS, nosies purškalas, 15 ml**

„Humer“ – 100% nekviestas jūros vanduo, turtingas mikroelementų, tinkamas kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Rekomenduojamas kasdienei nosies higienai, drekina išsausėjusią gleivinę, palengvina nosies išpūtimą, padeda pašalinti virusus bei alergenų. Natūraliai atkėms užgulusių nosį. Visi produktai saugūs ir tinkami naudoti vaikams ir nėščiosioms ir maitinančioms moterims. „Humer“ vienadozės ampulės (5 ml x 18) – sterilus jūros vandens tirpalas kūdikių nosčių priežiūrai. „Humer Sinusitas“ – trejopo poveikio natūrali (iš augalinių ekstraktų) priemonė numalšina sinusų skausmą, greitai atkėms nosį, paskatina sekreto ištekėjimą bei padeda pašalinti bakterijas ir virusus. Veiksmingumas patvirtintas tyrimais. Veiksmingumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Saugus nėščiosioms ir vaikams nuo 1 metų.

Alerginio rinito simptomų gydymui ir PROFILAKTIKAI

1299 €



**ECTOGARD®**

**Medicinos priemonė**

Medicinos priemonė ECTOGARD® yra nosies purškalas, skirtas alerginiam rinitui būdingų simptomų, tokių kaip sloga, nosies niežulys, čiaudulys ir nosies užgulimas, gydymui ir profilaktikai. ECTOGARD sudėtyje yra „EctoIn™“ - natūralių ląstelių apsaugos molekulių, pasižymintį uždegimą mažinančiomis ir membranas stabilizuojančiomis savybėmis.

Tai yra hipertoninis tirpalas, natūraliai mažinantis nosies gleivinės paburkimą. Jis palaiko alergenų sudirgintos nosies gleivinės regeneracijos procesą. Tinka ir vaikams iki 2 metų, jei per parą įpurškama ne daugiau kaip 10 kartų. ECTOGARD nesukelia pripratimo poveikio ir gali būti vartojamas iki 30 dienų.

**Patikėkite savo alergiją ECTOGARD®**



Kokybė, kuria galima pasitikėti!



-25%

**LINEX®**

**LINEX® COMPLEX, 14 kapsulių**  
**LINEX® FORTE, 14 kapsulių, 28 kapsulės**  
**LINEX® BABY lašai, 8 ml**  
**LINEX® KIDS milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių**  
**Maisto papildai**

Vienoje **LINEX® COMPLEX** kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol pasaulyje moksliskai ištyrty gyvų *Lactobacillus rhamnosus GG* bakterijų, taip pat – vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje **LINEX® FORTE** kapsulėje yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliskai ištyrty gyvų *Lactobacillus acidophilus*, *DSM 13241* ir *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, *DSM 15954* bakterijų. Viename **LINEX® KIDS** paketėlyje arba 6-iose **LINEX® BABY** lašuose yra 1 mlrd. *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*, *DSM 15954* bakterijų. **Vartojimas:** **LINEX® COMPLEX** suaugusiems ir vyresniems nei 6 metų vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. **LINEX® FORTE** suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 metų – po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną. **LINEX® KIDS** kūdikiams ir vaikams iki 12 metų – po 1 paketėlį 1 kartą per dieną. **LINEX® BABY** naujagimiams, kūdikiams ir vaikams iki 12 metų – po 6 lašus viena kartą per dieną. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 52636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2601069672. Reklamos teksto parengimo data: 2026 01 06.

Kepenims



NUO 10<sup>69</sup> €

**ESSENTIALE FORTE N**

**ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių, 90 kietųjų kapsulių**  
**ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių**

**NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. **Terapinės indikacijos:** simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje srityje po šonkauliais, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietąsias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neištyrti. Dėl šios priežasties „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojomis arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. **Specialūs įspėjimai:** „Essentiale forte N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukeltų kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų alyvuogės, hidrinto ricinos alyvuogės ir etanolio. Ricinos alyvuogės gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamos teksto parengimo data 2023-09. 2604\_SB\_Essentiale\_V01\_LT **Maksimali pagalba kepenims!**

Virškinimo sistemai



NUO 6<sup>59</sup> €

**GUTTALAX®**

**GUTTALAX 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas)**  
**(Natrio pikosulfatas) 15 ml, 30 ml**  
**Nereceptiniai vaistiniai preparatai**

1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** Guttalax vartojama, jei pacientas kenčia nuo vidurių užkietėjimo; yra būklė, kai reikia palengvinti tuštinimąsi. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10–20 lašų per parą. 4–10 metų vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidracija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimosios būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenusiūti vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartojusios žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejai. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Nevartokite šio vaisto norėdami numesti svorio. Teksto peržiūros data : 2024 m. gruodžio mėn. 2604\_SB\_Guttalax\_V01\_LT **UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEIBINT.**

Kai pučia pilvą



NUO 3<sup>27</sup> €

**ESPUMISAN**

**Espumisan 40 mg minkštosios kapsulės N25; N50;**  
**Nereceptinis vaistas**

**Veiklioji medžiaga:** vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40mg simetikono. Espumisan vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgeną, ultragarso. Espumisan kirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiems. **Espumisan vartoti draudžiama:** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliui saulėlydžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Espumisan. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujančių ligų. **Dozavimas:** kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams ir suaugusiems, bei 6–14 metų amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3–4 kartus per parą. Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus - ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules tyrimo dienos ryte. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlinchemie.com **LE-ESP-8-2025\_MFLOW, 2025/12**  
**JEI PILVĖ URAGANAS – JUMS PADĖS ESPUMISANAS!**

RECEPTINIAI VAISTAI

**ŠIRDŽIAI**

KASDIEN

IKI **-20%**

Pasiūlymas galioja **BENU PLUS** lojalumo programos nariams. Pasiūlymas galioja receptiniams vaistams. Pasiūlymas taikomas prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą. Produktų sąrašą teiraukitės BENU vaistininko. Pasiūlymas negalioja receptiniams kompensuojamiesiems vaistams ir med. prekėms, perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu bei kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. BENU vaistinė pasilieka teisę bet kada keisti pasiūlymo sąlygas.



NUO 7<sup>09</sup> €

**DUPHALAC**

**Duphalac 667 mg/ml geriamasis tirpalas (200 ml, 500 ml, 1000 ml)**  
**Laktuliozė. Nereceptinis vaistas**

1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktuliozės (skystosios laktuliozės 667 g/l pavidalu). **Terapinės indikacijos.** Vidurių užkietėjimo (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydymas, sergant hemoroidais, po storosios žarnos ar išangės operacijos. Kepenų encefalopatijos (kepenų liga sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusį sąmoningumo lygį, įskaitant komą) gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Vartoti per burną. Duphalac geriamąjį tirpalą galima vartoti atskiestai ar neatskiestai. Vieną dozę reikia nuryti visą iškart, ilgai nelaikant burnoje. Vieną kartą per parą vartojamą dozę reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant Duphalac, tiekiamą buteliuke, gali būti naudojama matavimo taurelė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė 15–45 ml, palaikomoji paros dozė 15–30 ml. 7–14 metų vaikams pradinė paros dozė 15 ml, palaikomoji paros dozė 10–15 ml. 1–6 metų vaikams pradinė paros dozė 5–10 ml, palaikomoji paros dozė 5–10 ml. Kūdikiams iki 1 metų pradinė paros dozė iki 5 ml, palaikomoji paros dozė iki 5 ml. Be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams (iki 14 metų amžiaus) Duphalac vartoti negalima. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai: suaugusiems pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet pagalbinei medžiagai. Galaktozemija. Virškinimo trakto nepraeinamumas arba dalinio nepraeinamumo sindromas, virškinimo trakto perforacija ar perforacijos rizika, uždegiminė žarnyno liga. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Duphalac, jei Jums skauda pilvą dėl nepaaiškintų priežasčių, jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Kai vartojama daug didesnė dozė hepatinei encefalopatijai gydyti, būtina atsižvelgti į tai, kad pacientas serga diabetu. Ilgą laiką vartojant nepritaikytomis dozėmis ir netinkamai vartojant vaisto, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsižvelgti į tai, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimosi refleksas. Duphalac sudėtyje yra yra laktozės, galaktozės, fruktozės ir sulfity. Duphalac vartoti negalima, jei yra: galaktozės arba fruktozės netoleravimas, visiškasis laktazės trūkumas, gliukozės–galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktuliozė turi vartoti atsargiai. **Reklamos teksto parengimo data: 2025 06 16.**



Pagalba skrandžiui!

## ALMAGEL A GERIAMOJI SUSPENSIJA

445 €

Nereceptinis vaistinis preparatas, 170 ml

**Almagel A geriamoji suspensija.** 5 ml geriamosios suspensijos yra 340 mg aliuminio hidroksido (atitinka 218 mg aliuminio oksido), 109 mg magnio hidroksido (atitinka 75 mg magnio oksido) ir 109 mg benzokaino. **Terapinės indikacijos.** Virškinimo trakto sutrikimų, susijusių su skrandžio rūgšties pertekliumi, tokių kaip rėmuo, rūgštis sukelti skrandžio negalavimai, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, simptominis gydymas 14 metų arba vyresniems paaugliams ir suaugusiems žmonėms.

**Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems atsivėlgiant į ligos sunkumą, 3–4 k./d. (30 min. prieš valgį ir vakare, prieš miegą) gerti po 1–3 pilnus dozavimo šaukštėlius (1 šaukštėlyje yra 5 ml). Jei yra dvylikapirštės žarnos opa ir kai kurių formų skrandžio opa (prievarčio opa), Almagel A galima gerti tarp valgytų.

Prieš vaistų, dirginančių virškinimo traktą, vartojimą profilaktikai reikia išgerti 1–2 pilnus dozavimo šaukštėlius Almagel A. Vaistinio preparato rekomenduojama vartoti ne ilgiau kaip 12 parų. Jei inkstų funkcija sutrikusi, atsivėlgiant į sutrikimo laipsnį suspensijos reikėtų gerti rečiau arba mažesnę dozę. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai pakratyti. Preparato skiečiai nerekomenduojama. Išgėrus suspensijos, 30 min. negalima gerti skysčių. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Fruktozės netoleravimas (nes sudėtyje yra sorbitolio). Hipofosfatemija. Sunkus inkstų funkcijos nepakankumas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min). Alzheimerio liga. Pacientas jaunesnis nei 14 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Almagel A nerekomenduojama vartoti, jei yra nuolatinis vidurių užkietėjimas, ūminio apendicito simptomų, metabolinė alkalozė, kepenų cirozė, sunkus stažinis širdies nepakankumas, neštumo toksikozė, opinis kolitas, divertikuliozė, kolostomija ar ileostomija, inkstų funkcijos sutrikimas, lėtinis viduriavimas. Vaistas gali sukelti hemorojus sukeltus negalavimus. Pagyvenusiems pacientams gali pasunkėti kaulų ir sąnarių ligos bei Alzheimerio liga. Vaistinio preparato vartoti ilgiau negu 2 savaites galima tik prižiūrint gydytojui. Sudėtyje yra parahidrosbenzoato derinių, kurie gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant uždelstas alergines reakcijas. Sudėtyje yra etanolio, dėl kurio pacientams, sergantiems kepenų, smegenų ligomis, epilepsija ir alkoholizmu, bei neščioms moterims ir jaunesniems nei 14 metų vaikams gali atsirasti pažeidimų. Almagel A nepatariama vartoti kartu su alkoholiu ir maistinėmis rūgštimis (citrinos, acto ir kt.), nes jos neutralizuoja vaistinio preparato vietinį anestetinį poveikį. Tarp Almagel A ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1–2 val. pertrauką. Dėl sudėtyje esančio benzokaino, vartoti ilgiau kaip 10–12 parų nepatariama. Vaikams benzokainas gali sukelti metemoglobinemiją.

**Reklamos teksto parengimo data:** 2025 m lapkritis. OT-LT-000102

NAUJIENA!

846 €



## FORLAX FAST

Medicinos priemonė

**Forlax Fast** mikrokliksma, skirta esant retkarčiais pasitaikančiam vidurių užkietėjimui suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams, kurios sudėtyje yra glicerolio, vandens ir polisacharidų iš vaistinės svilarozės, turinčių salinimąjį, minkštinimąjį, drėkinamąjį ir raminaująjį poveikį. Priemonė minkština išmatas, palengvina išmatų pašalinimą ir mažina diskomfortą užkietėjus viduriams. Naudoti į tiesiąją žarną. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams. Pagal poreikį naudokite vieną mikrokliksmą. Jei vidurių užkietėjimas nepaiešina, skirkite 2 dozes iš eilės. Praneškite apie bet kokį rimtą įvykį, susijusį su medicinos priemonės vėtiniam atstovui Mayoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. **Teksto peržiūros data:** 2024 m. liepos mėn. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026-04-07 FFAST-LT-2026-0001

## MAALOX

**MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus) (40 tablečių); MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija (1 buteliukas)**  
Nereceptiniai vaistai



NUO 719 €

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** vienoje kramtomosios tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** **Suspensija:** suspensiją reikėtų gerti neskiestą. Buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. **Tabletės:** sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradėdami vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksidų ir magnio hidroksidų. Atsargumo dėlei tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. **Teksto parengimo data:** 2024 m. gruodžio mėn. 2602\_SB\_Maalox\_V01\_LT

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>  
**GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!**

VIENINTELIS VAISTAS LIETUVOJE SU ANTIBIOTIKŲ VARTOJIMU SUSIJUSIO VIDURIAVIMO PROFILAKTIKAI.

NUO 729 €



## ENTEROL® 250 mg

Enterol 250 mg milteliai geriamajai suspensijai.

Enterol 250 mg kietosios kapsulės

Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

Nereceptinis vaistas.

Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo.

**Vartojimo būdas.** Kapsules nuryti užgeriant gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį šaldinto gėrimo arba į maistą. Mažiesiems (iki 6 metų) vaikams kapsulių negirdyti, kad vaikas neužspringtų, bet jas atidarius turinį supilti į gėrimą ar maistą. Miltelių geriamajai suspensijai pakelietiško turinį supilti į nedidelį kiekį vandens ar šaldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus viduriavimo simptomams. **Dozavimas.** Suaugusiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba 1 pakelietiška vartojami vieną arba du kartus per parą. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Pacientams, kuriems įstatytas centrinės venos kateteris pasitaikę pavieniu sistemines grybelines infekcijas atvejų. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio turio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Kietųjų kapsulių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra laktozės monohidrato, fruktozės ir sorbitolio. **Enterol vartoti draudžiama** jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielii grybeliui, ypač *Saccharomyces boulardii*; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate gydomas ligoninėje; jei esate kritinės sveikatos būklės, arba Jums yra įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas.

**Reklamos parengimo data:** 2025 11. ID 3246361d



NUO 799 €

## LIVOSIL 140 MG

Nereceptiniai vaistiniai preparatai. 30 arba 60 kietųjų kapsulių

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 kietjoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. **Teksto peržiūros data:** 2017-07-12.

Natūrali kepenų apsauga ir gydymas!



NUO 679 €

## MICROLAX®

MICROLAX® 625 mg/90 mg/9 mg/ml tiesiosios žarnos tirpalas, N4/ N12

Nereceptinis vaistinis preparatas

1 ml tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfoacetato. **Indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, reikalaujančių palengvinto išituštinimo, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydymąsias procedūras galinėje žarnyno dalyje. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** **Suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai:** MICROLAX® vienos tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną. **Jaunesni kaip 3 metų vaikai:** MICROLAX® vienos tubelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, įkišus į ją pušę antgalio. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai.** Pacientams, sergantiems hemorojumi, norint išvengti sužeidimo, vaistą reikia vartoti atsargiai. Vengti ilgalaikio naudojimo. Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

**Teksto parengimo data:** 2025 10. LT-MCX-2025-241032.



**1+1**

### RAMI ŠIRDIS

Maisto papildai. 30 kapsulių, 20 čiulpiamųjų tablečių, 50 ml geriamieji lašai širdžiai, 14 x 25ml buteliukų „Rami širdis“ – gausios sudėties dvejo po poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

**RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS!**

Maisto papildai




**-35%**

STANDARTIZUOTI BIOAKTYVŲS EKSTRAKTAI

### NatAspin®

Kurios NatAspin formulės jums reikia šiandien – širdies stiprybei ir apsaugai, kraujotakai ir kraujagyslėms, cholesterolio ar gliukozės kontrolei?

**NatAspin – teisingi sprendimai su standartizuotais bioaktyviais ekstraktais.**




**5<sup>09</sup> €**

### THROMBO ASS 100 mg skrandyje neirios tabletės, N100

Nereceptinis vaistinis preparatas.

**Veiklioji medžiaga:** acetilsalicilo rūgštis. **Terapinės indikacijos:** miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosrūvio operacijos. Antrinė praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tabletę reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu skysčiu kiekiu valgio metu arba tarp valgių po 2-3 valandas. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50-150 mg. Dalyti į dalis Thrombo ASS skrandyje neirios tabletės negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad būtų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opalę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgštis reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrata, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas lėpų laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. **100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.** Farmakoterapinė grupė – antitromboziniai preparatai, tromboticų agregaciją slopinantys vaistai. **ATC kodas – B01AC06. Teksto peržiūros data:** 2020-05-13. **Registruotojas ir gamintojas:** G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. **Reklamos teksto data:** – 2026 02 13. **Širdžiai ir kraujagyslėms!**

NUO



**10<sup>69</sup> €**

### HESIO

Hesio 500 mg, 30 arba 60 pėlele dengtų tablečių  
Hesio 1 000 mg, 30 pėlele dengtų tablečių. Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Kiekvienoje Hesio 500 mg tabletyje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmimo ir 50 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). Kiekvienoje Hesio 1000 mg tabletyje yra 1 000 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 900 mg diosmimo ir 100 mg kitų flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidiną). **Terapinės indikacijos.** Hesio skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) lengvinti. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Hesio 500 mg tabletes: *Lėtinis venų nepakankamumas.* Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletes per parą 2 mėnesius: viena tabletė vidudienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. *Hemorojaus paūmėjimas.* Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes du kartus per parą (6 tabletes per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletes du kartus per parą (4 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. Hesio 1 000 mg tabletes: *Lėtinis venų nepakankamumas.* Rekomenduojama dozė suaugusiems yra 1 tabletė per parą 2 mėnesius, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. *Hemorojaus paūmėjimas.* Pirmas 4 gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletes per parą (1 tabletė tris kartus per parą arba 1 tabletė pirmą kartą ir 2 tabletes antrą kartą per parą). Kitas 3 dienas – 1 tabletė du kartus per parą (2 tabletes). Tabletes vartokite valgio metu. **Kontraindikacijos.** Hesio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaikams ir paaugliams Hesio vartoti nerekomenduojama. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026.05.01 ID: 000846009



**LIVSANE**  
Sukurta Jums!

**-35%**

### LIVSANE HEART COMPLEX + BOTANICALS

60 kapsulių. MAISTO PAPILDAS SU KALIU, MAGNIU, TIAMINU IR AUGALŲ EKSTRAKTAIS.

### LIVSANE RAUDONŲJŲ MIELIŲ RYŽIŲ + ALYVUOGIŲ LAPŲ EKSTRAKTAS

60 kapsulių. MAISTO PAPILDAS su vitaminais, cholinu, monokolinu k iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių ir alyvmedžių lapų ekstraktu.



**IKI -30%**

3 MAM  
IHB  
AFIB sens  
Insulto prevencija

### MICROLIFE

Kraujospūdzio matuokliams, termometrams ir inhalatoriumams. Microlife AFIB, kraujospūdzio matavimo technologija, galinti aptikti prieširdžių virpėjimą (AF)

Esant magnio trūkumui



NUO  
**9,89 €**

**MAGNE B6**

MAGNE B6, 470 mg/5 mg, 60 dengtųjų tablečių

MAGNE B6, geriamasis tirpalas, 10 ampulių

**NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI**

**Veikliosios medžiagos, stiprumas:** 1 tablete yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** MAGNE B6® skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumą, irzlumą, nedidelį nerimą, trumpalaikį nuovargį, nedidelius miego sutrikimus; mėšlungį, dilgčiojimo pojūtį. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiems paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, svorianiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgymų. **Kontraindikacijos:** preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6® medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopa. **Specialūs įspėjimai:** neštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo gydytojas. MAGNE B6® dengtosios tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6® geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10 kg svorianiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradėdami vartoti MAGNE B6® preparatą, reikia pasitarti su gydytoju. Piktinaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jautimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai. Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Reklamos teksto parengimo data 2024-08. 2602\_SB\_Magne\_B6\_V01\_LT.

MAGNE B6® padės įveikti magnio trūkumą!



**LIVSANE**  
Sukurta Jums!

**-35%**  
14,99€ 9,74€

**LIVSANE STRESS BALANCE + BOTANICALS**

60 kapsulių. MAISTO PAPILDAS SU MAGNIU, VITAMINAIŠ IR AUGALŲ EKSTRAKTAIS:

\*Magnis, tiaminas, riboflavinai, vitaminas B6, niacinas ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią energijos apykaitą. Riboflavinai, niacinas, vitaminas B6 ir vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis, tiaminas, niacinas, vitaminas B6 ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.



**-35%**

**LIVSANE**

Maisto papildai

LIVSANE melatonino purškalas, 25 ml;

LIVSANE „Melatonin 1 mg“, 30 melatonino tablečių;



**LIVSANE**  
Sukurta Jums!

**-35%**

13,99€ 9,09€

**LIVSANE GINKGO BILOBA, 60mg**

Maisto papildas su ginkmedžio lapų ekstraktu, N60



**NAUJIENA**

**22,99 €**

Protinei veiklai | Pažinimo funkcijai  
**DEMATSYT® CHOLINE**

Maisto papildas, 30 kapsulių

Unikali trigubo poveikio formulė su cholino bitartratu, dviskiaučiu ginkmedžiu ir juodųjų pipirų ekstraktu jūsų smegenų veiklai. Padeda palaikyti normalią homocisteino bei lipidų apykaitą, kuri svarbi pažinimo funkcijai, smegenų kraujotakai ir nervinių signalų perdavimui.

**PALAIKYMO KOMANDA JŪSŲ SMEGENIMS**



**10,89 €**

**GINKOBIL 120 mg**

Nereceptinis vaistinis preparatas, 40 kaps.

**Veikliosios medžiagos stiprumas:** 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausosios ekstrakto. **Indikacijos:** lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiuliu ar galvos skausmu, simptominiams gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** gerti po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną (atitinka 120–240 mg dienos dozė). **Kontraindikacijos:** vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** kadangi dviskiaučio ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesujusiams su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištyrtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22

Veiksmingai gerina sutrikusią kraujotaką!



**7,69 €**

**NEURORUBINEM™ FORTE LACTAB™**

Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 plėvele dengtų tablečių.

**Neurorubine Forte Lactab plėvele dengtos tabletės.** Kiekvienoje plėvele dengtoje tableteje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalaminu (vitamino B12). **Indikacijos.** Del B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Per parą reikia išgerti 1-2 tabletes. Vartoti per burną. Kiek laiko vartoti Neurorubine Forte Lactab, patars gydytojas. Vėliausiai po 4 savaičių būklė turi įvertinti gydytojas. Jeigu simptomai nepaieina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. **Vaikų populiacija.** Saugumas ir veiksmingumas vaikams dar neįstirtas, todėl neturi būti skiriamas vaikams. **Kontraindikacijos:** jeigu yra alergija vitaminams B1, B6 ar B12 arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate žvyneline. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vaisto sudėtyje esanti didelė vitamino B6 dozė gali silpninti L-Dopos poveikį bei pabloginti Parkinsono ligą. Taip pat vitaminas B6 gali silpninti altretamino (vaisto, vartojamo vėžiui gydyti) poveikį. Kartu vartojamo izoniazido toksinis poveikis gali stiprėti. Tiosemikarbazonas ir 5-fluorouracilas, būdami vitamino antagonistais, gali trikdyti vitamino B1 poveikį. Kartu su Neurorubine Forte Lactab vartojant vaistus, surišiančius skrandžio rūgštis (antacodus), pablogėja vitamino B1 pasisavinimas. **Nereceptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros data.** 2024.02.01. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 m. sausis. NEUR-LT-00012

-20%



**SYSTANE®**

Medicinos priemonės.  
SYSTANE BALANCE drėkinamieji akių lašai, 10 ml;  
SYSTANE HYDRATION drėkinamieji akių lašai, 10 ml;  
SYSTANE ULTRA MDPF drėkinamieji akių lašai, 10 ml.

-30%



**LIVSANE**

Medicinos priemonės  
Kontaktinių lęšių tirpalas „LENS CARE“, 360 ml arba 100 ml;  
Lęšių valymo servetėlės „LENS WIPES“, 50 vnt.

-30%



**SKAITYMO AKINIAI**

Akiniams ir jų aksesuarams.

Inovatyvūs sprendimai Tavo akims

-30%



**NAVI®**

MEDICINOS PRIEMONĖS

**NAVI®VISION PLUS** – akių lašai sukurti naudojant natūralios kilmės sudedamąsias dalis, siekiant palaikyti akių komfortą, drėkinimą ir apsaugą nuo išorinių aplinkos veiksnių.  
**NAVI®INFLA** – antioksidaciniai drėkinamieji akių lašai su natūraliais augaliniais ekstraktais lengvina su konjunktyvitu susijusius simptomus – ašarojimą, paraudimą ir niežėjimą.  
**NAVITAE® PLUS PF** – antioksidaciniai drėkinantys ir lubrikuojantys akių lašai su natrio hialuronatu, vitaminais A ir E, vartojami sausų akių sindromui ir akių diskomfortui palengvinti.  
**Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.**

IKI -40%



**VIZIK**

Medicinos priemonė

**Akių lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims 10 ml. Be konservantų.** Indikacijos: ramina sudirgusias ir paraudusias akis, drėkina akių paviršių. Sudėtis: dekspentanolis (provitamins B5), karbomeras, bevandė citrinos rūgštis, sorbitolis, injekcinis vanduo.  
**Akių lašai sausoms ir pavargusioms akims 10 ml. Be konservantų.** Indikacijos: ramina ir drėkina akis, padeda palengvinti simptomus susijusius su pavargusiomis akimis. Sudėtis: 0,15 % natrio hialuronatas ir 2% dekspentanolis (provitamins B5), natrio chloridas, natrio citratas, citrinos rūgštis, injekcinis vanduo.  
**Allergy, 10 ml.** Sumažina uždegimą, apsaugo nuo alergenu. Sudėtis 0,15% natrio hialuronato ir 2% ektoino. Be konservantų.  
*Pirmą kartą atidarę buteliuką naudokite jį ne ilgiau negu 12 mėn.*

**ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRAI**

-10%



**Asept** – dezinfekcinis purškalo, 100 ml  
**Asept** – dezinfekcinis purškalo, 250 ml

Medicinos priemonės  
Asept valo ir dezinfekuoja nedideles žaizdas bei įvairius odos pažeidimus, įbrėžimus, nubrozdinimus, malšina vabzdžių įgėlimus bei įvairaus pobūdžio nudegimus.

ANTRAI PREKEI -50%



**LIVSANE**  
Pleistrams ir tvarščiams

**ŽAIZDŲ GIJIMUI SKATINTI**

-25%



Medicinos priemonė

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai bei jų gijimui skatinti. Pagreitina gijimą ūminiu ir lėtiniu žaizdų, tokių kaip: žaizdos (įskaitant chirurgines); įpjovimai, įbrėžimai; odos nubrozdinimai ir įtrūkimai; paviršiniai nudegimai (I ir IIA laipsnio). Iš karto malšina skausmą, sumažina randų susidarymo riziką, pagreitina gijimą, padeda išvengti infekcijos. Galima naudoti vyresniems nei 2 m. vaikams.  
**Paprasta ir efektyvu.**

**HELP4SKIN**  
**HELP4SKIN WOUND HEALING**, gelis, 20 g ir 50 g

## PĖDŲ IR ODOS GRYBELIUI GYDYTI

## EXO DERIL®

Exoderil 10 mg/ml odos tirpalas, 10 ml  
Exoderil 10 mg/ml odos tirpalas, 20 ml  
Exoderil 10 mg/g kremas, 15 mg  
Exoderil 10 mg/g kremas, 30 mg  
Nereceptiniai vaistiniai preparatai

8<sup>19</sup> €

**Veiklosios medžiagos, stiprumas:** 1 grame vaisto yra 10 mg naftifino. **Terapinės indikacijos:** Exoderil tirpalas naudojamas pėdų grybeliui gydyti. Exoderil kremas naudojamas rankų, pėdų, odos grybelių, įvairiaspalvės dedervinės bei uždegiminių dermatomikozų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą ir aplink ją esantį plotą tepti 1 k./parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas naftifinui arba pagalbinėms medžiagoms. **Specialūs įspėjimai:** saugoti, kad vaistas nepatektų į akis ir atviras žaizdas. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS260106699. **Reklamos teksto parengimo data:** 2026 01 06.

„Compeed®“ – inovatyvūs odos problemų sprendiniai.

IKI  
-25%

## COMPEED®

Compeed® pūslių pleistrai. Medicinos priemonės.

Hidrokoloidinė technologija. Pleistrai nedelsiant malšina skausmą, kurį sukelia pūslių ir nuospaudos, apsaugo nuo trinties ir ją sumažina, skatina greitesnį žaizdų gijimą. Išlieka vietoje kelias dienas.

Įspėjimai: diabetikai prieš naudodami pleistrus turėtų pasitarti su gydytoju. Pleistrų negalima dėti ant užkrėstų žaizdų, jų naudoti pakartotinai ar karpyti.

Compeed® lūpų pūslelinės pleistras. Medicinos priemonė.

Nematomas lūpų pūslelinės pleistras, kurio nepertraukiamas poveikis trunka iki 12 valandų. Apsaugo nuo viruso plitimo ir paslepia pūsleles. Negalima naudoti vaikams, nėščioms ar žindančioms moterims.

Compeed® pieštukas nuo pūslių, 8 ml. Kosmetikos gaminys.

Apsaugo odą nuo trymimo ir padeda išvengti pūslių susidarymo. Sukuria apsauginį barjerą, apsaugantį nuo trymimo, suteikia nematomą apsaugą, tinka avint atvirą avalynę, lengva naudoti.

Įspėjimai: negalima naudoti ant jau susidariusių pūslių, atvirų žaizdų ar gleivinių.

IKI  
-20%

## TENA

Neprikiaštingai slaugai ir higienai „TENA“

Sauskelnės, skalbiamos apsauginės kelnaitės, įklotai, paklotai ir odos priežiūros priemonės – tai būtinos priemonės šlapimo nelaikymui kontroliuoti. „TENA“ sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria ir sulaiko šlapimą viduje, todėl paviršius išlieka sausas ir nedirgina odos. Kvapo neutralizavimo sistema efektyviai apsaugo nuo nemalonus kvapo atsiradimo. „TENA“ odos priežiūros priemonės švelniai valo ir drėkina net gležną, sausą ir pažeidžiamą odą. Patikrinta dermatologų.



-25%



## GEHWOL

Visoms pėdų ir nagų priežiūros priemonėms.

Pakuočių išvaizda vaistinėje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis.

NAUJOS  
pakuotės

-20%

Nagų grybeliui gydyti

## EXCILOR®

MEDICINOS PREKĖS. EXCILOR® SOLUTION, teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml; EXCILOR FORTE, 30 ml.

Nagų grybelines ligas sudėtinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor“ buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas. „Excilor“ pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus; 2) optimalus ir visiškai prasiskverbiamas į nagą. „Excilor“ greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiko nago ataugimą. „Excilor“ išdžiūsta per kelias sekundes, nepalikdamas matomos plėvelės; 3) patogumas. „Excilor“ paprasta naudoti, nereikia dilyti nago. Efektyvus gydymas užtikrinamas laikantis gydymo režimo: 1 kartą ryte ir 1 kartą vakare, iš viso 1 minutę per dieną.

Naujos kartos priemonė nagų grybeliui gydyti!

NUO  
6<sup>09</sup> €

Laimei, yra Bepanthen®  
Gydo ir apsaugo odą

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g; Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g. Nereceptiniai vaistai.

1 g preparato yra 50 mg deksantenolio. **Terapinės indikacijos:** įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu prieuždegiminiu ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pavyzdžiui nedidelių pažeidimų (nedidelių nudegimų arba nubrozdinimų), odos sudirginimų, išbėrimo nuo sauskelnių, skausmingų ir įtrūkusių spenelių gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato vieną ar daugiau kartų per dieną, reikalingu esant. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. **Kontraindikacijos:** alergija veikliąjiai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis.

Reklamos teksto parengimo data: 2024-10 CH-20241030-71

Bepanthen Plus 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g. Nereceptinis vaistas.

1 g kremo yra 50 mg deksantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. **Terapinės indikacijos:** lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz. nubrozdinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremu sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. **Kontraindikacijos:** alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkės ausies būgnelis, negalima tepti ausies ertmę. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** saugokite, kad kremas nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju.

Reklamos teksto parengimo data: 2024-10 CH-20241030-71

Tobula esti tu. BIOCELL tai išsaugo.  
**BIOCELL**

**-50%**

BIOCELL stangrinamoji veido kaukė ANTI-AGING, N1  
BIOCELL regeneruojanti veido kaukė 22 g, N1



**URIAGE**  
EAU THERMALE

**-50%**

Valomieji miceliniai vandenys, 500 ml

**DIDELĖS pakuotės!**



**-35%**

Perkant už 30€ ir daugiau



Dieninis kremas nuo raukšlių  
**HYALURON-FILLER SPF 30, 50 ml**

Dieninis kremas brandžiai odai  
**Hyaluron-Filler + Elasticity SPF 30, 50ml**

**GROŽVITA**

Šampūnas nuo plaukų slinkimo, 200 ml  
Serumas nuo plaukų slinkimo, 125 ml

**1+1**



EAU THERMALE  
**Avène**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-40%**

Terminis vanduo  
300 ml, 150 ml, 50 ml



**PARASOFTIN**  
Švelnių pėdų paslaptis!

**-40%**

Perkant 2 prekes ir daugiau



Šveičiamoji ir regeneruojanti pėdų kaukės (pakuotėje 1 pora), pėdų kremas Silk, 50 ml

**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-40%**

**DIDELĖS pakuotės!**



BIODERMA kremas normaliai, sausai odai „Atoderm Crème Ultra“, 500 ml

BIODERMA kremas emolientas labai sausai ir atopiškai odai „Atoderm Intensive Baume“, 500 ml

# SVEIKOS VASAROS RITMU

Sveikos vasaros ritmu kviečiame sustoti akimirkai ir sąmoningai pasirūpinti tuo, kas svarbiausia – gera savijauta, kasdienė energija ir artimųjų sveikata.

Lengvai susikomplektuota kelionių vaistinė, pakankama hidratacija bei dėmesys odos apsaugai gali tapti mažais, bet labai svarbiais kasdieniais sprendimais. Skirkite daugiau dėmesio sau ir savo šeimai – be streso, natūraliai įsiliejant į vasaros ritmą.

NAUJIENOS



**SOLERO** -40% 



**URIAGE** -40%   
EAU THERMALE

Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 06 30



**Leukoplast**

**LEUKOPLAST® IR LEUKOTAPE®K.**

Med. paskirties prekės

**LEUKOPLAST®** – aukštos kokybės pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms, tokioms kaip įpjovimai, įbrėžimai, nubrozdinimai ar įtrūkimai. Yra įvairių tipų pleistru: sterilūs, atsparūs vandeniui ar apsaugantys nuo bakterijų patekimo į žaizdą, itin tvirtai prilimpantys ar švelnūs odai. Išsirinkite tinkamiausius savo pirmosios pagalbos vaistinėlei.

**LEUKOTAPE®K** – kineziterapinis pleistras, naudojamas siekiant sušvelninti skausmą stimuliuojant mechanoreceptorius odoje. Tinka naudoti sporto medicinoje ir reabilitacijoje. Mažina įtampą raumenyse ir stiprina nusilpusius raumenis, stabilizuoja sąnarius, mažina skausmą ir uždegimą, gerina kraujo ir limfos pratekėjimą po oda, formuoja laikyseną.



**LIVSANE**

**LIVSANE MAGNIO MAISTO PAPILDAI**

Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią energijos apykaitą.

**1+1** 



**-30%**



**APIVITA** | Veido priežiūros priemonėms

**-30%**

3,99€ 2,79€



**SKINCYCLOPEDIA**  
Lakštinės veido kaukės ir gelinės paakių kaukės

**VEIDO KAUKĖMS**

**Elamé** **AIMX**

Šilkinis prisilietimas | Poveikis patvirtintas kliniškai

**-50%**

Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.

**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-30%**



**BIODERMA**  
ATODERM linijos produktams

**sensilis**

**IKI 30%**



**Sensilis dermatologinė kosmetika** skirta jautriai ir amžėjančiai odai prižiūrėti. Priemonės ramina, padeda palaikyti normalią jautrios, paraudusios odos barjerinę funkciją, tonizuoja ir drėkina odą, tausodamos jos ekosistemą (pH, mikrobiotą ir hidrolipidinę plėvelę).



**FILORGA**  
TIME-FILLER kosmetikos linijai

+ TIK FIZINĖSE VAISTINĖSE

noreva  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Veido kremai su SPF

-40%

Perkant už 29 € ir daugiau



Jūsų sveika ir švytinti oda!

Prancūzų kosmetika „Noreva“ siūlo sprendimus pagal specifinius odos poreikius - nuo sausos, dehidratuotos ir jautrios iki riebios, pigmentuotos ar pažeistos odos. Priemonės padeda spręsti odos problemas bei apsaugo nuo žalingų saulės spindulių bei mėlynosios šviesos poveikio. Priemonės kasdien prisideda prie geresnės odos būklės palaikymo ir padeda išlaikyti odos sveikatą bei jaunystę. Noreva - mokslu grįsta dermokosmetika jūsų odos gerovei!

**DEKORATYVINEI KOSMETIKAI**

**IDUN** MINERALS

*jane iredale*  
THE SKINCARE MAKEUP®

**-40%**

Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.

**SVR** -25%



**SVR**  
Veido kremams ir serumams

**-25%**



**TRANSPARENT LAB**  
Atrinktomis veido priežiūros priemonėms

**ISDIN** -25%

LOVE YOUR SKIN



**GROŽIS ĮKVĖPTAS MOKSLO**

Ispanų dermatologinė kosmetika ISDIN, skirta kovai su odos senėjimo žymėmis. Veiksmingos formulės, pagrįstos ilgamečiais tyrimais ir naujausiais mokslo pasiekimais, įkūnija mokslo ir grožio pusiausvyrą.



**-40%**

**DIDELĒS PAKUOTĒS**

**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

BIODERMA aliejinis prausiklis „ATODERM HUILE DE DOUCHE“, papildymas 1L

BIODERMA gelinis dušo prausiklis „ATODERM“, papildymas 1L



**-30%**

**DIDELĒS PAKUOTĒS 500 ml**

**LISTERINE**

Burnos skalavimo skysčiai LISTERINE padeda saugoti dantis nuo apnašų, palaiko gaiņų burnos kvapā. Pasiekia vietas, kurių dantū šepetēlis negali pasiekti. Su šepetēliu tik pusē darbo - naudok ir Listerine.

LISTERINE burnos skalavimo skysčiāi COOL MINT, 500 ml  
LISTERINE burnos skalavimo skystis TOTAL CARE, 500 ml  
LISTERINE burnos skalavimo skystis, be alkoholio, COOL MINT MILD TASTE, 500 ml



**-30%**

**DIDELĒS PAKUOTĒS**

Perkant uż 20€ ir daugiau

**Eucerin®**

Kūno priežiūros priemonēs didelēse pakuoēse



**-40%**

**DIDELĒS PAKUOTĒS**

Perkant uż 15 € ir daugiau

**LABORATOIRE A-DERMA**

Kūno priežiūros priemonēs didelēse pakuoēse



**-40%**

**DIDELĒS PAKUOTĒS**

Perkant 2 prekes ir daugiau

**BABE**  
LABORATORIOS

Kūno priežiūros priemonēs didelēse pakuoēse



**-40%**

**DIDELĒS PAKUOTĒS 500 ml**

Perkant 2 prekes ir daugiau

**BABE**  
LABORATORIOS

BABE aliejinis kūno prausiklis BODY, su Omega 3, 6 ir 9 riebiosiomis rūgštīmīs, 500 ml

BABE atkuriamasis kūno losjonas BODY sausai odai su 10% šlapalo 500 ml



**1+1**

**DIDELĒS PAKUOTĒS**

29,79 €

**BABE**  
LABORATORIOS

BABE drēkinamasis atkuriamasis alavijo gelis BODY, 300 ml



**-40%**

DIDELĒS PAKUOTĒS  
**500 ml**

**APIVITA**



APIVITA, šampūnas HYALURONIC HYDRA, drēkinamasis, 500ml

APIVITA šampūnas kasdienio naudojimo, 500ml



**-40%**

DIDELĒS PAKUOTĒS  
**500 ml**

**URIAGE**

EAU THERMALE

Kūno priežiūros priemonėms didelėse pakuotėse



**-40%**

DIDELĒS PAKUOTĒS  
**400 ml**

LABORATOIRES

**KLORANE**

KLORANE šampūnai su chininu ir vitamino B kompleksu, su avių pienėliu, dilgėlių arba citrinų ekstraktu, mango sviestu, 400 ml

**Aveeno**  
ACTIVE NATURALS

Kūno priežiūros priemonėms

**-40%**

DIDELĒS PAKUOTĒS



**-40%**

DIDELĒS PAKUOTĒS

**Cetaphil**

CETAPHIL drėkinamasis veido ir kūno losjonas, 500 ml

Cetaphil drėkinamasis kūno kremas, 453 g

CETAPHIL švelnus odos valiklis, 500 ml



**-40%**

DIDELĒ PAKUOTĒ  
**500 ml**

26,99€ 16,19€

**URIAGE**

EAU THERMALE

URIAGE gaivus gelis intymiai higienai „GYN PHY“, 500 ml

# PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

# IKI -40%



**-40%**  
**HARKONTROLL®**

Harkontroll – tai inovatyvi švediška plaukų priežiūros sistema, sukurta siekiant užtikrinti visapusišką plaukų ir galvos odos puoselėjimą. Dėl subalansuotų, aktyviųjų ingredientų – pantenolio, alantoino, kolageno bei argano ir ricinų aliejų, Harkontroll produktai ramina galvos odos sudirgimus, intensyviai drėkina, stiprina plauko struktūrą, mažina sausumą, padeda atkurti natūralų plaukų žvilgesį bei elastingumą. Reguliariai naudojimas gerina bendrą plaukų būklę, apsaugo nuo žalingo aplinkos poveikio ir palaiko galvos odos balansą.

## PHYTO PARIS

Visai produkcijai

**-40%**



## URIAGE EAU THERMALE

**-40%**



### URIAGE D.S. HAIR

Kosmetikos priemonės

Priemonių sudėtyje esančių Piroktono olamino ir Cinko laktato kombinuotas veikimas padeda kovoti su Malassezia grybeliu, kuris sukelia gausų galvos pleiskanojimą.

## FORCAPIL®

Pasirūpins tavo plaukais!

**-40%**



Kosmetika plaukams + maisto papildai

Forcapil plaukų priežiūros priemonės su augalų ekstraktais, keratinu, amino rūgštimis, biotinu bei vitaminų B, D, cinko kompleksais, kurie pasirūpins jūsų plaukais tiek iš vidaus, tiek iš išorės. **Pagaminta Prancūzijoje!**

## Nizoral® Daily Care

Sveikai galvos odai ir  
gražiems plaukams!

**-40%**



**NIZORAL® CARE** šampūnas sausiai ir jautriai galvos odai. Labai sausiai, pleiskanojančiai, jautriai ir j egzema linkusiai galvos odai.

**NIZORAL® CARE** šampūnas riebiai galvos odai ir plaukams. Valo galvos odą, šalina pleiskanas, mažina niežėjimą.

**NIZORAL® CARE** galvos odos ir plaukų kondicionierius. Maitina plaukus, ramina galvos odą.

**NIZORAL® CARE** galvos tonikas. Greitai ramina niežtinčią ir pleiskanojančią galvos odą.

2604\_SB\_Nizoral\_V01\_LT

## Helen Seward MILANO

IKI -40%



**+ TIK FIZINĖSE VAISTINĖSE**

**HELEN SEWARD** plaukų priežiūros priemonės siūlo intensyvių atgaivinimą ir apsaugą. Šios priemonės skirtos atkurti plaukų stiprumą ir blizgesį.

# URIAGE

EAU THERMALE

## KOSMETIKOS DIENOS

IKI **-40%**



Kai kuriems produktams nuolaida galios perkant už 15 € ir daugiau.

URIAGE dermatologinės kosmetikos pagrindas – unikalios sudėties termišinis vanduo iš Prancūzijos Alpių, kuriame gausu mineralinių medžiagų ir mikroelementų, o vandens sudėtis labai artima žmogaus organizme esančių skysčių sudėčiai. URIAGE termišinis vanduo drėkina, ramina ir minkština odą, padeda apsaugoti nuo laisvųjų radikalų poveikio. **Kiekvienai dienai. Kiekvieno poreikiams. Visai šeimai.**

# ODA

PRO

## KOSMETIKOS DIENOS

**-35%**



Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.

# BIODERMA

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**-25%**



NODE plaukų priežiūros linijai

# GAMARDE

Soins Bio Dermatologiques

## KOSMETIKOS DIENOS

IKI **-40%**



Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos.



IKI **-40%**



**TEPE**

Visoms burnos priežiūros priemonėms.

Tepe produkcija pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. Tarpančių šepetėlis – veiksmingiausias būdas pašalinti apnašas tarp dantų, kur įprastas dantų šepetėlis nepasiekia. Kasdienis naudojimas gali padėti pašalinti iki 40% daugiau apnašų nei vien dantų valymas. Dantų pastos švelnios, neputojančios arba mažai putojančios, be SLS, be mikroplastiko.

Tepe rūpinasi sveika Jūsų šypsena!



**-50%**

Antrai prekei

**ELMEX**

Dantų pastos „Elmex“ su amino fluoridu padeda formuoti apsauginį sluoksnį, kuris stiprina dantų emalį. Švelnios valomosios dalelės pritaikytos jautriems dantims, o amino fluoridas padeda remineralizuoti pažeistas emalio vietas. Reguliariai naudojant, šios priemonės padeda palaikyti stiprius ir sveikus dantis. Burnos higienos priemonės „Elmex“ sukurtos atsižvelgiant į įvairius poreikius – nuo kasdienės priežiūros iki specializuotų sprendimų skirtingoms amžiaus grupėms.

Pasirinkite patikimumą. Pasirinkite „Elmex“.



**-40%**

Perkant 2 prekes ir daugiau



**GUM DANTŲ PASTOS**

Sveikos dantenos – sveiksnis gyvenimas.

**-30%**

Perkant 2 prekes ir daugiau



**ELGYDIUM**

„Elgydium“ siūlo specializuotus sprendimus burnos ir dantų priežiūrai suaugusiems ir vaikams – nuo jautrių dantų ir dantenu priežiūros iki dantų apnašų kontrolės bei kasdienės burnos higienos.

Elgydium – jūsų šypsenos priežiūra

**-20%**



**CURAPROX**

Curaprox – aukštos kokybės burnos higienos priemonės, gaminamos Šveicarijoje. Curaprox produktai yra gaminami glaudžiai bendradarbiaujant su odontologais, todėl jie yra itin efektyvūs puikiam burnos higienos palaikymui. Platus asortimentas suteikia galimybę išsirinkti produktus pagal asmeninius kiekvieno žmogaus poreikius. **Curaprox – tobulai burnos higienai!**

**-20%**



**CURAPROX**

Dantų pastos BE YOU, 60 ml

Šveicarų gamintojo natūraliai balinančios, kasdien naudoti tinkamos dantų pastos.

Curaprox – tobulai burnos higienai!

**-30%**

13,99€ 9,79€



**OPALESCENCE**

OPALESCENCE balinamoji dantų pasta „COOL MINT“, 100 ml

**-40%**



**LIVSANE**  
Burnos priežiūros priemonės ir protezų priežiūros priemonės

**-40%**



**ORAL-B iO serija**  
Elektriniai dantų šepetėliai ir jų galvutės

Dantų priežiūros priemonės padeda užkirsti kelią dantų ėduoniui ir kovoti su dantų problemomis. Burnos priežiūros priemonės „ORAL-B“ šalina apnašas ir dantų paviršiaus dėmes, neleidžia formuotis dantų akmenims ir per dideliu jautrumui, gaivina burnos kvapą. Priemonės galite rinktis iš didelio asortimento, kuris pritaikytas įvairių poreikių turintiems žmonėms.

**1+1**



**LACALUT**  
Burnos priežiūros priemonės.  
„Lacalut“ – odontologas tavo namuose!

**-25%**



**BLEND-A-DENT**  
„Blend-A-Dent“ fiksuojamasis kremas dantų protezams – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgate, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-A-Dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą sukurdamas pagalvėlę tarp dantų ir dantų protezų, bei apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu nesivaržydami.

**-30%**



**CURASEPT**  
Burnos priežiūros priemonės BIOSMALTO ir ADS.

**-50%**



**CURASEPT BOOSTER**  
Burnos skalavimo skysčiai ir dantų pastos

**1+1**



**VELYM®**  
Burnos higienos priemonės

**VELYM pH neutro** – klinikiniais tyrimais patvirtintas balinamasis dantų kremas. Kasdienė apsauga. Sudėtyje – natūralios kilmės medžiagos ir 1450 ppm fluoro. Skirtas suaugusiems.

**VELYM MINERAL 03** – sudėtyje ozono prisotintas alyvuogių aliejus. Daugiau dėmesio dantenoms. Aukštas apnašų valymo koeficientas (angl. Pellicle Cleaning Ratio, PCR)

# KOSMETIKAI NUO SAULĖS

Perkant 2 prekes ir daugiau

# -40%



EAU THERMALE  
**Avène**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**Eucerin**<sup>®</sup>



**SVR**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**ISDIN**  
LOVE YOUR SKIN



**BIODERMA**  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

**TIK FIZINĖSE VAISTINĖSE**

# -40%



Veido priežiūros priemonės su stipria apsauga nuo saulės

CLINICALLY  
PROVEN  
**seba med**<sup>®</sup>  
SCIENCE FOR HEALTHY SKIN

# -40%



**SEBAMED BABY**  
Visoms kosmetikos priemonėms.

Būkite ramūs, kai dygsta dantukai!

# -25%



## KAMISTAD<sup>®</sup> PURŠKALAS | KAMISTAD<sup>®</sup> BABY GELIS

**Kamistad<sup>®</sup> purškalas – medicinos priemonė, 20 ml**

Kamistad<sup>®</sup> burnos purškalas su ramunėlėmis skirtas švelniai burnos gleivinės ir dantų priežiūrai. Sukamu purškutu galima tiksliai purkšti į gleivinę ir sunkiai pasiekiamas burnos ertmės vietas.

**Kamistad gelis – kosmetika, 20 ml**

Vaikams, dantukų dygimo metu. Su ramunėlėmis. Vėsinai ir ramina skaudančias dantenas. Be alkoholio. Be cukraus.

2604\_SB\_Kamistad\_V01\_LT



Stipri, bet švelni  
kūdikio odėlės apsauga!

# -30%

7,49€ 5,24€



## BEPANTHOL BABY

**Bepanthol Baby tepalas, 30g**

**Kosmetikos priemonė**

Tepalas su deksantenoliu skirtas sausos, jautrios ir dirglios kūdikio odėlės priežiūrai bei padeda apsaugoti kūdikio užpakaliuko odėlę nuo paraudimo. Be kvapiųjų medžiagų, konservantų ar dažiklių.

CH-20251201-17





## PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

IKI **-40%**

Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis.



## BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

IKI **-40%**

Akcija galioja 2026 05 01 – 2026 05 31 BENU PLUS ir Mano Rimi lojalumo programų nariams. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis.

Leidinyje pateiktos kainos, galiojančios fizinėse vaistinėse, su PVM. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. Jei leidinyje pateiktos kainos ir kita informacija nesutampa su vaistinėje esančia, prašome vadovautis vaistinėje esančia informacija, o informaciją leidinyje laikyti spaudos klaida. Kainos, nuolaidos bei akcijos leidinyje ir elektroninėje parduotuvėje gali skirtis. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Nuolaidos netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Įprastos kainos ir akcijos gali skirtis atskirose vaistinėse. Nuolaidos ir akcijos galioja 2026 05 01–2026 05 31. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į BENU Vaistinė Lietuva, UAB administracijos patvirtintą sąrašą, kurio galite teirautis fizinėse vaistinėse. Akcijos „-50%/-60%/-70% antrai prekei, 1+1, 2+1“ ir pan. taikoma tiek pat kainuojančiai arba pigesnei prekei. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Negalima viršyti rekomenduojamos maisto papildų paros dozės. Maisto papildas negali būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Prašome įdėmiai perskaityti informacinį lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Jei simptomai neišnyksta arba atsiranda šalutinis poveikis, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt). Už BENU Vaistinės leidinyje pateikiamos informacijos apie produktus teisingumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako atitinkamų produktų rinkodaros teisių turėtojai (arba jų atstovai Lietuvoje).