2026 m. reklaminis
leidinys Nr. 11 (240)

CAMELIA VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė

Galioja
2026 11 01-2026 11 30



KARTU VIENAS DĖL KITO

„Camelia“ palaiko žmones su negalia

Nuolaidos iki -30%

Kartu vienas dėl kito

Lietuvos paralimpinis komitetas

Pasiūlymai galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20 %, kosmetikai -25 %, kitoms prekėms iki -20 %) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta neįgaliųjų lojalumo programos „Kartu vienas dėl kito“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – www.camelia.lt/kartu ir vaistinėse.

Geriausi „CAMELIA“ M

1 89 €

Nuo kosulio

BRONTEX

30 mg tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. Indikacijos: kvėpavimo takų sekreto skystinimas ligoniams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 6-12 metų vaikams – 2-3 kartus per parą po 15 mg ambroksolio (po pusę tabletės); suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – 2-3 kartus per parą po 30 mg ambroksolio (po 1 tabletę). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę reikėtų mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio nepatariama vartoti ilgiau negu 4-5 paras. Kontraindikacijos: „BRONTEX“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. „BRONTEX“ 30 mg tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: jų reikia laikytis, jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, jei sutrikusi inkstų veikla arba sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai. Jeigu vartojant ambroksolio hidrochlorido pasireiškė odos išbėrimas (įskaitant gleivinės, pvz., burnos, gerklės, nosies, akių, lyties organų, pažeidimus), reikia nedelsiant nutraukti gydymą ir kreiptis medicininės pagalbos. Dėl sudėtyje esančios 169,46 mg laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-28. BRO-LT-00064.

1 99 €

Rūgštingumui mažinti

ESCADRA® 20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

Veiklioji medžiaga, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Indikacijos: GERL, pažeistai ar uždegimo apimtai stemplei užgydyti; minėtų būklių pasikartojimo profilaktikai; nemaloniems simptomams, dažnai būnantiems esant šioms būklėms, lengviniti. Skrandžio ar viršutinės žarnyno dalies (dvylikapirštės žarnos) opai, *Helicobacter pylori*, skrandžio opai, sukeltai NVNU, užgydyti. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų atsiradimo profilaktikai, jei vartojama NVNU. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti vieną kapsulę per dieną. Kontraindikacijos: „ESCADRA“ vartoti draudžiama, jeigu yra: alergija (padidėjęs jautrumas) ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei „ESCADRA“ medžiagai; alergija kitiems protonų siurblio inhibitoriams (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, omeprazolui); jei vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinaviro (vaisto nuo ŽIV); jeigu po „ESCADRA“ ar kitų panašių vaistų vartojimo kada nors pasireiškė sunkus odos išbėrimas arba odos lupimasis, pūslės ir (arba) burnos opos. Specialūs įspėjimai: vaisto vartoti atsargiai, jeigu: sergate sunkia kepenų liga arba sunkia inkstų liga; jums yra vitamino B12 trūkumas; jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į „ESCADRA“, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas; jeigu jums bus atliekamas specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A).* Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-08.

TIK „CAMELIA“

2 59 €

Peršalimo simptomams lengvinti

AIDEX®



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1-oje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido ir 60 mg askorbo rūgšties. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, ryklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, neproduktyvaus kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų įprastinė vienkartinė dozė yra 1 tabletė. Ji vartojama 4 kartus per dieną, ne dažniau kaip kas 4 valandas. Didžiausia vienkartinė dozė – 2 tabletės. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; mažesnis nei 12 metų amžius; nėštumas, žindymas; sunki hipertenzijos, išeminės širdies bei kepenų ligos forma arba inkstų funkcijos sutrikimas; glaukoma; nosies gleivinės paburkimą mažinančių vaistų vartojimas; anksčiau buvęs insultas arba esanti jo rizika; prostatos padidėjimas; anksčiau persirgtas miokardo infarktas; feochromocitoma; cukrinis diabetas; lėtinis alkoholizmas; anksčiau buvę traukuliai; sisteminė raudonoji vilkligė; hipertireozė; badavimas. Specialūs įspėjimai: pacientams, besiskundžiantiems lėtiniu kosuliu, sergantiems bronchų astma ar tiems, kuriuos ištiko astmos priepuolis bei atkosinitiems gleivinio sekreto, šio vaisto be gydytojo priežiūros vartoti negalima. Pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkiu inkstų nepakankamumu, lengvu arba vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, hipertenzija, širdies liga, hipertireoze, psichoze, cukriniu diabetu, sistemine raudonąja vilklige ir miršia jungiamojo audinio liga ir /ar ūminiu hepatitu, vartojantiems kepenų funkciją veikiančius vaistus ir /ar vaistus nuo migrenos, taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija ar dehidratacija bei tiems, kurie piktnaudžiauja alkoholiu ar nuolat blogai maitinasi, „AIDEX“ patariama vartoti atsargiai. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios išlieka didelis karščiavimas, kosulys, atsiranda bėrimas, ryklės, galvos, skausmas, pykinimas, vėmimas - patariama kreiptis į gydytoją. Pasireiškus pykinimui, hipertenzijai, tachikardijai, palpitacijai, odos paraudimui ar bėrimui, sutrikus širdies ritmui arba atsiradus bet kokių neurologinių požymių, vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti.* Reklamos teksto parengimo data: 2021-09-16.

LENGVINA PERŠALIMO IR GRIPO SIMPTOMUS!

2 99 €

Nuo skausmo ir karščiavimo

IBUPROM®

400 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 plėvele dengtų tablečių

Veikliojі medžiaga, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Tabletę reikia nuryti valgio metu arba pavalgius, užsigeriant stikline vandens. Jaunesniems nei 12 m. vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-23.

RENKUOSI „IBUPROM”. RENKUOSI LAISVĘ.

2 99 €

Nuo slogos

XYMELIN®

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukelto nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 10 m. vaikams ir suaugusiesiems – 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. „XYMELIN“ galima vartoti tol, kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 7 dienas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei yra antinkščių navikas (feochromocitoma), sustiprėjusi skydliaukės veikla, sergate cukriniu diabetu ar sutrikęs šlapinimasis dėl padidėjusios prostatos. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Labai jautriems pacientams vaistas gali sukelti miego sutrikimų, galvos svaigimą, tremorą, širdies ritmo sutrikimą, aukštą kraujospūdį. Jei kartu vartojama vaistų nuo depresijos, gali stiprėti šalutinis poveikis.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-12-08. LT-XYME-2200005.

3 99 €

Nuo sąnarių ir raumenų skausmo

DEEP RELIEF®

50 mg / 30 mg / g gelis



Nereceptinis vaistinis preparatas, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Indikacijos: lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimo) sukelto skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kaip kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g pakuotės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkias dienas, kreiptis į gydytoją. Duomenų apie „DEEP RELIEF“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Senyviems pacientams ir pacientams, kurių inkstų ir (arba) kepenų funkcija sutrikusi dozės keisti nereikia. Vartojimo metodas: plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NVPNU), įskaitant ir vartojamus per burną. Draudžiama vartoti astma sergantiems pacientams, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: „DEEP RELIEF“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų ant nubrozdintos, uždegimo pažeistos odos. Jeigu atsiranda odos bėrimas ar sudirginimas, vaistinio preparato nebevartoti. Netinka tepti po sandarinamuoju tvarsčiu. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-10-09.


VĖSINANTIS IR SKAUSMĄ MALŠINANTIS GELIS.

3 99 €

Nuo gerklės skausmo

STREPSILS®

INTENSIVE 8,75 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 16 kietųjų pastilių

Veikliojі medžiaga, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų amžiaus vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams kas 3-6 valandas, kai reikia, lėtai sučiulpti (čiulpiant judinti burnoje, kad būtų išvengta lokalaus dirginimo) po vieną kietąją pastilę. Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo pepsinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: vaistą reikia vartoti atsargiai pacientams, kurie serga sistemine raudonąja vilklige ir miršia jungiamojo audinio liga, serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga, turi širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų, sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga), jei pasireiškia pirmosios odos reakcijos (išbėrimas, lupimasis, pūslių atsiradimas) arba kitokie alerginės reakcijos požymiai. Vaistą reikia vartoti atsargiai nėščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms bei senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. „STREPSILS INTENSIVE“ pastilės sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės (cukraus), į tai turėtų būti atsižvelgta sergant cukriniu diabetu. Jeigu pacientas yra alergiškas kviečiams (ši liga skiriasi nuo celiakijos), šio vaisto vartoti negalima. Sudėtyje esantis citralis, citronelolis, d-limonenas, farnezolis, geraniolis ir linalolis gali sukelti alerginių reakcijų, sieros dioksidas gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą, butilhidroksianizolas gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-08-10.

po **4 39 €**

THERAFLU ND

milteliai geriamajam tirpalui 4,39 €

THERAFLU NT

milteliai geriamajam tirpalui 4,39 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 6 paketėliai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „THERAFLU ND“: 1000 mg paracetamolio, 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 30 mg dekstrometorfano hidrobromido. „THERAFLU NT“: 1000 mg paracetamolio, 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 30 mg dekstrometorfano hidrobromido, 4 mg chlorfenamino maleato. Indikacijos: „THERAFLU ND“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės uždurkimo, erzinančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. „THERAFLU NT“: peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės uždurkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems bei paaugliams nuo 16 m.: gerti po 1 pak. kas 6 val. pagal poreikį. Negalima vartoti daugiau kaip 4 pak. per 24 val. Gydymo trukmė neturi viršyti 3 parų. 1 pak. turinį ištirpinti stiklinėje karšto, tačiau ne verdančio vandens ir išgerti. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; per paskutines 2 sav. vartoti vaistai nuo depresijos arba Parkinsono ligos (MAOI); kitų simpatomimetikų vartojimas; uždaro kampo glaukoma, nėštumo laikotarpis. „THERAFLU ND“: labai aukštas kraujospūdis; širdies kraujagyslių liga; sunkus inkstų veiklos sutrikimas; kvėpavimo nepakankamumas; plaučių liga ar astmos priepuolis; vartojami oksazolidinono klasės antibiotikai; žindymo laikotarpis. „THERAFLU NT: sunki širdies liga; kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. Specialūs įspėjimai: nevartoti kitų vaistų, kuriuose yra paracetamolio. Nevartoti alkoholio. Pasitarti su gydytoju, jei yra inkstų ar kepenų liga, lėtinis alkoholizmas, gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės nepakankamumas, padažnėjęs širdies ritmas, aukštas kraujospūdis, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, cukrinis diabetas, padidėjusi prostata, psichikos liga, kosulys su dideliu skrepliu kiekiu, lėtinis kosulys, aukšta temperatūra, išbėrimas, pastovus galvos skausmas, taip pat, jei vartojate vaistų nuo depresijos ar psichozių, netekus skysčių ar badaujant. Pasireiškus karščiavimui ir išplitusiai raudonei su smulkiais pūlinėliais, stipriam galvos skausmui, pykinimui, vėmimui, regėjimo sutrikimams, staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš tiesiosios žarnos ar kitiems išeminio kolito simptomams, likus kelioms dienoms iki operacijos, būtina nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Gali sukelti priklausomybę. Sudėtyje yra aspartamo ir sacharozės. „THERAFLU ND“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra širdies liga ar antinkščių auglys, vyresniems nei 60 m. „THERAFLU NT“: pasitarti su gydytoju, jeigu yra kvėpavimo nepakankamumo pavojus, hemolizinė anemija.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-09-17.

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

MAŽŲ KAINŲ pasiūlymai

CAMELIA VAISTINĖ
Mažų kainų vaistinė

TIK „CAMELIA“

-50% nuo 4,49 €

Imunitetui ir žarnyno mikroflorai

BIFIDIN IMMUNO
20 kapsulių ~~9,98~~ 4,99 €

BIFIDIN
15 kapsulių ~~8,99~~ 4,49 €



Maisto papildai
„BIFIDIN IMMUNO“ sudėtyje yra 9 rūšys skirtingų Lactobacillus ir Bifidobacterium bakterijų. Sudėtyje esantys cinkas ir vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Maisto papildo „BIFIDIN“ sudėtyje yra 7 rūšys skirtingų *Lactobacillus, Bifidobacterium* ir *Streptococcus* bakterijų ir vitaminų A, C, E. „BIFIDIN“ sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai C ir E taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
GEROSIOS BAKTERIJOS ŽARNYNUI!

TIK „CAMELIA“

-50% nuo 2,99 €

Gerklei

INGESAN
pastilės su islandine kerpena ~~5,99~~ 2,99 €
SOFT minkštosios pastilės su islandine kerpena ~~6,89~~ 3,44 €



Maisto papildai, 24 pastilės
„INGESAN“ kietosios pastilės ir „INGESAN SOFT“ juodųjų serbentų skonio minkštosios pastilės su islandine kerpena padeda palaikyti normalią imuniteto veiklą.
KAI IMUNITETAS STIPRUS, IR PERŠALIMAS NEBAISUS!

-50% 2,54 € ~~5,09 €~~

Virškinimui

GASTROVAL®



Maisto papildas, 15 kietų kapsulių
„GASTROVAL“ sudėtyje – augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurio naudą lengva pajusti. Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti.
„GASTROVAL®“ SUPRANTA, KO REIKIA VIRŠKINIMUI.

-50% 6,44 € ~~12,89 €~~

Imunitetui

ACONITUM VITAMIN C PROLONG



Maisto papildas, 40 kapsulių
„VITAMIN C PROLONG“ kapsulėse yra ir prailginto veikimo patentuoto vitamino Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-50% 17,34 € ~~34,69 €~~

Imuninei sistemai

IMUNITAL® SHOTS



Maisto papildas, 20 geriamųjų dozių po 10 ml
„IMUNITAL SHOTS“ – 5 ingredientų formulė imunitetui: bičių pienelis, reishi ir shiitake grybų ekstraktai, priešpienio koncentratas ir vitaminas B6. Patogi skysta forma – tik vienas 10 ml buteliukas per dieną.

-50% 14,24 € ~~28,49 €~~

Imunitetui, širdžiai, smegenims, regėjimui

FJØRD STRONG OMEGA-3



Maisto papildas, 80 kapsulių
Rinkitės žuvų taukus „FJØRD STRONG OMEGA-3“:
- stiprios koncentracijos omega-3 su ypač dideliu kiekiu bioaktyviųjų rūgščių EPR ir DHR;
- gerai įsisavinami – natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos;
- pagaminti iš laukinių, mažų, riebių žuvų.

„FJØRD STRONG OMEGA -3“ – GALI DAUGIAU NEI TIKIESI.

4,79 €

Kepenims

CARSIL®
22,5 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 80 dengtų tablečių
Veikliojo medžiaga, stiprumas: 1 dengtojoje tabletėje yra 40,9–56,3 mg margainių vaisių (Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus) rafinuoto ir standartizuoto sausojo ekstrakto (35–50:1), atitinkančio 22,5 mg silimarino, išreikšto silibininu. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, sergantiems lengva arba vidutinio sunkumo kepenų liga, rekomenduojama vartoti po 3–4 dengtąsias tabletes 3 kartus per dieną. Gydymo kurso trukmė turėtų būti ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai. Tablečių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. Kontraindikacijos: preparato „CARSIL“ vartoti negalima, jeigu yra alergija silimarinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, taip pat astrinių ar graižažiedžių (Asteraceae / Compositae) šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „CARSIL“, jeigu sergate diabetu ar yra sumažėjusi gliukozės koncentracija kraujyje; vartojant „CARSIL“ gali sumažėti gliukozės koncentracija kraujyje. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 m. paaugliams, nes duomenų apie šio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Kitų vaistų vartojimas: duomenų apie „CARSIL“ sąveiką su kitais preparatais nėra. „CARSIL“ vartojimas su maistu ir gėrimais: duomenų nėra. Nėštumas ir žindymo laikotarpis: jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Klinikinių duomenų apie silimarino vartojimą nėštumo metu nėra, taip pat nežinoma, ar silimarino patenka į motinos pieną.* Reklamos teksto parengimo data: 2017-11-07.
KAD JŪSŲ KEPENYS BŪTŲ SVEIKOS!

-50% 21,94 € ~~43,89 €~~

Cholesterolio kontrolei ir kraujotakai

NATASPIN® CONTROL PRO



Maisto papildas, 90 kapsulių
Rinkitės sprendimą teisingam cholesterolio palaikymui. „NATASPIN CONTROL PRO“ – tai pažangi, daugiafunkcinė formulė, įkvėpta japonų ilgaamžiškumo filosofijos, sukurta padėti palaikyti normalų cholesterolio lygį, kraujotakos sistemą ir kepenų veiklą. Sudėtyje naudojami išskirtinai tik aukštos kokybės, standartizuoti, bioaktyvūs ekstraktai.
Dažinės ciberžolės padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, normalų kepenų lipidų kiekį.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

CAMELIA VAISTINĖ
Mažų kainų vaistinė

YPATINGI

TIK „CAMELIA“

2,79 €

Nuo skausmo
FENEIT 25 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 plėvele dengtų tablečių
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 36,9 mg deksketoprofeno trometamolio, atitinkančio 25 mg deksketoprofeno. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo raumenų, kaulų, menesinių bei dantų skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms, atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, dažniausiai patariama vartoti po 12,5 mg kas 4-6 val. arba po 25 mg kas 8 valandos. Visa paros dozė neturi būti didesnė kaip 75 mg. Senyviems pacientams patariama gydymą pradėti mažiausia vaistinio preparato doze (paros dozė – 50 mg). Šio vaisto vartoti vaikams ir paaugliams (iki 18 m.) negalima. Kontraindikacijos: padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjes jautrumas acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo (NVNU), astma. Jeigu panašaus poveikio medžiagos sukelia švokštimą, ūminį alerginį rinitą, nosies polipus, dilgėline ar angioneurozinę edemą. Žinomos fotojautrumo ir fototoksiškumo reakcijos, buvusios gydant ketoprofenu ar fibratais. Buvęs virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, susije su NVNU vartojimu. Pepsinė skrandžio ir žarnyno opa, praeityje buvęs skrandžio ar žarnyno kraujavimas, išopėjimas ar perforacija. Esamas virškinimo trakto kraujavimas, išopėjimas ar perforacija. Lėtinė dispepsija, rėmuo. Nustatytas polinkis kraujuoti ar kraujo krešumo sutrikimas. Krono liga ar opinis kolitas. Sunkus širdies nepakankamumas. Vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Sunkus kepenų funkcijos sutrikimas. Sunki dehidratacija. Trečias nėštumo trimestras ir žindymo laikotarpis. Specialūs įspėjimai: atsargiai vaistinį preparatą reikia skirti pacientams, kurie anamnezėje nurodo alergines ligas; inkstų, kepenų ar širdies ligas, esant aplinkybėms, dėl kurių gali sutrikti skysčių išsiskyrimas, jei vartojama šlapimo išsiskyrimą skatinančių vaistų, esant skysčių netekimui, jeigu širdies veikla yra sutrikusi, patyrus insultą ar gresiant šioms būklėms, esant senyvo amžiaus, siekiant pastoti, sergant virškinimo, kraujodaros, jungiamojo audinio, infekcinėmis ligomis, sistemine raudonaja vilklige. Jei vartojama kitų vaistų, kurie padidina pepsinės opos ar kraujavimo riziką, antitrombozinių vaistų, kai kurių vaistų nuo depresijos. Jeigu sergama astma ir kartu lėtiniu rinitu, lėtiniu sinusitu ir (arba) nosies polipais. „FENEIT“ gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-04-15.

TIK „CAMELIA“

2,59 €

Skausmui, temperatūrai mažinti
PARACETAMOL INGEN PHARMA 500 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 tablečių
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1-oje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Indikacijos: malšinti silpną ir vidutinio stiprumo skausmą bei mažinti temperatūrą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams, kurie sveria daugiau nei 50 kg, gerti po 1–2 tabl. kas 4–6 val. pagal poreikį, ne daugiau kaip 8 tabl. per parą. Suaugusiesiems ir paaugliams virš 12 metų, kurie sveria mažiau nei 50 kg – po 1 tabl. kas 4–6 val. pagal poreikį, ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. 9–11 metų vaikams – po 1 tabl. kas 4–6 val., ne daugiau kaip 4 tabl. per parą. 6–8 metų vaikams – po 0,5 tabletės kas 4–6 val., ne daugiau kaip 2 tabl. per parą. Nerekomenduojama jaunesniems kaip 6 metų vaikams. Kontraindikacijos: padidėjes jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: vartodami šį vaistą negerkite alkoholio. „PARACETAMOL INGEN PHARMA“ gali būti vartojamas nėštumo ir žindymo metu taip, kaip nurodė gydytojas. Per didelis vaisto vartojimas gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą; nevartokite šio vaisto, jei vartojate kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Atsargiai vartokite, jei: sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; esate per mažo svorio ar nepakankamai maitinatės, reguliariai vartojate alkoholį, sergate sunkia infekcine liga, jei vartojate antikoaguliantų ir reikia ilgai kasdien vartoti vaistų nuo skausmo, jei vartojate metoklopramido, domperidono, cholestiramino. Negalima viršyti nurodytos dozės. Jei simptomai išlieka, reikia pasitarti su gydytoju. Visada vartokite mažiausią veiksmingą dozę, reikalingą palengvinti simptomams, trumpiausiu laikotarpiu. Nevartoti ilgiau kaip 3 dienas be gydytojo leidimo.*Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-17.

TIK „CAMELIA“

nuo **2,89 €**

Nosies užgulimui mažinti
EXNOS® 0,5 mg/ml
nosies lašai, 10 ml **2,89 €**
nosies purškalas, 15 ml **3,99 €**
MENTHOL nosies purškalas, 10 ml **4,59 €**
CHAMOMILE nosies purškalas, 10 ml **4,59 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, tirpalai
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml nosies purškalo arba lašų (tirpalo) yra 0,5 mg oksimetazolino hidrochlorido. Indikacijos: simptominis nosies gleivinės paburkimo, susijusio su šienlige, įprastu peršalimu arba sinusitu, mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas suaugusiesiems: „EXNOS“ kas 8-12 valandų (2-3 kartus per dieną) į kiekvieną nosies šnervę įpurkšti po 1-2 išpurškimus arba įlašinti po 1-2 nosies lašus; „EXNOS MENTHOL“ ir „EXNOS CHAMOMILE“ kas 12 valandų į kiekvieną nosies šnervę įpurkšti po 1-2 išpurškimus. 6 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams: „EXNOS“ kas 8-12 valandų (2-3 kartus per dieną) į kiekvieną nosies šnervę įpurkšti po 1 išpurškimą arba įlašinti po 1 nosies lašą; „EXNOS MENTHOL“ ir „EXNOS CHAMOMILE“ kas 12 valandų į kiekvieną nosies šnervę įpurkšti po 1-2 išpurškimus. Kontraindikacijos: jaunesniems negu 6 metų vaikams; padidėjes jautrumas veikliajai arba kitai medžiagai; nosies gleivinės uždegimas; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas dabar arba pastarąsias 2 savaites; uždaro kampo glaukoma; atlikta nosies operacija atveriant smegenų dangalą; nustatyta ūminė išeminė širdies liga arba krūtinės angina; sausasis rinitas. Specialūs įspėjimai: pasitarti su gydytoju sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, cukriniu diabetu, skydliaukės ligomis, feochromocitoma, prostatos hipertrofija, vartojant kraujo spaudimą didinančius arba kitus gleivinės paburkimą mažinančius vaistus. Negalima vartoti be pertraukos ilgiau kaip 7 paras.* Reklamos teksto parengimo data: 2024-02-15.
NESLOGUOK – LENGVAI KVĖPUOK!

23,99 €

Kelio sąnario osteoartritui
PIASCLEDINE® 300 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 30 kietųjų kapsulių
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje kapsulėje yra 300 mg neesterifikuoto avokadų ir sojų aliejaus. Indikacijos: papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz., skausmui ir apsunkintam judėjimui, lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Vieną kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistą gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; alergija žemės riešutams arba sojai. Specialūs įspėjimai: vaistas skirtas tik suaugusiesiems. Atsiradus bet kokių kepenų ar tulžies organų sutrikimo požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas (gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas/paraudimas, veido patinimas ir (arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėminių kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas), gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Jeigu esate gydomas antikoaguliantais, pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui prieš pradėdami vartoti vaistą. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į soją preparatus.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-19.
„PIASCLEDINE“ MAŽINA SKAUSMĄ IR PALENGVINA JUDĖJIMĄ!

5,75 €

Peršalimo ir gripo simptomams lengvinti
GRIPEX® THERMAL
1000 /100 /12,2 mg
milteliai geriamajam tirpalui



Nereceptinis vaistinis preparatas, 8 paketėliai
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg“ yra 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg feniléfrino hidrochlorido. Indikacijos: palengvina peršalimo ir gripo simptomus (pvz., karščiavimą, šaltkrėtį, galvos, gerklės, raumenų, kaulų bei sąnarių skausmą ir bendrą negalavimą), taip pat slogos simptomus. Vartojimo būdas ir dozavimas: paketėlio turinį ištirpdyti stiklinėje karšto vandens. Vartoti per burną. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams – po 1 paketėlį kas 4–6 valandas (ne daugiau kaip 4 paketėlius „GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg“ per parą). Nepasitarę su gydytoju, „GRIPEX THERMAL“ nevartokite ilgiau nei 7 dienas. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu: yra alergija veikliosioms medžiagoms, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai arba vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminų; sergate širdies ligomis, padidėjusiu kraujospūdžiu; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkiu kepenų ar inkstų nepakankamumu; tirotoksikoze (skydliaukės liga); šlapimo užsilaikymu arba feochromocitoma (antinkščių navikas); vartojate zidovudino, MAO inhibitorių; esate nėščia arba žindote kūdikį. Negalima vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: nevartokite didesnės dozės, nei rekomenduojama. Pasakykite gydytojui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi, nuolat vartojate alkoholį, kad vaisto dozė būtų pakoreguota. Vyresnio amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija (išvešėjimu), Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai suketlas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusio kraujospūdžio liga, cukriniu diabetu.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-09-26.
„GRIPEX THERMAL“. VEIKIU!

nuo **3,24 €**

Trombozės profilaktikai
HJERTEMAGNYL®
150 mg, 30 tablečių **3,24 €**
150 mg, 90 tablečių **5,99 €**
75 mg, 100 tablečių **4,19 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, plėvele dengtos tabletės
Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg vieną kartą per parą. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjes jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; negalima vartoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai: atsargiai vartoti, jei pacientas serga astma, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai, sutrikusiai kepenų ar inkstų veiklai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos. Senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-04-07.

-50% **4,42 €** 8,85 €

COREGA EXTRA STRONG FLAVOURLESS
dantų protezų fiksuojamasis kremas, be skonio



Burnos higienos priemonė, 40 g
„COREGA“ - patikima pagalba jūsų protezams ir burnos sveikatai. Mūsų produktai padeda protezus išlaikyti tvirtai vietoje, sumažinti maisto likučių patekimą po jais ir suteikia gaivumo pojūtį.
MĖGAUKITĖS PASITIKĖJIMU IR KOMFORTU – NES KIEKVIENA ŠYPSENA YRA SVARBI.

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

pasiūlymai

CAMELIA VAISTINĖ
Mažų kainų vaistinė

TIK „CAMELIA“

1+1 nuo **3,12 €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Imunitetui, kaulams
VIVAVIT VITAMINAS D3



Maisto papildai, 60 kapsulių, purškalas, 20 ml, lašai, 10 ml
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kalcio koncentraciją kraujyje, kaulų ir dantų būklę, raumenų funkciją bei kalcio ir fosforo absorbciją ir įsisavinimą. Sudėtyje nenaudojami dažikliai, saldikliai ar kvapiosios medžiagos. „VIVAVIT VITAMINAS D3 400 TV“ su lašintuvu tinka vaikams nuo 1 metų, „VIVAVIT VITAMINAS D3 1000 TV“ – vaikams nuo 1 mėnesio. „VIVAVIT VITAMINAS D3 1000 TV SPRAY“ – puikus sprendimas vitamino D naudojimui be šaukštelio. 20 ml tirpalo atitinka net 111 vitamino D3 dozių.
VITAMINAS D3 VISAI ŠEIMAI PATIKS!


-40% nuo **7,42 €**



Drėkinamieji akių lašai
STARAZOLIN®
sausoms ir sudirgusioms akims
BLUELIGHT PROTECT
HYDROBALANCE PPH

Medicinos priemonės, 10 ml, 2 x 5 ml
Drėkinamojo, raminamojo ir apsauginio poveikio akių lašai. „STARAZOLIN SAUSOMS IR SUDIRGUSIOMS AKIMS“ (be konservantų) – akių lašai, skirti padėti sumažinti simptomus, esant lengvam ar vidutinio sunkumo sausų akių sindromui ir (arba) sudirgintam akies paviršiui. Jie greitai palengvina nemalonius pojūčius, tokius kaip sausumas, smėlio pojūtis, niežėjimas, ašarojimas ar akių nuovargis, ypač atsirandantys nuo darbo kompiuteriu, vėjo, saulės ar kontaktinių lęšių nešiojimo. „STARAZOLIN HYDROBALANCE“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą; „STARAZOLIN BLUELIGHT PROTECT“ (be konservantų) drėkina ir saugo akis nuo UV ir mėlynos ekranų šviesos. Tinka daug laiko praleidžiant prie ekranų arba lauke.
Akių lašus gali vartoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius.

-50% **5,09 €** ~~10,19 €~~



Nervų sistemai, ramiam miegui
SALDUS MIEGAS

Maisto papildas, 15 kapsulių
„SALDUS MIEGAS“ – vienas iš populiariausių maisto papildų greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui su fitomelatoninu. Fitomelatoninas – augalinis melatoninas – padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti). Vaistinių ramunių žiedų ekstraktas padeda atsipalaiduoti, palaikyti normalią miego kokybę ir natūralią organizmo apsaugą bei imuninę sistemą. Tik 1 kapsulė prieš miegą!
GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS!

-50% **15,69€** ~~31,39 €~~



Plaukams
HAIR VOLUME™

Maisto papildas, 30 tablečių
Netenkina plaukų būklė? Jie atrodo ploni ir nušiurę? „HAIR VOLUME“ maisto papildai gali būti tai, ko reikia, norint turėti pastebimai storesnius, vešlesnius ir žvilgančius plaukus! Sudėtyje yra biotino, cinko, taip pat specialaus „Annurca“ veislės obuolių ekstrakto, kuriame randama biologiškai aktyvios medžiagos procianidino B-2. Cinkas ir biotinas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
PASTEBIMAI STORESNIEMS, VEŠLESNIEMS IR ŽVILGANTIEMS PLAUKAMS!

1+1 nuo **19,89 €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



Akims
OCUVAL®

Maisto papildai, 30 kapsulių, 30 tablečių
„OCUVAL HYDRO MAX“ – rinkitės pavargusių, jautrių, daug dirbančių akių drėgmės balansui palaikyti. „OCUVAL“ – sveikam regėjimui palaikyti akims naudingų medžiagų kompleksas su liuteinu, dumblių ekstraktu ir beta karotenu. Kai reikia stipresnės pagalbos akims – „OCUVAL STRONG PLUS“ – su bene didžiausiu kiekiu liuteino – net 40 mg vienoje kapsulėje, didelės koncentracijos vitaminais ir augaliniais ekstraktais.
„OCUVAL“ – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA.

1+1 nuo **14,15 €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



B COMPLEX
MEMORIL FORTE

Maisto papildai, 40 kapsulių, 30 kapsulių
„B COMPLEX“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis.
„MEMORIL FORTE“ – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamirštantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

1+1 nuo **12,89 €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €



HEPASAN® FORTE
HEPASAN® INTENSE

Maisto papildai, 30 kapsulių, 60 kapsulių
„HEPASAN FORTE“ sudėtyje yra cholino ir augalinių ekstraktų (tikrojo margainio sėklų, kiaulpienių šaknų, artišokų). Cholinas padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apykaitą bei normalią kepenų funkciją.
„HEPASAN INTENSE“ sudėtyje esantis tikrųjų margainių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. Foliatai ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą.
TAIKLUS PASIRINKIMAS JŪSŲ KEPENIMS!



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

CAMELIA VAISTINĖ
Mažų kainų vaistinė

YPATINGI
kosmetikos pasiūlymai

-50% **4,19 €** 8,39 €

BIODERMA
ATODERM
MAINS & ONGLES
maitinamasis rankų kremas



Kosmetika, 50 ml
„ATODERM MAINS & ONGLES“ intensyviai maitina, drėkina ir minkština sausą ir labai sausą rankų odą. Suteikia odai komforto pojūtį visai dienai. Greitai įsigeria. Neriebus, nepalieka lipnumo pojūčio.

-40% **12,77€** 21,29 €

BIODERMA
ATODERM
INTENSIVE BAUME
kūno kremas



Kosmetika, 200 ml
Kūno kremas „BIODERMA ATODERM INTENSIVE BAUME“ – raminantis emolientas sudirgusiai, atopiškai odai. Be pridėtinių kvapiųjų medžiagų.

1+1 **13,29 €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

EAU THERMALE AVENÈ
CICALFATE+
atkuriamasis apsauginis kremas sudirgusiai odai



Kosmetika, 40 ml
Atkuriamasis, apsauginis kremas, skirtas jautriai, sudirgusiai ir pažeistai odai. Priemonė padeda nuraminti odos diskomfortą, palaikyti natūralų odos atkūrimo procesą ir apsaugoti sudirgusią odą nuo išorinio poveikio. Kremas tinka visai šeimai – kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems.

1+1 **16,95 €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

URIAGE
rutulinis dezodorantas



Kosmetika, 50 ml
„URIAGE“ rutulinis dezodorantas padeda saugoti nuo prakaito kvapo, nedirgina odos. Tepkite tik ant švarios odos. Tinka jautriai odai.

1+1 **11,45 €**

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

URIAGE
lūpų pieštukas



Kosmetika, 4 g
Lūpų pieštukai „URIAGE“ skirti sausai, pažeistai, suskilinėjusiai lūpų odai prižiūrėti. Drėkina, minkština, padeda palaikyti normalią lūpų odos būklę.
GRAŽIOS LŪPOS – GRAŽI ŠYPSENA!

1+1 nuo **48,89€**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

EUCERIN®
HYALURON-FILLER + ELASTICITY
linija brandžiai veido odai



Kosmetika, 50 ml
„EUCERIN HYALURON-FILLER + ELASTICITY“ – specialiai sukurta brandžios veido odos poreikiams. Formulės su „Thiamidol“, kolageno-elastino kompleksu ir hialurono rūgštimi. Malonios, greitai susigeriančios tekstūros.

1+1 nuo **20,35 €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

BABE
HEALTHY AGING+
veido kremas **32,95 €**
FACIAL raminamasis micelių prausiklis **20,35 €**



Kosmetika, 50 ml, 240 ml
„BABĖ HEALTHY AGING+“ maitinamasis kremas brandžiai odai. Gali pasižymėti maitinamosiomis savybėmis, gali suteikti elastingumo, skaistinti ir palaikyti odos barjerinę funkciją. Tinka visų tipų odai, įskaitant jautrią. „BABĖ FACIAL“ micelinis veido prausiklis, skirtas visų tipų odai, įskaitant jautrią. Priemonė valo odą jos nedirgindama. Tinka po dermatologinių, kosmetologinių ir medicininių procedūrų, kai oda itin jautri ir sudirgusi.
JAUNATVIŠKAI ODAI BET KURIAME AMŽIAUS TARPSNYJE!

1+1 nuo **6,39 €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

BIOCELL®
ANTI-AGING FACE MASK **6,99 €**
2 in 1 RETINOL FACE MASK AND VITAMIN C SERUM **6,89 €**
REGENERATING FACE MASK **6,39 €**



Kosmetika, kosmetinės veido kaukės, 1 vnt.
„BIOCELL“ veido kaukių sudėtyje yra aktyvių kosmetikos komponentų. Veido kaukės gali padėti drėkinti, pasižymi regeneruojamuoju, stangrinamuoju poveikiu, gali mažinti raukšlių matomumą.
„BIOCELL“ – TOBULA ESI TU.



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

CAMELIA VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė



Mažos kainos Senjorams

jokių dvejonių!

Maisto papildams -30%

Vaistams iki -20%

Kitoms prekėms iki -25%

Nuolaidos visą dieną

Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių „Camelia“ darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30%, vaistams iki -20%, kitoms prekėms iki -25%) taikomos perkant su „Mažų kainų“ kortele, pažymėta „Camelia Senjoro“ lipduku. Nuolaidos taikymo laikotarpis UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos sprendimu gali būti pakeistas. Akcija taikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui, kurį galite rasti vaistinėse. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Nuolaidos netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos prekėms, perkant su kompensuojamuoju receptu. Daugiau informacijos – vaistinėse „Camelia“.

1+1 Pirkite 1, gaukite 2

TIK „CAMELIA“

1+1 2,99 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

MEŠKIS
ledinukai ant pagaliuko
su vitaminu C



Maisto produktas, 3 ledinukai
„MEŠKIS“ ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C, pasižymintys maloniu poveikiu gerklei.
MEŠKIO PARAGAUK – ŠYPSENĄ PAGAUK!

TIK „CAMELIA“

1+1 9,89 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

Nervų sistemai, imunitetui ir energijos palaikymui

VIVAVIT B GRUPĖS VITAMINAI



Maisto papildas, 40 kapsulių
Vitaminai B12, B6 ir folio rūgštis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Niacinas, vitaminai B1, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei normalią nervų sistemos veiklą. Biotinas, pantoteno rūgštis, niacinas, vitaminai B1, B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
SUBALANSUOTAI ENERGINGAI DIENAI IR RAMIAM VAKARUI.

1+1 nuo 23,89€

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

EUCERIN® UREA REPAIR



Kosmetika, 50 ml, 400 ml
„EUCERIN UREAREPAIR“ drėkinamasis kūno losjonas su 10% šlapalo – tai drėkinamoji priemonė labai sausai odai su trigubu drėkinamuoju kompleksu: šlapalu, keramidais ir natūraliais drėkinamaisiais faktoriais. Greitai įsigeria, nepalikdamas lipnumo pojūčio ant odos. „EUCERIN UREAREPAIR“ veido kremas su 5% šlapalo – dieninis veido kremas kasdienei sausos odos priežiūrai. Greitai įsigeria, galima naudoti po makiažu ar nusiskutus.

1+1 nuo 3,69 €**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

TENA DISCREET moters higienos priemonės



Medicinos priemonės bei higienos prekės
Moteriški įklotai ir paketai „TENA“ suteikia trejopą apsaugą nuo pratekėjimo, nemalonaus kvapo ir drėgmės. Gaminiai sukurti specialiai šlapimui sugerti, todėl daug efektyviau sugeria skystį nei tirštoms išskyroms skirti menstruaciniai paketai. Minkšti, laidūs orui, patikrinti dermatologų, anatomiškai pritaikyti ir patogūs naudoti. Iš gausaus gaminių asortimento galima išsirinkti tinkamiausią sprendimą ir jaustis užtikrintai kasdien.
NEPRIEKAIŠTINGAI HIGIENAI.
**Akcija taikoma tik pažymėtoms prekėms.

1+1 nuo 14,19€

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

LOTAMILE® ovulės



Medicinos priemonės, 5 ovulės
„LOTAMILE“ makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą. „LOTAMILE HIALURONIC“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą. „LOTAMILE BORIC“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo pojūtį.
OVULĖS NETEPA, NEIŠBĖGA, ILGIAU VEIKIA!

MAISTO PAPILDAI

1+1 nuo 6,85 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

Gerøs savijautøs meistrai iš Danijøs

LIVOL®
KVALITET FRA DANMARK, SIDEN 1959





Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

CAMELIA VAISTINĖ

MAISTO PAPILDAMS ŠIRDŽIAI

iki -40%













Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 11 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

TIK „CAMELIA“

-50% **1 94 €** 3 89 €

Raumenims, energijai, nervų sistemai

VIVAVIT MAGNIS + B6



Maisto papildas, 20 tirpiųjų tablečių
Maisto papildas skirtas papildyti organizmą magniu ir vitaminu B6. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą bei nervų sistemos veiklą, psichologinę ir raumenų funkciją.

TIK „CAMELIA“

-50% **6 76 €** 13 53 €

Raumenims, nervų sistemai

VIVAVIT MAGNIS
375 mg



Maisto papildas, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, apelsinų skonio, 30 pakelių
Maisto papildas skirtas papildyti organizmą magniu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą bei nervų sistemos veiklą, psichologinę ir raumenų funkciją.
MAGNIO JĖGA – TAVO STIPRYBĖ!

2 51 €

GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS



Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml
Veikliojoi medžiaga, stiprumas: gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml / ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos ilgalaikiu vartojimu, skirtas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija eršketinių šeimos augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 53 % (V/V) etanolio.* Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-21.
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI.

-40% nuo **9 83 €**

Širdžiai, kraujotakai, cholesterolio ir gliukozės kontrolei

NATASPIN®





Specialios medicininės paskirties maisto produktas, 30 kapsulių
Esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarymo rizikai, rinkitės „NatAspin H“ su natokinaze ir hidroksitirozoliu iš alyvuogių.

Maisto papildai, 30 kapsulių
Kai širdžiai reikia stiprybės ir apsaugos, išbandykite „NATAPSIN CARDIO PROTECT“ su dideliu kiekiu kofermento Q10 ir bioaktyviais polifenoliais. Kai cukrus ima viršų, išbandykite „NATASPIN GLUCOSE“: angliavandenių apykaitai, gliukozės balansui, ląstelių apsaugai.

-40% nuo **11 22 €**

Širdžiai ir kraujotakai

VENOLEGS 750:75 ATLANT ŠIRDIS COR4 COMPLEX



Maisto papildai, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 28 paketėliai
„VENOLegs 750:75“ – didelio kiekio flavonoidų (750 mg diosmino ir 75 mg hesperidino), mineralų, vitaminų, kolageno ir 4 augalų ekstraktų kompleksas pavargusioms kojoms, kojų venoms stiprinti, hemorojui ir normaliai venų mikrocirkuliacijai. „ATLANT ŠIRDIS“ – kompleksas Jūsų širdžiai su didžiausiu polifenolių (260 mg resveratrolio ir 13 mg likopeno) kiekiu**, kofermentu Q10, mineralais K, Mg, Fe, vitaminu B1, gudobelių, ciberžolių, vaistinių valerijonų ir česnakų ekstraktais. „COR4 Complex“ – visapusiška parama širdžiai ir kraujotakos sistemai. Sudėtyje esantys mineralai, vitaminai ir augalinės kilmės medžiagos padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį, cholesterolio koncentraciją kraujyje.
**Nustatyta pagal UAB "Softdent" 2024 m. duomenis.
KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA!

-10% **26 05€** 28 95 €

Kraujo sudėčiai

RICHTER FERROHEMO®



Maisto papildas, 40 tablečių
„RICHTER FERROHEMO“ yra švelnus geležies turintis maisto papildas, skirtas vartoti tuomet, kai su įprastu maistu gaunama nepakankamai geležies ir reikia papildyti jos atsargas organizme. „RICHTER FERROHEMO“ sudėtyje yra natūralios kilmės hemo-geležies (galvijų hemoglobinas) ir geležies (II) sulfato. Hemo-geležies pasisavinimas siekia 40 proc. Skrandžio rūgštingumas, maistas ir gėrimai neturi įtakos hemo-geležies įsisavinimui. Galima vartoti suaugusiesiems nuo 18 m.
GELEŽIS SU HEMOGLOBINU.

-50% nuo **6 19 €**

Raumenims, sąnariams ir kaulams

BIOCa+K+Mg+Zn su vit. D3
BIOMAGNESIUM FORTE 500 mg
BIOMAGNIS 300 mg + BIOKALIS 300 mg
BIOCALCIUM FORTE 600 mg



Maisto papildai, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 28 paketėliai, 20 paketėlių, 30 paketėlių
„BioCa+K+Mg+Zn su vit. D3“[1], „BioMagnesium Forte 500 mg„[1], „BioMagnis 300 mg + BioKalis 300 mg“[1] ir „BioCalcium Forte 600 mg“ – tai „BIOFARMACIJA“ klasikinės linijos mineralų papildai kasdieniam organizmo balansui. Formulėse naudojami natūralios kilmės Negyvosios jūros mineralai, o miltelių forma užtikrina gerą pasisavinimą ir švelnų poveikį be nereikalingų priedų. Papildai skirti raumenų veiklai, elektrolitų pusiausvyrai, nervų sistemos funkcijai ir nuovargio mažinimui. Magnis padeda mažinti pavargimo pojūtį, kalcis – palaikyti kaulų būklę, kalis – kraujospūdį ir raumenų funkciją, cinkas – imunitetą, o vitaminas D3 – kalcio įsisavinimą ir kaulų tvirtumą.
[1]Nr. 1 Pagal UAB „Softdent“ duomenis.
AUKŠTOS KOKYBĖS NEGYVOSIOS JŪROS MINERALAI, PAPRASTOS FORMULĖS IR JOKIŲ NEREIKALINGŲ PRIEDŲ.

-30%* nuo **14 59 €**


*perkant bent 2 prekes

Kraujodarai

FEROGLOBIN®
FEROGLOBIN® PLUS



Maisto papildai, 30 kapsulių, skystis, 200 ml
„FEROGLOBIN“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „FEROGLOBIN“ puikiai papildo mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, vaikystėje ir paauglystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.
„FEROGLOBIN PLUS“ ne tik papildo geležies atsargas, bet ir padeda mažinti nuovargį (vit. B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).
Vartojimas: gerti 1 kapsulę kasdien valgio metu arba iš karto po jo, užgeriant pilna stikline vandens ar kitokio gaiviojo gėrimo.
„FEROGLOBIN“ arba „FEROGLOBIN PLUS“ suaugusiems žmonėms – 1 arbatinis šaukštelis 2 kartus per parą.
KRAUJODARAI IR ENERGIJAI.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Nervų sistemai

TIK „CAMELIA“

-40% 8,69 € 14,49 €

Raumenims, nervų sistemai

VIVAVIT KALIS MAGNIS

320 mg + 375 mg



Maisto papildas, milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių

Šie maisto papildai skirti papildyti organizmą magniu ir kaliu. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją. Taip pat jis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei kaulų ir dantų būklę. Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, normalų kraujospūdį.

TIK „CAMELIA“

-50% 4,79 € 9,58 €

Miegui

VIVAVIT MELATONIN

1 mg



Maisto papildas, 30 kapsulių


Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

UŽMIK GREIČIAU – MIEGOK SALDŽIAU!

iki -30% nuo 22,01€

Smegenims

NEUROZAN® ORIGINAL
NEUROZAN® PLUS



Maisto papildai, 30 tablečių, 28 tabletės ir 28 kapsulės

„NEUROZAN“ – smegenų maistas protinei veiklai ir psichologinei būklei. Tabletė visiems, kurie mokosi, dirba intensyvų protinį darbą ar jaučia emocinį išsekimą.

„NEUROZAN PLUS“ – tablečių ir kapsulių pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis.

PAMAITINK SAVO PROTĄ!

nuo 6,69 €

Lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti

LILANDOR 80 mg

14 minkštųjų kapsulių 6,69 €

28 minkštosios kapsulės 11,51 €



Tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 80 mg levandų aliejaus (*Lavandula angustifolia Miller*, eterinis aliejus). Indikacijos: „LILANDOR“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta pakuotės lapelyje, arba kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams – viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-09. LT-LIL-10-2025_MFLOW, 2025/12.

ATGAUK RAMYBĘ IR RAMŲ MIEGĄ.

iki -30% nuo 11,82 €

Raumenims, nervų sistemai, energijai

MAGVIT®
PLUS
PLATINUM



Maisto papildai, 30 tablečių, 42 tabletės

„MAGVIT PLATINUM“ – greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Tik 1 tabletė per parą. „MAGVIT PLUS“ – specialios ilgalaikio veikimo „Depo“ formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą. Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. B12 vitaminas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

„MAGVIT“ – JŪSŲ MAGNIO ŠALTINIS!

-40%** nuo 11,97€

Emocinei pusiausvyrai

ASHWA MAGNUS REX300



Maisto papildai, milteliai, 28 pakeliai

Ašvagandų KSM 66® šaknų ekstraktas – emocinei pusiausvyrai. „BIOFARMACIJA ASHWA PRO“ 400/600 linija – aukštos kokybės grynas ašvagandų KSM 66® šaknų ekstraktas (5 % vitanolidų), papildytas inulinu iš cikorijų šaknų. „ASHWA ADAXON“ papildytas liūto karčiais ir rausvųjų rodiolių ekstraktu. Naudinga vartoti, jei siekiate geresnio protinio darbingumo, norite išlaikyti emocinę pusiausvyrą, rūpinatės nervų sistemos veikla, patiriate stresą, ar Jūsų mityboje trūksta skaidulų. „MAGNUS REX300 + ASHWAGANDHA300“ – magnio bisglicinatas, kurio sudėtis papildyta ašvagandų šaknų ekstraktu (KSM-66). „BIOFARMACIJA“ ašvagandų šaknų ekstraktas pasižymi aukšta – iki 5% – vitanolidų koncentracija, adaptogeninėmis savybėmis bei padeda organizmui prisitaikyti prie streso, gerinti miego kokybę ir energijos apykaitą.

KURIAME TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA.

**Prekių ieškokite didžiosiose vaistinėse.

-35% nuo 15,59€

Raumenims ir kaulams, miegui, širdies veiklai

MAGNESIUM DIASPORAL® PRO



Maisto papildai, granulės pakelyje, 30 pakelių, milteliai geriamajam tirpalui, 20 pakelių

„MAGNESIUM DIASPORAL PRO“ – raumenims ir kaulams, miegui, širdies veiklai ir kraujospūdžiui.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

iki -40%** nuo 12,95€

Širdžiai, imunitetui

MÖLLER'S

skysti žuvų taukai,
omega-3 kapsulės,
įvairių skonių gelinės žuvytės,
FOR TEENS tabletės



Maisto papildai

„MÖLLER'S" – jau 170 metų puoselėjami žuvų taukai visai šeimai. Tyri, natūralūs ir gerai išvalyti „MÖLLER'S" žuvų taukai puikiai tinka vartoti kasdien visą gyvenimą. Viename arbatiniame šaukštelyje – daugiau nei gramas natūralių omega-3 riebalų rūgščių bei natūralių vitaminų A ir D. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebalų rūgštys padeda palaikyti normalią širdies veiklą (teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR).

OMEGA-3 EKSPERTAI JAU DAUGIAU KAIP 170 METŲ!

**Akcija taikoma tik pažymėtoms prekėms.

-50%** nuo 2,22 €

BIOFARMACIJA

maisto papildai imunitetui



Maisto papildai

„Biofarmacija" – jau 15 metų tarp Lietuvos maisto papildų rinkos lyderių. Asortimente – platus pasirinkimas: nuo būtiniausių mineralų citrato ir bisglicinato forma iki pažangių kompleksų imunitetui, energijai, nervų sistemai, žarnynui ir kasdieniam organizmo funkcijų palaikymui. Tarp jų ir miltelių formos maisto papildai su cinku, vitaminu C, D3, selenu ir augaliniais ekstraktais. Sudėtyje tik aukštos kokybės Negyvosios jūros mineralai, paprastos formulės ir jokių nereikalingų priedų geresniam įsisavinimui bei veiksmingumui.

„BIOFARMACIJA" – 15 METŲ LIETUVOJE LYDERIAUJANTIS GAMINTOJAS, KURIANTIS TIK TAI, KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA.

**Akcija taikoma tik pažymėtoms prekėms.

-20% 13,35€ ~~16,69 €~~

Imunitetui

ALKYMER®



Maisto papildas, 60 minkštųjų kapsulių

„ALKYMER" – maisto papildas, kurio sudėtyje yra alkilgliceroliai, gaunami iš ryklių kepenų aliejaus. Alkilgliceroliai – tai natūralūs lipidai. Kiekvienoje „ALKYMER" kapsulėje (410 mg) yra 250 mg ryklių kepenų aliejaus, kuriame alkilglicerolių kiekis sudaro ne mažiau 20 % (50 mg). Pagaminta Švedijoje.

-40% nuo 2,96 €

Gerklei ir imuninei sistemai

PROPODEZAS®



Maisto papildai, 50 tablečių

„PROPODEZAS" – tai propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais, naudingas gerklei ir imunitetui. Keturi skirtingi skoniai. Stipresnė versija – „PROPODEZAS FORTE" su šeivamedžių ekstraktu ir bičių pieneliu. Imbierai, šeivamedžio uogų ekstraktas, vitaminas C padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų.

BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI, IR IMUNITETUI!

-50% nuo 4,24 €

Imunitetui, kaulams ir dantims

DETRICAL

VITAMINAS D 2000 IU
VITAMINAS D 4000 IU
VITAMINAS D 6000 IU



Maisto papildai, 60 plėvele dengtų tablečių

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų funkciją ir dantų būklę.

SUSTIPRINK SAVO IMUNITETĄ!

4,45 €

Vitamino C šaltinis

CEVIKAP®

askorbo rūgštis 100 mg/ml



Nereceptinis vaistinis preparatas, geriamieji lašai, 30 ml

Veikliojo medžiaga, stiprumas: askorbo rūgštis, 100 mg/ml. Indikacijos: padidėjusio vitamino C poreikio tenkinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams (jaunesniems kaip 1 metų vaikams) per parą reikia gerti 5 – 8 lašus (maždaug 25 – 40 mg). Vyresniems kaip 1 metų, bet jaunesniems negu 11 metų vaikams per parą reikia gerti 10 lašų (maždaug 50 mg). 11 – 17 metų paaugliams per parą reikia gerti 15 – 20 lašų (maždaug 75 – 100 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „CEVIKAP" negalima maišyti su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra geležies arba vario. Jei vartojama rekomenduojama askorbo rūgšties dozė, specialių atsargumo priemonių laikytis nebūtina. Nevartoti didelės askorbo rūgšties dozės pacientams, kuriems yra inkstų akmenligė, hiperoksalaturija, polinkis į inkstų akmenų atsiradimą; žmonėms, kurių organizme yra geležies perteklius ir pacientams, apsinuodijusiems geležies vaistiniais preparatais. Informacija vartotojui yra sutrumpinta.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-30.

„CEVIKAP" – KAI REIKIA VITAMINO C.



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų" kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Imunitetui

TIK „CAMELIA“

-40% 5,39 € 8,99 €

Kvėpavimo takams

VIVAVIT PUŠŲ PUMPURŲ

sirupas



Maisto papildas, 120 ml

„VIVAVIT PUŠŲ PUMPURŲ sirupas“ sudėties pagrindas – pušų pumpurai ir paprastųjų čiobrelių žolė. Liaudies medicinoje jie nuo seno naudojami sergant peršalimo ligomis, esant kosuliui, kvėpavimo takų uždegimui ar nusilpus organizmo imunitetui. Čiobreliai ir pušų pumpurai gali padėti palaikyti normalias kvėpavimo takų funkcijas ir normalią kvėpavimo takų sekreto gamybą. Čiobreliai tai pat padeda palaikyti normalias imuniteto funkcijas.

TIK „CAMELIA“

-40% 2,33 € 3,89 €

Imunitetui

VIVAVIT VITAMINAS C

1000 mg



Maisto papildas, 20 tirpiųjų tablečių

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Jis padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, odos, dantų ir dantenų funkcijai, susidarymą. Taip pat vitaminas C svarbus normaliai energijos apykaitai, normaliai nervų sistemos veiklai bei psichologinei funkcijai palaikyti. Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, taip pat padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją.

TIK „CAMELIA“

-50% 7,49 € 14,99 €

Imunitetui

VIVAVIT RESVERATROL PLIUS ACE



Maisto papildas, 30 kapsulių

Vienoje kapsulėje yra 200 mg resveratrolio. Vitaminai C ir E bei cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai A ir C bei cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

ANTIOKSIDANTŲ GALIA JŪSŲ LĄSTELIŲ APSAUGAI IR IMUNITETUI!

TIK „CAMELIA“

-40% 6,95 € 11,58 €

Raumenims, nervų sistemai

VIVAVIT MAGNIS PLIUS B6 + D3



Maisto papildas, 30 kapsulių

Magnis, vitaminas D ir B6 sinergiškai papildo vienas kito veikimą. Magnis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią kaulų būklę. Vitaminas B6 ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją. Vitaminai D ir B6 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

PASIRŪPINKITE APSAUGA NUO:

	ERKINIO ENCEFALITO	PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS	SEZONINIO GRIPO
Su SENJORO ar NEĮGALIŲJŲ kortele	26,99 €	69,00 €	14,99 €
Su MAŽŲ KAINŲ kortele	28,99 €	75,00 €	14,99 €
Reguliari skiepo kaina	29,99 €	79,00 €	18,99 €

REGISTRACIJA SKIEPAMS: **VAISTINĖSE**

Telefonu: **0 697 03000**

Internete: **skiepai.camelia.lt**

Nuskenavus **QR kodą**:

VILNIUJE:
Gedimino pr. 60
Savanorių pr. 1-200
Ozo g. 18-1001
Ožiarūčių g. 3, Avižienių k.
Pilaitės pr. 42
Ukmergės g. 221
Vikingų g. 3
Šiltnamių g. 21
Dangeručio g. 2
KAUNE:
Laisvės al. 55
V. Krėvės pr. 8A
Įgulos g. 1, Šakių k.
Šiaurės pr. 8D
Lyderystės g. 7, Biruliškių k.
P. Lukšio g. 60-5
KLAIPĖDOJE:
Šiaurės pr. 15-1
Šilutės pl. 40
Taikos pr. 64
Taikos pr. 101A-5
Pajūrio g. 5A
ŠIAULIUOSE:
Tilžės g. 109
PANEVĖŽYJE:
Respublikos g. 51-2
UTENOJE:
Kupiškio g. 52
KĖDAINIUOSE:
J. Basanavičiaus g. 91
TELŠIUOSE:
Gedimino g. 2
VISAGINE:
Veteranų g. 2-1
PLUNGĖJE:
J. Tumo-Vaižganto g. 90-1
JONIŠKYJE:
Miesto a. 5-43
JURBARKE:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 98
KUPIŠKYJE:
Gedimino g. 41
PRIENUOSE:
Vilniaus g. 1
ROKIŠKYJE:
Taikos g. 2A



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

8⁹⁹ €

Nuo skausmo

SPOTIFIT®

50 mg/g



Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 100 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename grame gelio yra 50 mg etofenamato. Indikacijos: lokalus silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, sukelto smulkiųjų ir vidutinio dydžio sąnarių bei aplink juos esančių minkštųjų audinių uždegiminių ligų ar traumos, malšinimas suaugusiesiems. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą plotą reikia tepti tris arba keturis kartus per parą 1,5 – 3 g (maždaug 5-10 cm) gelio. Vartoti ant odos. Švelniai įtrinti į odą, kol visiškai įsigers. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nėštumo laikotarpis. Jaunesni nei 18 m. vaikai. Egzema, atvira žaizda, opa ar odos pažeidimas vartojimo vietoje. Specialūs įspėjimai: negalima vartoti ant gleivinės ar akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais vaistiniais preparatais nuo uždegimo. Vengti tiesioginių saulės spindulių „SPOTIFIT“ vartojimo vietoje, kadangi yra fotoalergijos rizika. Ypač atsargiai reikia vartoti, jeigu yra kepenų ar inkstų sutrikimų. Jei atsiranda pirmųjų išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitokio padidėjusio jautrumo pasireiškimo požymių, vartojimą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nevartokite ilgiau nei 14 dienų be gydytojo paskyrimo.*Reklamos teksto parengimo data: 2023-03-16.

JUDĖK BE SKAUSMO!

TIK „CAMELIA“

-40% **7¹⁹ €** ~~11⁹⁹ €~~

Kaulams ir raumenims

VIVAVIT KALCIS MAGNIS CINKAS + VITAMINAS D



Maisto papildas, 60 kapsulių

Maisto papildas skirtas papildyti maisto racioną kalciu, magniu, cinku ir vitaminu D. Magnis ir cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Magnis padeda palaikyti normalią dantų būklę ir normalią raumenų funkciją. Cinkas padeda palaikyti normalią nagų būklę.

KAULAMS IR DANTIMS.

TIK „CAMELIA“

-50% nuo **5³⁶ €**

Kaulams, dantims ir raumenims

CALCIMED CALCIMED POWDER



Maisto papildai, 100 kramtomųjų tablečių, milteliai, 30 pakelių

„CALCIMED“ sudėtyje yra kalcis ir vitaminas D, kurie padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, reikalingi normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą bei normalią kalcio koncentraciją kraujyje. „CALCIMED Powder“ – uogų skonio maisto papildas su saldikliu iš stevijos, skirtas papildyti kasdienę mitybą kalciu, vitaminu D ir vitaminu K. Jo sudėtyje esantis vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę.

KŪNO TVIRTUMUI.

-40% nuo **17³⁹ €**

Sąnariams ir kaulams

ARTHROSTOP® PROENZI®



Maisto papildai, 14 dozių, 30 tablečių, 90 tablečių, 100 tablečių

„ARTHROSTOP PROENZI COLLAGEN SHOTS“ – unikali dviejų tipų kolageno, vitaminų ir mineralų kombinacija sąnariams. Net 11000 mg hidrolizuoto ir 20 mg nedenatūruoto antro tipo kolageno viename buteliuke! Juodųjų serbentų skonio.
„ARTHROSTOP PROENZI INTENSIVE“ – kompleksas sąnariams su gliukozaminu, chondroitinu, bosvelijų žievės ekstraktu ir II tipo kolagenu. Tik viena tabletė per dieną.
„ARTHROSTOP PROENZI PLUS“ – sąnariams su MSM, gliukozaminu ir bosvelijų žievės ekstraktu, kuris padeda palaikyti sąnarių lankstumą bei bendrą jų funkciją. 2603_SB_Proenzi_V01_LT

„ARTHROSTOP PROENZI“ MAISTO PAPILDAI SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, CHONDROITINU, KOLAGENU IR BOSVELIJOS EKSTRAKTU. JUDĖK LAISVAI!

nuo **8⁰² €**

OLFEN®

140 mg
2 vnt. **8⁰² €**
5 vnt. **12⁷⁴ €**
10 vnt. **20²⁸ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, vaistiniai pleistrai

Veikliųjų medžiaga, stiprumas: viename vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokalus skausmo, sukelto ūmaus sausgyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių panirimo (pvz., sporto traumos), malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Naudoti ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. „OLFEN“ pleistro jaunesniems kaip 15 metų pacientams naudoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitiems skausmą ir uždegimą slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba acetilsalicilo rūgščiai; astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, kurie pasireiškė pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU; esama skrandžio ar žarnų opa; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 3 dienas arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchų spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydomą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių soliariumo spindulių (1 dieną), kad nepasireikštų padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. Vaistinį preparatą atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praeityje buvo pepsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, kadangi yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Sudėtyje esantys propilenglikolis ir butilhidroksitoluenas gali sukelti lokalių vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-01-22. OLF-LT-00048.

TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAUSMU!

9⁰⁷ €

Nuo skausmo

VOLTAREN

EMULGEL 23,2 mg/g



Nereceptinis vaistinis preparatas, gelis, 50 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienam grame gelio yra 23,2 mg (2,32 %) diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: lokalus simptominis skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pvz., patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas (nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): lokalus skausmo ir uždegimo dėl sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti NVNU buvo sukėlę astmos priepuolį, angioneurozinę edemą, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą; paskutinis nėštumo trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai: jeigu geliu ilgą laiką tepamas didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis; galima tepti tik nepažeistą, sveiką odą; saugotis, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, nenuryti; jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti; negalima naudoti su oro neįsiduodančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais yra mažai tikėtina. Galimas šalutinis poveikis: dermatitas (įskaitant kontaktinį dermatitą), išbėrimas, eritema, egzema, niežulys. * Reklamos teksto parengimo data: 2025-03-01.

nuo **20⁴⁵ €**

Venoms

VIVITON 1000 mg

30 plėvele dengtų tablečių **20⁴⁵ €**
60 plėvele dengtų tablečių **35⁵¹ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliojі medžiaga, stiprumas: mikronizuotas diosminas, 1000 mg. Indikacijos: su lėtine apatinių galūnių venų liga susijusių simptomų, pavyzdžiui, tempimo ir sunkumo jutimams kojose, blauzdų edemos, skausmo ir mėšlungio naktį, palengvinimas; su ūmine hemorojaus liga susijusių simptomų, pavyzdžiui, skausmo, kraujavimo ir patinimo išangės srityje gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: lėtinė apatinių galūnių venų liga: 1 plėvele dengta tabletė per parą, kurią reikia išgerti ryte valgio metu (trumpiausia rekomenduojama gydymo trukmė – mažiausiai 4 – 5 savaitės); ūminė hemorojaus liga: po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą pirmąsias 4 dienas, po to – po 1 plėvele dengtą tabletę du kartus per parą kitas 3 dienas. Vėliau reikia vartoti palaikomąją dozę – po 1 plėvele dengtą tabletę per parą. Tabletes reikia išgerti valgio metu. Kontraindikacijos: jautrumas (alergija) diosminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: jeigu jūsų kepenų arba inkstų funkcija yra sutrikusi, prieš pradėdami vartoti „VIVITON“, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. Vaistas nėra veiksmingas mažinant kojų patinimą, pasireiškusį dėl širdies, inkstų ar kepenų ligos. Ūminės hemorojaus ligos gydymas šiuo vaistu nepakeičia specifinio kitų išangės sutrikimų gydymo.*Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-09. LT-VIV-2-2026_MFLOW

VISAPUSIŠKA PAGALBA JŪSŲ VENOMS.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

SĄNARIAMS, KAULAMS, ODAI, PLAUKAMS, NAGAMS

CAMELIA VAISTINĖ
Mažų kainų vaistinė

VITAL TITAN COMPLEX

aukštos kokybės derinys judėjimui ir grožiui

Galinga dienos dozė – 10 000 mg lengvai pasisavinamų kolageno peptidų viename paketėlyje

VYRAMS IR MOTERIMS

Gliukozamino ir hialurono rūgšties derinys – sąnarių struktūrinių komponentų papildymui

Liposominis vitaminas D3 – pažangi forma geresniam įsisavinimui

Vitaminų ir mineralų kompleksas – kaulų, raumenų, odos, plaukų ir nagų būklei palaikyti



1+1 45⁰⁰ €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

VITAL TITAN
Maisto papildas, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 30 paketėlių

Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų" kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

531 €

Nuo rėmens

PANTOPRAZOLE INGEN PHARMA 20 mg



Nereceptinis vaistinis preparatas, 14 skrandyje neirių tablečių

Veikliojі medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Indikacijos: trumpalaikis suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgštinio turinio regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). „PANTOPRAZOLE INGEN PHARMA“ 20 mg skrandyje neirios tabletės negalima kramtyti ar traiškyti, ją reikia nuryti visą, užsigeriant skysčiu, valandą prieš valgį. Nerekomenduojama vaisto vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes duomenų apie vaistinio preparato saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Senyviems pacientams bei pacientams, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba pakeistiems benzimidazolams. Specialūs įspėjimai: pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazių inhibitoriais, kurių absorbcija priklauso nuo rūgštaus intragastrinio pH, nerekomenduojama.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-02-18.

TIK „CAMELIA“

-50% **8**43 € ~~16~~86 €

Žarnynui ir grožiui

VITAL FIBER POWDER



Maisto papildas, milteliai, 220 g

„VITAL FIBER POWER“ – maisto papildas, skirtas papildyti mitybą skaidulomis, cinku ir vitaminu D3. Balkšvųjų gysločių sėklų luobelės gali padėti palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, normalią žarnyno funkciją ir normalų tuštinimąsi. Sudėtyje esantis cinkas padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę, maistinių makromedžiagų ir angliavandenių apykaitą bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

SVEIKATAI IR GROŽIUI!

710 €

Virškinimui

MEZYM®

20 000 V



Nereceptinis vaistinis preparatas, 20 skrandyje neirių tablečių

Veikliojі medžiaga, stiprumas: vienoje skrandyje neirioje „MEZYM 20000V“ tabletėje yra 160 mg – 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Indikacijos: „MEZYM“ vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Vartojimo būdas ir dozavimas: „MEZYM“ visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 1-2 plėvele dengtos „MEZYM 20000V“ tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nuryjamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas. Kontraindikacijos: „MEZYM“ vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti „MEZYM“. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia apsarstyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neįprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusiskundimų pobūdis, būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris jus apžiūrės, kad galėtų atmesti žarnų pažeidimo galimybę. „MEZYM“ sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-02-09. LT-MEZ-3-2025_MFLOW, 2025/12.

„MEZYM“ – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ!**

**Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų.

-25% nuo **19**87 €

Virškinimui

LEPICOL® LEPICOL® PLUS



Maisto papildai, 180 kapsulių, 180 gramų miltelių

„LEPICOL“ – unikalus balkšvųjų gysločių luobelių, pieno rūgšties bakterijų ir inulino derinys žarnynui. Švelnaus poveikio balkšvųjų gysločių luobelės ypač naudingos esant vidurių užkietėjimui. Sudėtyje yra 5 rūšių bakterijų kultūros (bifido bakterijos ir laktobacilos), kurios natūraliai yra sveiko žmogaus virškinimo sistemoje. „LEPICOL PLUS“ sudėtis papildyta augalinės kilmės medžiagomis iš imbierų šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolio sėklų normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.

GERA JAUSTIS LENGVAI!

nuo **7**63 €

Spazmams malšinti

NO-SPA® 40 mg

24 plėvele dengtos tabletės **8**09 €

24 tabletės **7**63 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje ir 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimui, meškinguško noro šlapintis slopinimui. Kaip pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms menesinėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą. Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletės. Kontraindikacijos: alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti „NO-SPA“ nerekomenduojama. Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-11. 2604_SB_No-spa_V01_LT

PILVO SKAUSMAS? GYDYKITE JĮ TINKAMAI SU „NO-SPA“.

po **4**20 €

Nuo rėmens ir padidėjusio rūgštingumo

RENNIE®

680 mg/80 mg ir ORANGE 680 mg/80 mg



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 24 kramtomosios tabletės

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra 680 mg kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. Indikacijos: „RENNIE“ veikliosios medžiagos – kalcio karbonatas ir sunkusis magnio subkarbonatas – neutralizuoja skrandžio rūgštį ir sumažina rūgštinės dispepsijos sukeliamus negalavimus: rėmenį, skrandžio pilnumo arba sunkumo jausmą, virškinimo sutrikimą, rūgštaus skysčio atpylimą į burnos ertmę, pilvo pūtimą, skrandžio skausmą. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams sučiulpti arba sukramtyti 1–2 kramtomąsias tabletes, praėjus 1 valandai po kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas. Negalima vartoti daugiau kaip 11 kramtomųjų tablečių per 24 valandas. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jeigu yra sunkus inkstų nepakankamumas arba inkstų akmenligė; jeigu yra padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs fosfatų kiekis kraujyje. Specialūs įspėjimai: vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. „RENNIE“ neštumo ir žindymo laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti vartoti ilgą laiką. Vaistas netur būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno ar jo produktais.* Informacija sutrumpinta. Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-02. CH-20260114-54.

nuo **7**39 €

Viduriavimui, pilvo skausmui

smecta®

milteliai geriamajai suspensijai


10 paketėlių **7**39 €

30 paketėlių **14**17 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliojі medžiaga, stiprumas: kiekvienane paketėlyje yra 3 g diosmektito. Indikacijos: vaikų nuo 2 metų ir suaugusiųjų ūminio viduriavimo kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais tirpalais bei suaugusiųjų lėtinio viduriavimo gydymui. Simptominiam suaugusiųjų skausmo, susijusio su funkciniais žarnyno sutrikimais, gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: ūminio viduriavimo gydymas: vaikams nuo 2 metų – 2 paketėliai per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje (pirmąsias 3 dienas) ši dozė gali būti du kartus didesnė. Suaugusiesiems – 3 paketėliai per parą. Ūminio viduriavimo pradžioje ši dozė gali būti du kartus didesnė. Ūminio viduriavimo epizodas paprastai trunka ne ilgiau kaip 7 dienas. Kitų ligų gydymas: suaugusiesiems – vidutiniškai 3 paketėliai per parą. Vartoti per burną. Paketėlio turinį reikia ištirpinti pusėje stiklinės vandens prieš pat vartojimą. Vaikams paketėlio turinį galima ištirpinti 50 ml vandens arba sumaišyti su pusiau skystu maistu (pvz., daržovių koše, sriuba, kompotu). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas diosmektitui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „SMECTA“ neskirtas vartoti küdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus. Gydant ūminį viduriavimą silpniems pacientams ir vaikams nuo 2 metų amžiaus, siekiant išvengti dehidratacijos, kartu būtina skirti geriamąsias rehidratuojančias druskas (GRD). Suaugusiesiems taip pat turi būti taikoma rehidratacija, jei ji reikalinga. GRD arba intraveninė rehidratacija turi būti skiriama atsižvelgiant į viduriavimo intensyvumą, paciento amžių ir klinikinę situaciją. Reikia apsvarstyti dėl tolimesnio „SMECTA“ vartojimo: jei po 3 ūminio viduriavimo dienų sutrikimas nepraeina; jei yra skausmas kartu su karščiavimu ir vėmimu. Reikia atsargiai skirti diosmektitą pacientams, kuriems praeityje yra buvę sunkių lėtinių vidurių užkietėjimo atvejų. Reikia vengti ilgalaikio „SMECTA“ vartojimo. „SMECTA“ sudėtyje yra gliukozės ir sacharozės, į tai būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg paros dozėje). Praneškite apie šalutinį poveikį registruotojo vietiniam atstovui Mayoly Baltics UAB, el. paštu: vigilance.BAL@mayoly.com. Teksto peržiūros data: 2025-11-13.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-10-12. SME-LT-2026-0030.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai neišnyksta ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

-50% 4,44 € 8,89 €

Kepenims

VIVAVIT LIVERTOP



Maisto papildas, 30 kapsulių

Maisto papildo „VIVAVIT LIVERTOP“ sudėtyje yra 160 mg silimarino iš tikrųjų margainių ekstrakto ir fosfolipidų. Fosfolipidai yra reikšminga ląstelių membranų ir tulžies sudedamoji dalis. Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, kuri svarbi virškinimui, medžiagų apykaitai ir detoksikacijai.

RŪPINKIS KEPENIMIS – JOS PASIRŪPINS TAVIMI!

-40% nuo 3,87 €

Imunitetui

LACTO SEVEN®



Maisto papildai, 20 tablečių, 30 tablečių, 30 kapsulių, 50 tablečių

„LACTO SEVEN“ sudėtyje yra septynios skirtingos pieno rūgšties bakterijų rūšys ir vitaminas D. Maisto papildai pagaminti Suomijoje, taikant aukščiausius kokybės standartus! Vartojimas: „LACTO SEVEN KIDS“ – vyresniems kaip 3 metų vaikams 1 tabletė per dieną; „LACTO SEVEN CHEW“, „LACTO SEVEN ORIGINAL“ – suaugusiems 1-2 tabletės per dieną, vyresniems kaip 3 metų vaikams 1 tabletė per dieną; „LACTO SEVEN STRONG“ – suaugusiems 1 kapsulė per dieną.

PAGAMINTA SUOMIJOJE!

nuo 6,92 €

MICROLAX®

625 mg/90mg/9 mg/ml
tiesiosios žarnos tirpalas
4 tūbelės, 5 ml 6,92 €
12 tūbelių, 5 ml 16,58 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tiesiosios žarnos tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsulfoacetato. Indikacijos: trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, reikalaujančių palengvinto išsituštinimo, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gydomąsias procedūras galinėje žarnyno dalyje. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai: „MICROLAX®“ vienos tūbelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 metų vaikai: „MICROLAX®“ vienos tūbelės turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, įkišus į ją pusę antgalio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „MICROLAX®“. Kad išvengtumėte sužeidimo, „MICROLAX®“ vartokite atsargiai, jeigu sergate hemorojumi. Vengti ilgalaikio vartojimo. Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz. kontaktinį dermatitą). Jeigu būklė negerėja, kreipkitės į gydytoją.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-10-10. LT-MCX-2025-241032

NUSPĖJAMAS IR EFEKTYVUS POVEIKIS PER 5-15 MINUČIŲ.

nuo 7,27 €

DUPHALAC® 667 mg/ml

200 ml 7,27 €
500 ml 12,82 €
1000 ml 19,88 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, geriamieji tirpalai

Veikliojo medžiaga, stiprumas: 1 ml geriamojo tirpalo yra 667 mg laktuliozės (skystosios laktuliozės 667 g/l pavidalu). Indikacijos: vidurių užkietėjimo (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos) gydymas, sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos. Kepenų encefalopatijos (kepenų liga, sukelianti sumišimą, tremorą, sumažėjusį sąmoningumo lygį, įskaitant komą) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „DUPHALAC“ geriamąjį tirpalą galima vartoti atskiestą ar neatskiestą. Vieną dozę reikia nuryti visą iškart, ilgai nelaikant burnoje. Vieną kartą per parą vartojamą dozę reikia išgerti tuo pačiu dienos metu, pvz., per pusryčius. Vartojant „DUPHALAC“ buteliuke, gali būti naudojama matavimo taurelė. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams pradinė paros dozė yra 15–45 ml, palaikomoji paros dozė – 15–30 ml. 7–14 metų vaikams pradinė paros dozė yra 15 ml, palaikomoji paros dozė – 10–15 ml. 1–6 metų vaikams pradinė paros dozė yra 5–10 ml, palaikomoji paros dozė – 5–10 ml. Kūdikiams iki 1 metų pradinė paros dozė yra iki 5 ml, palaikomoji paros dozė – iki 5 ml. Be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams iki 14 metų amžiaus „DUPHALAC“ vartoti negalima. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai: suaugusiesiems pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; galaktozemija; virškinimo trakto nepraeinamumas arba dalinio nepraeinamumo sindromai; virškinimo trakto perforacija ar perforacijos rizika; uždegiminė žarnyno liga. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti „DUPHALAC“, jei Jums skauda pilvą dėl nepaaiškinamų priežasčių, jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktozės), jei sergate cukriniu diabetu. Kai vartojama daug didesnė dozė hepatinei encefalopatijai gydyti, būtina atsižvelgti į tai, kad pacientas serga diabetu. Ilgą laiką netinkamai ar nepritaikytomis dozėmis vartojant vaisto, gali pasireikšti viduriavimas ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Reikia atsižvelgti į tai, kad gydymo metu gali sutrikti tuštinimosi refleksas. „DUPHALAC“ sudėtyje yra laktozės, galaktozės, fruktozės ir sulfitų. „DUPHALAC“ vartoti negalima, jei yra galaktozės arba fruktozės netoleravimas, visiškas laktazės trūkumas, gliukozės–galaktozės malabsorbcija. Pacientai, netoleruojantys laktozės, laktuliozę turi vartoti atsargiai.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-16.

nuo 11,14 €

Kepenims

ESSENTIALE®

FORTE N 300 mg,
30 kietųjų kapsulių 11,14 €
FORTE N 300 mg,
90 kietųjų kapsulių 20,00 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliojo medžiaga, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės. „ESSENTIALE FORTE N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 metų neištirti, todėl jie neturėtų vartoti šio vaistinio preparato. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: „ESSENTIALE FORTE N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „ESSENTIALE FORTE N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. „ESSENTIALE FORTE N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-01-12. 2605_SB_Essentiale_V01_LT.

-25% nuo 10,42 €

Sumažina viduriavimo simptomus

CATIDRAL®



Medicinos priemonės, milteliai geriamajai suspensijai paruošti, 12 paketėlių, 20 paketėlių

„CATIDRAL“ naudojamas esant ūminiam viduriavimui bei su viršikinimo trakto ligomis susijusiems skausmingiems simptomams (pilvo skausmui, spazmams, pilvo pūtimui) šalinti, padeda atstatyti druskų bei skysčių pusiausvyrą. Vanilės skonio. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiems.

ELEKTROLITAI, GLIUKOZĖ IR DIOSMEKTITAS VIENAME PREPARATE!



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Rankų netekęs Matas Gudauskis – atvirai apie nelaimę, pakeitusią gyvenimą, ir kas šiandien džiugina labiausiai



Pozityvumo nestokojantis vyras sako, kad šiandien džiaugiasi savo gyvenimu – neseniai kartu su mylimąja susilaukęs dukrytės jis rūpinasi šeima, dirba ir randa laiko sportui. Matas prakalbo ir apie svajones, ir apie išgirstas išankstines žmonių nuostatas. Jis kviečia jų atsikratyti ir nebijoti užduoti klausimų apie negalią – taip galime šviesti visuomenę ir visi tapti artimesni vienas kitam.

Matas dalinasi, kad nelaimingo atsitikimo metu, kuris įvyko 2019-aisiais metais rugpjūčio 25-ąją dieną, neteko abiejų rankų, kai dirbo geležinkelio ruože, netoli Lentvario.

„Toks nelaimingas įvykis, trauma, mane pakeitė. Pasikeitė ir tam tikri prinicipai, vertybės gyvenime, atvėrė akis. Šiandien aš džiaugiuosi tuo, ką pasiekiau ir savo gyvenimu. Geri Lietuvos žmonės suaukojo protezui, kuris leidžia šiandien būti čia ir pasakoti savo istoriją“, – dalinosi vyras.



Beje, jo gyvenime sportas užėmė irgi svarbią dalį, nors kaip pats Matas sako, jis net negalvojo, kad galėtų sportuoti. „Tokios minties nebuvo, galvojau, o kaip aš tą ar aną padaryčiau? Tačiau nuvykau ir pamačiau stiprius žmones, susipažinau su treneriu Danu Suodaičiu. Treneris man buvo didžiausia motyvacija“, – pasakojo Matas. Jis pridūrė, kad viena iš labiausiai įstrigusių trenerio frazių – „nėra problemų, yra tik sprendimai“.



Kadangi pagausėjo Mato šeima, jis nusprendė sportą atidėti į šalį ir įsidarbino, dėl ko labai džiaugiasi. Vyras sako, kad palaikymas artimoje aplinkoje yra tikrai svarbus ir prideda, kad jį supa geri žmonės.

„Žmonės mane priėmė tokį, koks esu ir tai mane labai motyvuoja“, – kalbėjo Matas. Jis sako, kad žmonės dažnai bijo paklausti ar pakalbinti, todėl skatina kaip tik – nebijoti žengti žingsnio į priekį ir užduoti klausimus, kurie domina.

„Reikėtų neturėti išankstinių nusistatymų. Reikėtų pažinti žmogų, duoti šansą. Mes nesame bejėgiai ir galime daug ką padaryti“, – kalbėjo vyras.

Vaistinių tinklo „Camelia“ kartu su Lietuvos paralimpiniu komitetu įgyvendinama socialinės atsakomybės iniciatyva „Kartu vienas dėl kito“ tęsiasi nuo 2022-ųjų metų. Ja siekiama didinti visuomenės supratimą apie negalią turinčius žmones ir skatinti jų įtrauktį į bendruomenes.

Lietuvos paralimpinis komitetas

CAMELIA VAISTINĖ
Mažų kainų vaistinė

Straipsnį rengė 15min.lt
Daugiau su projektu susijusių straipsnių rasite https://camelia.lt/kartu.

Nuo skausmo, karščiavimo, peršalimo

nuo **4⁶⁵ €**

PERTUSINAS

sirupas 4⁶⁵ €
FORTE 5⁷² €
vaikams 6⁷⁷ €



Tradiciniai augaliniai preparatai, sirupas, 100 ml

Tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „PERTUSINAS“ tirpalo yra 162,5 mg *Thymus vulgaris L. ir/ar Thymus zygis L, herba* (čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:1); 1 ml „PERTUSINAS FORTE“ tirpalo yra 307,5 mg *Thymus vulgaris L. ir/ar Thymus zygis L., herba* (čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas: 30 % (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml „PERTUSINAS“ tirpalo yra 1025 mg sacharozės ir 62,5 mg 80 % etanolio; 1 ml „PERTUSINAS FORTE“ tirpalo yra 919 mg sacharozės. Indikacijos: tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vaistiniai preparatai vartojami peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 desertinį šaukštą (10 ml) „PERTUSINAS“ tirpalo arba po 1 arbatinį šaukštelį (5 ml) „PERTUSINAS FORTE“. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) šeimos (Lamiaceae, s. Labiatae) augalams. Specialūs įspėjimai: nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes trūksta tyrimų duomenų. Jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. *Reklamos teksto parengimo data: 2019-01-23.

„PERTUSINAS“ sirupas, vaikams. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml sirupo yra 0,2 ml *Thymus vulgaris L.* ir (arba) *Thymus zygis L., herba* (vaistinių čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:2). Ekstrakcijos tirpiklis: 10 % (m/m) amoniako tirpalas / 85 % glicerolis / 90 % (V/V) etanolis / vanduo (1/20/70/109). Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Skirtas 4 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 12 metų paaugliams gerti po 10 ml sirupo (2 matavimo šaukštus) 3 kartus per dieną; 4-12 metų vaikams gerti po 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštą) 3 kartus per dieną. Specialūs įspėjimai: jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingi skrepliai, būtina pasitarti su gydytoju. Jei vartojant šio vaisto simptomai neišnyksta per savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 4 metų kūdikiams ir vaikams, nes tokio amžiaus kūdikius ir vaikus turi konsultuoti gydytojas. Šio vaisto sudėtyje yra nuo 4 iki 6 % (V/V) etanolio (alkoholio).* Reklamos teksto parengimo data: 2026-08-11.

ATSIKOSĖJIMUI PALENGVINTI – „PERTUSINAS“.

-35% nuo **5⁸² €**

SILVANOLS

produktų linija



Maisto papildai, 15 kapsulių, 20 ml, maisto produktas, 5 ledinukai

„SILVANOLS FARINGOSPRAY“ – purškalai gerklei su saltalankiais ir medetkomis. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Nuo 12 metų. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. Klasikinio ir apelsinų skonio. „SILVANOLS FARINGOSPRAY KIDS“ – purškalas gerklei vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais. Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę. Vaikams nuo 4 metų amžiaus. Be etanolio. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. „SILVANOLS LARINGOSPRAY“ – purškalas gerklei su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės būklę. Medetkų žiedai ramina burnos ertmės bei gerklės gleivinę ir padeda palaikyti normalią jų funkciją. Glicerolis užtikrina malonią gaminio konsistenciją ir tolygų padengimą. Nuo 12 metų. Be dirbtinių dažiklių. „FARINGO SOFT“ – minkštosios pastilės su šaltalankių aliejumi, hialurono rūgštimi, vaistinėmis svilarožėmis, vitaminais B2, C ir biotinu. Vaikams nuo 4 metų ir suaugusiems. Be cukraus. Be laktozės. „FARINGO“ – šaltalankių ledinukai su vitaminu C. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą. Be konservantų. Be dirbtinių dažiklių. Nuo 4 metų. „ATMOSIL“ kapsulės – kvėpavimo sistemai skirtas kompleksas su augaliniais ekstraktais. Pušų ekstraktas padeda palengvinti kvėpavimą bei palaikyti normalią kvėpavimo takų ir gerklės būklę. Anyžių ekstraktas ramina burnos ertmę, gerklę bei ryklę ir padeda palaikyti normalią balso stygų būklę. Bosvelijų ekstraktas padeda palaikyti plaučių ir kvėpavimo takų sveikatą. Taip pat produkto sudėtis papildyta vertingais flavonoidais bei augalinės kilmės medžiagomis – kvercetinu, resveratroliu, likopenu ir astaksantinu. Nuo 12 metų.

nuo **5¹⁵ €**

ACC®

20 mg/ml geriamasis tirpalas, 100 ml 7³¹ €
200 mg šnypščiosios tabletės, 20 tablečių 5⁶⁹ €



ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės, 6 tabletės 5¹⁵ €

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliojo medžiaga, stiprumas: 1 ml „ACC geriamojo tirpalo“ yra 20 mg acetilcisteino; 1 „ACC 200 mg šnypščiojoje tabletėje“ yra 200 mg acetilcisteino; 1 „ACC Long 600 mg šnypščiojoje tabletėje“ yra 600 mg acetilcisteino. Indikacijos: gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2-5 m. vaikams vartoti 100 mg acetilcisteino 2 kartus per dieną; 6-14 m. vaikams – 200 mg 2 kartus per dieną; vyresniems kaip 14 metų – 600 mg acetilcisteino. Vartoti per burną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba pagalbinėms medžiagoms; jaunesni nei 2 metų vaikai. „ACC Long 600 mg“ šnypščiosios tabletės netinka jaunesniems nei 14 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: bronchinė astma, skrandžio ar žarnų opaligė, padidėjęs jautrumas histaminui. BS2601069660.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.

„ACC“. PASIRŪPINSIME JŪSŲ KOSULIU.

8⁴² €

Nuo karščiavimo ir skausmo

IBUPROM® 40 mg /ml geriamoji suspensija vaikams



Nereceptinis vaistinis preparatas, 100 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „IBUPROM“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „IBUPROM“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30- 40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis patrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilklligė. Specialūs įspėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sistemine raudonąja vilklige, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidratacija, vartojantiesiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai.*Reklamos teksto parengimo data: 2024-12-12.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

9⁴⁰ €

Nuo slogos ir čiaudulio

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido. Indikacijos: nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės užburkimo (užgulimo) mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams vartoti po vieną tabletę kas 4-6 valandas iki 4 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; pacientai, kurie vartoja ar per paskutiniąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių; širdies ir kraujagyslių ligos; sunki hipertenzija arba jeigu hipertenzija nesureguliuota skiriant vaistų; sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga ar inkstų nepakankamumas; diabetas; feochromocitoma; hipertirozė; uždaro kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatomimetinius dekongestantus ir beta blokatorius. Negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Specialūs įspėjimai: „ACTIFED“ gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staiga netekus regos arba sumažėjus regos aštrumui, pasireiškus staigiam pilvo skausmui, kraujavimui iš išangės ar kitiems išeminio kolito simptomams. Nedelsdami nutraukite „ACTIFED“ vartojimą ir kreipkitės skubios medicinos pagalbos, jeigu pasireikštų stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega. Ligoniai, sergantys kepenų liga ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „ACTIFED“ turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „ACTIFED“ tabletių sudėtyje yra laktozės.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-12. LT-ACF-2026-309012.

KAI UŽSIKIMŠUSI NOSIS IR REIKIA PAGALBOS.

6⁷¹ €

Lokalus infekcijos sukelto burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas

FURASOL

100/900 mg gargalas (milteliai tirpalui)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 5 paketėliai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename milteliu paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. Indikacijos: lokalus infekcijos sukelto burnos ertmės ir ryklės uždegimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 metų vaikams: paketėlyje esančius miltelius ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą ir suvartoti iš karto, jo laikyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis – skalauti, o ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Negalima vartoti jaunesniems negu 4 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: kliniškai reikšmingos sąveikos su kitais vaistiniais preparatais nepastebėta. *Reklamos teksto parengimo data: 2025-10-10. FUR110102025LT.

7⁹⁹ €

ILOXEN

200 mg/30 mg
plėvele dengtos tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 12 plėvele dengtų tablečių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Indikacijos: „ILOXEN“ vartojamas suaugusiųjų ir 15 metų bei vyresnių paauglių peršalimo simptomų (nosies užgulimui, pasireiškusiam kartu su galvos skausmu ir /arba karščiavimu*) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams gerti po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Tabletę reikia nuryti nepažeistą ir nekramtytą, užgeriant didele stikline vandens, geriausia – valgio metu. Jeigu simptomai išreikšti stipriau, vartoti po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms šio vaisto medžiagoms; jaunesnis nei 15 metų amžius; trečias nėštumo trimestras bei žindymo laikotarpis; anksčiau pasireiškusi alerginė reakcija (dusulys, astma, šiberimas, nosies niežulys ir varvėjimas arba veido patinimas), sukelta acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU); virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU; skrandžio ar dvylikapirščės žarnos opa ar kraujavimas (anksčiau buvę 2 ar daugiau atskirų patvirtintų opos ar kraujavimo epizodų); sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, sunki ūminė ar lėtinė inkstų liga. Šio vaisto negalima skirti pacientams, turintiems sunkių širdies arba kraujagyslių sutrikimų (širdies ligas, aukštą kraujospūdį, krūtinės anginą, padidėjusį širdies susitraukimų dažnį), padidėjusį skydliaukės aktyvumą, cukrinį diabetą arba feochromocitomą; labai padidėjusį arba vaistais nesureguliuotą kraujospūdį; taip pat anksčiau patyrus miokardo infarktą, insultą arba nustačius padidėjusią jo riziką. Kitos kontraindikacijos: anksčiau pasireiškę traukuliai, dėl neaiškios priežasties sutrikusi kraujo gamyba; padidėjęs akispūdis (uždaro kampo glaukoma); pasunkėjęs šlapinimasis dėl prostatos sutrikimų; diagnozuota sisteminė raudonoji vilklige. Vaisto negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo nosies užgulimo, metilfenidatu, kai kuriais vaistais nuo depresijos. Specialūs įspėjimai: „ILOXEN“ reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergama bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, periferinių arterijų ar infekcine liga, taip pat jei yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas ar kraujospūdis, padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, sutrikęs kraujo krešėjimas, sutrikusi inkstų ar kepenų veikla. Atsargiai vartoti, jei rūkoma, šeimoje yra buvę širdies ligų ar insulto atvejų, arba jei pacientui anksčiau buvo pasireiškęs bet koks virškinamojo trakto sutrikimas ar liga. Medicininė konsultacija būtina esant širdies ligoms, įskaitant širdies nepakankamumą ir krūtinės anginą (krūtinės skausmą), arba jeigu anksčiau buvo ištikęs širdies priepuolis, insultas arba atliktą kraujagyslių šuntavimo operacija. Nutraukite „ILOXEN“ vartojimą ir susisiekite su gydytoju arba skubiai kreipkitės medicinos pagalbos, jei pasireiškia: staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, odos išberimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kiti alergijos požymiai, jeigu staiga praradote regėjimą; jeigu Jums pasireiškių užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromo (UGES) ar grįžtamosios smegenų vazokonstrikcijos sindromo (GSVS) simptomai - stiprus staiga prasidėjęs galvos skausmas, pykinimo jausmas, vėmimas, sumišimas, traukuliai, pakitusi rega.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-23.

DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!**

5⁷¹ €

Nosies gleivinės paburkimui mažinti

RHINO-STAS

1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas)



Nereceptinis vaistinis preparatas, 10 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml nosies purškalo yra 1 mg oksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: „RHINO-STAS“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant sloga arba prienosinių ančių uždegimu (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti po 1 išpurškimą „RHINO-STAS“ tirpalo į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. Kontraindikacijos: alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: „RHINO-STAS“ galima vartoti tik atidžiai įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro kampo glaukoma; sergant sunkia širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinkščių naviku); sergant porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireoze, cukriniu diabetu).* Reklamos teksto parengimo data: 2025-08-12. 2508_SB_Rhino-stas_V01_LT

„RHINO-STAS“ PURŠKALAS – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai neprageina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu Nepageidaujama R@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.



VAISTINĖLĖ PERŠALIMO SIMPTOMAMS ĮVEIKTI!

PAGAMINTA PRANCŪZIJOJE

28,27 €



Karščiavimas, šaltkrėtis, raumenų skausmas?! OSCILLOCOCCINUM!

- Tinka visai šeimai
- Lengvas vartojimas
- Gali palengvinti peršalimo simptomus

6,65 €



Prasideda kosulys? Vartok STODAL!

- Vaikams (nuo 2 m.) ir suaugusiems
- Gali palengvinti bet kokį kosulį
- 10 veikliųjų medžiagų

7,19 €



Užkimai? Skauda gerklę? Homeovox!

- Tinka žmonėms, kurių balsas yra „darbo įrankis“
- Tinka visai šeimai
- Saugus nėščioms ir žindančioms moterims
- Saugus vartoti kartu su kitais medikamentais

6,42 €



Peršalai? Varva nosis? CORYZALIA!

- Vartojamas esant bet kokiai slogai
- Saugus nėščioms ir žindančioms moterims
- Nesukelia šalutinio poveikio
- Galima vartoti kartu su kitais medikamentais

BOIRON

OSCILLOCOCCINUM, piliulės, 30 vienadozių talpyklių. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (Anas Barbariae) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos. Indikacijos: virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti klinikiniais tyrimais patikrintas priemones. Vartojimo būdas ir dozavimas: dozė priklauso nuo ligos stadijos: inkubacijos laikotarpiu ir kai tik atsiranda simptomų – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras. Vienos dozės turinį suberti po liežuviu ir leisti ištirpti. Vartojimą vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius. *Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-23.
STODAL sirupas, 200 ml. Veikliosios medžiagos, stiprumas: Antimonium tartaricum 6 CH 59,375 mg, Bryonia 3 CH 59,375 mg, Coccus cacti 3 CH 59,375 mg, DroseraTM 59,375 mg, Ipeca 3 CH 59,375 mg, Myocarde 6 CH 59,375 mg, Pulsatilla 6 CH 59,375 mg, Rumex crispus 6 CH 59,375 mg, Spongia tosta 3 CH 59,375 mg, Sticta pulmonaria 3 CH 59,375 mg. 15 ml dozėje yra 0,069 g etanolio ir vienoje 15 ml dozėje yra 0,206 g etanolio. Indikacijos: kosuliui lengvinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems žmonėms ir paaugliams: po 15 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą. Vaikams (nuo 2 iki 12 metų): po 5 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą. Vaistinio preparato sudėtyje yra etanolio, todėl vaikams iki 2 metų vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti vaikams iki 2 metų (sudėtyje yra etanolio). Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato sudėtyje yra 1,74 % tūrio (V/V) etanolio (alkoholio). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiesiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. Negalima ilgiau kaip savaitę vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, nes sudėtyje yra etanolio. Vienoje 5 ml dozėje yra 3,75 g sacharozės ir vienoje 15 ml dozėje yra 11,25 g sacharozės. Į tai reikia atsižvelgti gydant sergančiuosius cukriniu diabetu. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. *Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-23.
HOMEOVOX, 60 dengtųjų tablečių. Veikliosios medžiagos, stiprumas: Aconitum napellus 3 CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3 CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum Aconitum napellus 3 CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3 CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum 6 CH 0,091 mg, Calendula officinalis 6 CH 0,091 mg, Spongia tosta 6 CH 0,091 mg, Atropa belladonna 6 CH 0,091 mg, Mercurius solubilis 6 CH 0,091 mg, Hepar sulphuris calcareum 6 CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6 CH 0,091 mg, Populus candicans 6 CH 0,091 mg, Bryonia dioica 3 CH 0,091 mg. Bryonia dioica 3 CH 0,091 mg. Indikacijos: trumpalaikiam užkimimui ir gerklės skausmui malšinti. Indikacijos pagrįstos tik homeopatine patirtimi. Vartojimo būdas ir dozavimas: maždaug kas valandą leisti 2 tabletėms lėtai ištirpti burnoje. Būklei gerėjant, tabletes čiulpti rečiau. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. *Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-23.
CORYZALIA, 40 dengtųjų tablečių. Veikliosios medžiagos, stiprumas: Allium cepa 3 CH 0,333 mg, Sabadilla 3 CH 0,333 mg, Gelsemium 3 CH 0,333 mg, Belladonna 3 CH 0,333 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg, Pulsatilla 3 CH 0,333 mg. Indikacijos: peršalimo ir slogos simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 m. rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 tabletė, ji geriama 6–8 kartus per parą. Vos tik simptomai palengvėja, reikia didinti intervalą tarp dozių vartojimo, o kai simptomai išnyksta, šio vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Gydymo trukmė – ne ilgesnė kaip viena savaitė. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. *Reklamos teksto parengimo data: 2024-08-23.

*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

5⁴⁹ €



Nuo gerklės skausmo

INOVOX

ORANGE 2 mg/0,6 mg/1,2 mg

Nereceptinis vaistinis preparatas, 24 kietosios pastilės

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegimo būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 valandas ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmių burnos ir gerklės žaizdų, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo.* Reklamos teksto parengimo data: 2022-06-09.

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS!

NAUJIENA

nuo **5⁹¹ €**



GRINITE

THERMAL milteliai geriamajam tirpalui, 8 paketėliai 7³⁹ €

12 plėvele dengtų tablečių 5⁹¹ €

Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: „GRINITE THERMAL“ milteliai geriamajam tirpalui: 1 paketėlyje yra yra 650 mg paracetamolio, 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 20 mg dekstrometorfano hidrobromido ir 4 mg chlorfenamino maleato. „GRINITE“ plėvele dengtos tabletės: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido, 2 mg chlorfenamino maleato. Indikacijos: trumpalaikis peršalimo ar gripo simptomų (karščiavimo, nosies užgulimo, sauso kosulio, galvos ir ryklės skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams: vienas paketėlis „GRINITE THERMAL“ kas 4–6 val., bet ne daugiau kaip 4 paketėliai per dieną. Paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto vandens ir išgerti. „GRINITE“ plėvele dengtos tabletės: 1 arba 2 tabletės 1 kartą per parą, prieš miegą. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai vaisto sudėtinei medžiagai; anemija; labai sutrikusi inkstų ar kepenų veikla; jaunesnis nei 12 m. amžius; kosulys, lydimas didelio atkosimų skreplių kiekio; bronchų astma ir kosulys, susijęs su astma; labai padidėjęs kraujospūdis; diabetas; uždaro kampo glaukoma; hipertiroidizmas; antinkščių navikas (feochromocitoma); įgimtas gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas; ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu; šlapimo susilaikymas; sunki širdies ir kraujagyslių liga; epilepsija; cistinė fibrozė; nėštumo ar žindymo laikotarpis; mitybos nepakankamumas; kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, pseudoefedrino, dekstrometorfano, chlorfenamino, vartojimas; simpatomimetikų, antihistamininių vaistų vartojimas; per paskutines 2 savaites vartoti monoaminoksidazės inhibitoriai. Specialūs įspėjimai: pasitarti su gydytoju arba vaistininku: esant nusilpimui, ilgalaikiam nejudrumui, nepilnavertei mitybai; sutrikus kepenų ar inkstų veiklai; esant pasunkėjusiam kvėpavimui, emfizemai, astmai, lėtiniam bronchitui, padidėjusiai prostatai, padidėjusiam akispūdžiui, pernelyg aktyviai skydliaukei; sergant epilepsija, širdies ar arterijų liga; sutrikus širdies ritmui ar padidėjus kraujospūdžiui; praeityje buvus piktnaudžiavimui vaistais ar psichoaktyviomis medžiagomis; paaugliams, jauniems suaugusiesiems, senyviems žmonėms; vartojant vaistų nuo nemigos, raminamųjų vaistų, CYP2D6 fermento aktyvumą slopinančių vaistų; vaistų nuo depresijos ar psichozių. Šis vaistas gali sukelti priklausomybę. Gali būti teigiamas dopingo testo rezultatas. Sudėtyje yra sacharozės. Jeigu per 3 dienas savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-29.

po **5⁴⁵ €**



PELAFEN

8 g/10 g, geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml 5⁴⁵ €

8 mg/ml, sirupas, 100 ml 5⁴⁵ €

Nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 10 g „PELAFEN“ geriamųjų lašų (= 10 ml) yra 8 g Pelargonium sidoides DC ir (arba) Pelargonium reniforme Curt., radix (pelargonijų šaknų) tinktūros (1:8 – 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 15 % (V/V) etanolis. Kiekviename ml „PELAFEN“ sirupo yra 8 mg Pelargonium sidoides DC ir (arba) Pelargonium reniforme Curt., radix (pelargonijų šaknų) sausojo ekstrakto (4-25:1). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Indikacijos: „PELAFEN“ yra tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas simptominiam peršalimo gydymui. „PELAFEN“ skirtas suaugusiesiems, paaugliams ir vyresniems nei 6 metų vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: „PELAFEN“ geriamieji lašai (tirpalas): vartoti per burną. 12 metų ir vyresniems paaugliams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams – po 30 lašų tris kartus per parą; 6-11 metų vaikams ir paaugliams – po 20 lašų tris kartus per parą. Reikiamą kiekį lašų galima gerti tiesiai iš šaukšto arba, jei pageidaujama, galima sumaišyti su puse stiklinės vandens ir iš karto išgerti visą stiklinės turinį. Dozę reikia gerti ryte, vidurdienį ir vakare. „PELAFEN“ sirupas: vartoti per burną, naudojant pridedamą matavimo tauriklę. Prieš vartojimą buteliuką reikia gerai pakratyti. 12 metų ir vyresniems paaugliams, suaugusiesiems ir senyviems žmonėms – po 2,5 ml sirupo tris kartus per parą; 6-11 metų vaikams ir paaugliams – po 2,5 ml sirupo du kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni nei 6 metų vaikai. Specialūs įspėjimai: jei vartojant vaistinį preparatą po 7 dienų simptomai pasunkėja arba išlieka, pacientui būtina kreiptis į gydytoją. Jei pasireiškia dusulys, karščiavimas arba atsiranda kraujingų ar pūlingų gleivių, jei atsiranda toksinio poveikio kepenims požymių (tokių kaip pykinimas, apetito praradimas, epigastriumo (viršutinės pilvo dalies) skausmas, nuovargis, geltona odos spalva), reikia nedelsiant nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją. „PELAFEN“ nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir žindymo metu.*Reklamos teksto parengimo data: 2025-02-21.

po **3⁵⁶ €**



Nuo slogos

GALAZOLIN®

0,05 % nosies lašai 3⁵⁶ €

0,1 % nosies lašai 3⁵⁶ €

Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 10 ml

Veikliojoje medžiaga, stiprumas: ksilometazolino hidrochloridas, 0,05%, 0,1%. Indikacijos: nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 metų vaikams į kiekvieną nosies landą reikia lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams į kiekvieną nosies landą reikia lašinti po 2–3 lašus 0,1 % koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. Ksilometazolino tirpalo vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaro kampo glaukoma, pašalinta hipofizė arba atlikta kitokia operacija, kurios metu buvo atvertas kietasis smegenų dangalas. Specialūs įspėjimai: preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Ilgiau negu dvi savaites vartojamas preparatas gali sukelti antrinį kraujagyslių išsiplėtimą, dėl kurio atsiranda medikamentinė sloga. Kadangi vaisto galima netyčia nuryti, ligonius, kuriems simpatikomimetikų vartoti negalima, gydyti medikamentu reikia atsargiai. Preparato negalima vartoti kartu su MAO inhibitoriais bei tricikliais antidepresantais.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-02.

IŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

nuo **2⁷⁰ €**

Temperatūrai mažinti, skausmui malšinti

IBUGARD

100 mg/5 ml,
geriamoji suspensija, 120 ml 4³⁵ €
200 mg/5 ml,
geriamoji suspensija, 100 ml 8¹⁸ €
200 mg, 10 minkštųjų kapsulių 2⁷⁰ €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliojoi medžiaga, stiprumas: 1 ml geriamosios suspensijos „IBUGARD“ 100 mg/5 ml yra 20 mg ibuprofeno; 1 ml geriamosios suspensijos „IBUGARD“ 200 mg/5 ml yra 40 mg ibuprofeno; 1 kapsulėje „IBUGARD“ yra 200 mg ibuprofeno. Indikacijos: įvairios kilmės karščiavimo, silpno ir vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikis simptominis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė – 20–30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp dozių – 4–6 valandos. Kontraindikacijos: „IBUGARD“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinimo trakto; jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu prasideda virškinimo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjaraupiais, reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę virškinimo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė arba kita imuninio audinio liga, kai pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Nevartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-02.

-20% nuo **6³¹ €**



Kvėpavimo takams ir imunitetui

SINULAN®

FORTE
DUO FORTE
FORTE JUNIOR

Maisto papildai, 15 tablečių; sirupas, 120 ml

„SINULAN FORTE JUNIOR“ sirupas – imunitetui ir kvėpavimo takams. Skėstašakių kamrų lapų, juoduogių šeivamedžių vaisių, mažalapių liepų žiedų, vaistinių svilarožių šaknų ir vaistinių verbenų antžeminės augalo dalies ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų būklę. Skėstašakių kamrų lapų, juoduogių šeivamedžių vaisių ekstraktai ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Biotinas padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. „SINULAN FORTE“ – kvėpavimo takams ir imunitetui. Skėstašakių kamrų lapų, juoduogių šeivamedžių žiedų ir vaistinių verbenų antžeminės augalo dalies ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų būklę ir imuninės sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per dieną. „SINULAN FORTE DUO“ – kvėpavimo takams ir imunitetui. Didžiažiedžių tūbių žiedų ir vaistinių verbenų antžeminės augalo dalies ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų būklę. Juoduogių šeivamedžių žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalią viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų būklę ir normalią imuninės sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per dieną. 2603_SB_Sinulan_V01_LT

UNIKALIOS SUDĖTIES ŽOLINIAI EKSTRAKTAI KVĖPAVIMO TAKŲ SISTEMAI IR IMUNITETUI.

6⁷⁸ €

HERBION®



Nereceptinis vaistinis preparatas, 16 pastilių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gebenių lapų sausasis ekstraktas. Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5-7,5:1). Indikacijos: augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas atsikosėjimui lengvinti pasireiškus dėgnam kosului suaugusiesiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprasta dozė 6-11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą; suaugusiesiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams – 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Kontraindikacijos: alergija gebenių lapų ekstraktui, kitiems Araliaceae (gebenių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: jei yra kvėpavimo pasunkėjimas, karščiavimas ar atkosima pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Jei simptomai po 7 vaisto vartojimo dienų nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją. Gydymo šiuo vaistu metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistų (vaistų nuo kosulio, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas) nerekomenduojama. Jeigu yra skrandžio sutrikimų (gastritas ar skrandžio opaligė), vaisto reikia vartoti atsargiai.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-12-08.

GREITAI NUGALI KOSULĮ!

-20% **7¹⁶ €** 8⁹⁵ €

HERBISLAND®



Medicinos priemonė, 16 kietųjų pastilių

Gerklės dirginimui, užkimimui ir sausam kosului malšinti. Be cukraus. Apelsinų skonio kietosiose pastilėse yra 3 mg islandinių kerpenų sausojo ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.L., thallus) (atitinkančio 90-120 mg islandinių kerpenų). Tai yra tradicinis augalinis preparatas, kuris rekomenduojamas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosului palengvinti. Islandinių kerpenų ekstrakto sudėtyje yra didelis kiekis vandenyje tirpių gleivių, kurios, kaip manoma, padengia, apsaugo ir drėkina burnos bei gerklės gleivinę bei sumažina jos dirginimą. Įprastinė dozė suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams yra 1 kietoji pastilė ąštuonis kartus per dieną.

TEGUL TAVO BALSAS BŪNA IŠGIRSTAS!

-15% nuo **10¹¹€**

HUMER



Medicinos priemonės, jūros vanduo, 50 ml, 150 ml

„HUMER“ – 100 % neskiestas jūros vanduo, turtingas mikroelementų, tinkamas kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Rekomenduojamas naudoti kasdienei nosies higienai, drėkina išsausėjusią gleivinę, palengvina nosies išpūtimą, padeda pašalinti virusus bei alergenus. Natūraliai atkemša labai užgulusią nosį. „HUMER“ hipertoninis jūros vanduo užgulusiai nosiai, 50 ml – didesnio druskingumo jūros vanduo skirtas kompleksiniam slogos gydymui, esant peršalimui ar alerginiam rinitui. Natūraliai atkemša užgulusią nosį.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

4 79 €



Nuo gerklės skausmo

HEXORALETTEN ®N

5 mg/1,5 mg kietosios pastilės

Nereceptinis vaistinis preparatas, 16 kietųjų pastilių

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1,5 mg benzokaino. Indikacijos: lokalus burnos ir ryklės infekcinių ligų (faringito, stomatito, gingivito) simptomų slopinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1-2 val., daugiausiai 8 kietąsias pastiles per parą. 6-12 metų vaikams: jei nepaskirta kitaip, sučiulpti po 1 kietąją pastilę keletą kartų per parą. Jei reikia, galima čiulpti po 1 kietąją pastilę kas 1-2 val., daugiausiai 4 kietąsias pastiles per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; sumažėjęs plazmos cholinesterazės kiekis; burnoje ar gerklėje yra žaizdų ar opų; jaunesni kaip 6 metų vaikai. Specialūs įspėjimai: jeigu sergate sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas. Jei yra burnos gleivinės epitelio defektų ar gleivinė lupasi, šio vaisto vartoti nereikėtų. Gali atsirasti dėmių burnos gleivinės bei dantų paviršiuje. Benzokainas gali sukelti methemoglobinemiją (pasireiškia odos, lūpų ir nagų guolių blyškumu, pilkumu ar melsvumu, galvos skausmu, svaiguliu, dusuliu, nuovargiu ir dažnu širdies plakimu). Kietosios pastilės gali sukelti užspringimo riziką. Šio vaisto reikia vartoti atsargiai, jeigu turite aspiracijos ir rijimo problemų. Vengti valgyti ar gerti iškart po pastilės vartojimo. „HEXORALETTEN N“ sudėtyje yra aspartamo ir izomalto.*Reklamos teksto parengimo data: 2026-09-12. LT-HXA-2026-356628.

GREITAS IR ILGALAIKIS GERKLĖS SKAUSMO MALŠINIMAS.

-15% nuo 6 71 €



Gerklei

ISLA®

Medicinos priemonės, 20 pastilių, 30 pastilių

„ISLA“minkštosios pastilės yra medicinos priemonė, kurių sudėtyje esantis islandinių kerpenų ekstraktas pasižymi gleivinę drėkinančiomis, maitinančiomis ir regeneruojančiomis savybėmis. Padengia burnos, gerklės ir ryklės gleivinę kaip balzamas ir apsaugo sudirgusią gleivinę nuo tolesnio dirginimo. Pastilės padeda esant gerklės perštėjimui ir užkimimui. Tinka suaugusiesiems ir vyresniems kaip 4 metų vaikams. Lėtai čiulpti 1–2 pastiles keletą kartų per dieną pagal poreikį. Vaikams pastiles galima vartoti tik įsitikinus, kad jie moka čiulpti ir gali tai kontroliuoti. „ISLA JUNIOR“ braškių skonio pastilės tinka vaikams nuo 4 metų. Jos apsaugo sausą ir sudirgusią burnos bei ryklės gleivinę ir palengvina su peršalimu bei gerklės skausmu susijusius negalavimus.

„ISLA“ – GERKLĖS PERŠTĖJIMUI IR UŽKIMIMUI LENGVINTI.

nuo 7 35 €

BRONCHIPRET®

TI geriamasis tirpalas, 100 ml **8 15 €**

TI INTENS geriamasis tirpalas, 50 ml **9 27 €**

20 tablečių **7 35 €**



Nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename ml (atitinka 1,09 g) „BRONCHIPRET® INTENS“ tirpalo yra 490 mg čiobrelių žolės skystojo ekstrakto (1:2-2,5), 49 mg gebenių lapų skystojo ekstrakto (1:1). Viename grame (atitinka 0,89 ml) „BRONCHIPRET®“ tirpalo yra 150 mg vaistinių čiobrelių žolės skystojo ekstrakto (1:2-2,5), 15 mg gebenių lapų skystojo ekstrakto (1:1). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg raktažolių šaknų sausojo ekstrakto ir 160 mg vaistinių čiobrelių žolės sausojo ekstrakto. Indikacijos: „BRONCHIPRET® TI“ yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito sukelto drėgno kosulio priepuoliams retinti ir atsikosėjimui gerinti. „BRONCHIPRET® TI INTENS“ - augalinis vaistas, skirtas atsikosėjimui lengvinti drėgno kosulio atveju, suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų. „BRONCHIPRET®“ tabletės - augalinis vaistas, skirtas vartoti esant drėgnam kosului, siekiant palengvinti klampių gleivių atkosėjimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: „BRONCHIPRET® TI“: 1-5 m. amžiaus vaikams gerti po 3,2 ml, 6-11 m. amžiaus vaikams – po 4,3 ml, nuo 12 m. ir suaugusiems – po 5,4 ml 3 kartus per parą. „BRONCHIPRET® TI INTENS“: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų gerti po 1,85 ml 3 kartus per parą. „BRONCHIPRET®“ tabletės: suaugusiems gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas gebenėms, raktažolėms, čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) Lamiaceae (Labiatae) ar aralijinių (Araliaceae) šeimos augalams, beržams, kiečiams, salierams arba kitoms preparato sudedamosioms dalims. „BRONCHIPRET® TI INTENS“ geriamojo tirpalo draudžiama vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau nei 1 savaitę ar vaisto vartojimo metu pasunkėja, arba jeigu prasideda dusulys, karščiavimas, o skrepliai tampa pūlingi arba juose atsiranda kraujo priemaišų, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Rekomenduojama imtis atsargumo priemoniu pacientams, sergantiems gastritu arba skrandžio opa. „BRONCHIPRET® TI“ negalima vartoti jaunesniems nei 1 metų amžiaus vaikams. Jeigu 1–4 metų vaikams pasireiškia nuolatinis arba pasikartojantis kosulys, reikia kreiptis į gydytoją. „BRONCHIPRET®“ tabletės neskirtos vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, nes jo veiksmingumas dar neištirtas. „BRONCHIPRET® TI INTENS“ geriamasis tirpalas nėra skirtas vaikams nuo 2 iki 12 metų, nes kitos farmacinės formos gali būti tinkamesnės šiai populiariai.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-08-07.

„BRONCHIPRET®“ – KOSULĮ MALŠINANTI JĖGA!

nuo 5 16 €



Nuo peršalimo ar gripo simptomų

DALERON COLD3®

12 plėvele dengtų tablečių **5 16 €**

24 plėvele dengtų tabletės **7 68 €**

Nereceptinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir uždurkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgtas miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantys insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, hipertireozė arba badavimas. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvus traukuliu.* Reklamos teksto parengimo data: 2023-02-09.

PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!

nuo 8 40 €

Burnos gleivinei

TANTUM VERDE®

1,5 mg /ml burnos gleivinės purškalas, 30 ml **9 52 €**

3 mg, 20 kietųjų pastilių **8 40 €**

TANTUM LEMON®

3 mg, 20 kietųjų pastilių **8 40 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 ml burnos gleivinės purškalo yra 1,5 mg benzidamino hidrochlorido. Vienoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido. Indikacijos: lokaliam simptominiam skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir patinimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Purškalas: reikia purkšti 2 – 6 kartus per parą: suaugusiems po 4 – 8 išpurškimus, 6 – 12 metų vaikams po 4 išpurškimus, 3 – 5 metų vaikams po 1 išpurškimą 4 kg kūno svorio (daugiausia 4 išpurškimus). Pastilės: suaugusiems sučiulpti po 1 kietąją pastilę 3 – 4 kartus per parą. 6 – < 12 metų vaikams vartoti galima tik suaugusiam žmogui prižiūrint; jaunesniems negu 6 metų vaikams vartoti negalima. Kontraindikacijos: alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. Specialūs įspėjimai: per apsirikimą pavartojus (pvz., vaikui) labai daug vaisto, būtina nedelsiant informuoti gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina kreiptis į gydytoją. Reikia saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis. Ilgalaikis gydymas benzidaminu gali lemti jautrumo padidėjimą. Tokiu atveju vaistinio preparato vartojimą turite nutraukti ir kreiptis į gydytoją.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-10-13.

5 75 €

Skausmo malšinimui ir karščiavimo mažinimui

EFFERALGAN

30 mg/ml geriamasis tirpalas, vaikams



Nereceptinis vaistinis preparatas, 90 ml

Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg paracetamolio. Indikacijos: trumpalaikis karščiavimo mažinimas, lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „EFFERALGAN“ 30 mg /ml geriamasis tirpalas, vaikams: vartoti per burną. Galima gerti neskiestą arba atskiesti trupučiu skysčio. Šis geriamasis tirpalas tinka tik 3–32 kg svorio (maždaug nuo gimimo iki 12 metų amžiaus) vaikams. Vaikams paracetamolis dozuojamas pagal kūno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė yra 60 mg/kg. Ji išgeriama per 4–6 kartus lygiais intervalais (t. y. po 15 mg/kg kas 6 val. arba po 10 mg/kg kas 4 val.). Vartoti reikia lygiais intervalais dieną ir naktį. Pakuotėje yra geriamasis dozavimo švirkštas su skale, kuri yra sugraduota pagal vaiko svorį kilogramais (dozuojant švirkštu paracetamolio dozė yra 15 mg/kg). 3-16 kg vaikams pripilkite geriamąjį matavimo švirkštą iki jo kūno svorį atitinkančios ar artimiausios žymos (maksimali švirkšto riba – 16 kg). 16-32 kg vaikams vieną kartą iki galo pripildykite ir vaikui sugirdykite pilną geriamąjį švirkštą, po to antrą kartą įtraukite ir sugirdykite likusį trūkstamą kiekį. Prireikus kartokite dozę po 6 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų nepakankamumas ir dekompensuotos aktyvios kepenų ligos. Specialūs įspėjimai: patikrinkite, ar pacientas nevartoja kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Atsargiai vartoti pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu (įskaitant Žilberto sindromą), sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu; esant ilgalaikei blogai mitybai, anoreksijai, kacheksijai, bulimijai, badavimui; kai yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stoka, dehidratacija, hipovolemija. Ilgą laiką (> 3 mėnesius) kas dvi dienas ar dažniau vartojant skausmą malšinančių vaistų pacientams, sergantiems lėtiniu galvos skausmu, gali atsirasti arba paūmėti galvos skausmas, kuris neturi būti gydomas didinant dozę. Paracetamolis gali sukelti sunkių odos reakcijų, kurios gali būti mirtinos. Įtariant piroglutamato acidozės sukeltą PATMA, rekomenduojama nedelsiant nutraukti paracetamolio vartojimą ir atidžiai stebėti. Vartojant didesnę nei rekomenduojama „EFFERALGAN“ 30 mg/ml geriamojo tirpalo vaikams dozę, kyla labai rimto kepenų pažeidimo pavojus. Sudėtyje yra sacharozės. Į tai būtina atsižvelgti žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu arba besilaikantiems mažai angliavandenių turinčios dietos. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija, arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Sudėtyje yra propilenglikolio. Vartojimas su bet kokiu alkoholdehidrogenazės substratu, pavyzdžiui, etanoliu, naujagimiams gali sukelti sunkų nepageidaujamą poveikį.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-09-04.

nuo 2 47 €

Nuo skausmo

IBUMETIN®

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **2 47 €**

400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių **3 19 €**

400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių **4 64 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta vienkartinė dozė yra 1 – 2 tabletės „IBUMETIN“ 200 mg arba 1 tabletė „IBUMETIN“ 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg ibuprofeno. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Anksčiau buvo pasireiškusi acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozinė edema, dilgėlinė, alerginis rinitas ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas. Yra polinkis kraujuoti, antikoaguliantų vartojimas, per mažas trombocitų kiekis kraujyje, infekcinė liga, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, paskutiniai trys nėštumo mėnesiai ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti draudžiama. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų, sutrikęs kraujo krešėjimas, jei vartojama kitų NVNU ar vaistų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, vartojama diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistų, sergama cukriniu diabetu, sistemine raudonąja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferiniu arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Pasireiškus alerginės reakcijos į vaistą požymiams, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Negalima vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pirmuosius 6 nėštumo mėnesius vartoti negalima, nebent tai neabejotinai būtina ir taip pataria gydytojas.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-03. LT-IBUM-2400001.

nuo 7 66 €

LARYXIN

LEMON 5 mg/1 mg **7 66 €**

MENTHOL 5 mg/1 mg **7 66 €**

MENTHOL 2 mg/0,5 mg/ml, purškalas **8 81 €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 24 suslėgtosios pastilės, burnos gleivinės purškalas, 30 ml

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje suslėgtojoje pastilėje yra 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido ir 1 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato; viename burnos gleivinės purškalo išpurškime yra 0,17 mg chlorheksidino digliukonato ir 0,043 mg lidokaino hidrochlorido monohidrato. Indikacijos: gerklės skausmo simptomų malšinimas suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams. Vartojimo būdas ir dozavimas: suslėgtosios pastilės: leiskite pastilei lėtai ištirpti burnoje. Suaugusiesiems – po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 10 pastilių per dieną. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 5 pastilės per dieną. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Burnos gleivinės purškalas: vartoti ant burnos gleivinės. Suaugusiesiems – po 3–5 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 10 kartų per parą. Paaugliams nuo 12 iki 18 metų – po 2–3 išpurškimus į galinę gerklės dalį kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 5 kartus per parą. Negalima nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Kontraindikacijos: alergija chlorheksidinui, lidokainui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai: vaistą vartokite tik trumpalaikiam skausmo ir dirginimo malšinimui. Kreipkitės į gydytoją, jei per 3-4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba karščiuojate, skauda galvą, pykina, vemiate ar atsiranda odos išbėrimas. Jeigu esate alergiški kitiems vietiniams amidų grupės anestetikams, pavyzdžiui, lidokainui, turite laikytis saugumo priemonių. Vartojant didesnes nei rekomenduojama dozes, gali sumažėti rijimo refleksо valdymas. Dėl to gali padidėti skysčių ir maisto dalelių įkvėpimo rizika. Nevartokite tuo pačiu metu, prieš pat ar iš karto po kitų burnos ir (arba) gerklės dezinfekavimo priemonių vartojimo. „LARYXIN LEMON“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio (fruktozės šaltinis, taip pat gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį), aspartamo (fenilalanino šaltinis, gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija), benzilo alkoholio (gali sukelti alerginių reakcijų), maltodekstrino (jis skaidomas į gliukozę) ir natrio (dėl mažo kiekio jis beveik neturi reikšmės). „LARYXIN MENTHOL“ suslėgtųjų pastilių sudėtyje yra sorbitolio ir levomentolio (duodant vartoti maždaug vaikams, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, reikia laikytis saugumo priemonių). „LARYXIN MENTHOL“ burnos gleivinės purškalo sudėtyje yra etanolio (96 %) ir levomentolio. Mažas alkoholio (etanolio) kiekis, esantis šių vaistų sudėtyje, nesukelia pastebimo poveikio.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-10.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai neprasėina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

ICONFIT

Daugiau sveikatos – daugiau gyvenimo spalvų.

ICONFIT *– estiškas maisto papildų prekės ženklas, veikiantis nuo 2013 m. Daugelis produktų formulių sukurtos pačios įmonės; sudėtis – švari, be nereikalingų priedų.*

iki -25% nuo 6,87 €

MIEGAS IR RAMYBĖ

Ramiai dienos pabaigai. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.



Valerijonas 200mg



Ašvaganda



Magnis ir B6



Magnio bisglicinatas

MIEGAS IR RAMYBĖ

IMUNITETAS

Tamsiajam metų laikui. Vitaminai C ir D, cinkas bei selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



Vitaminas D3 (4000 TV)



Vitaminas C (800 mg, nerūgštinis)



Cinkas



Selenas

IMUNITETAS

ENERGIJA

Aktyvioms dienoms. B grupės vitaminai ir geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.



B grupės vitaminų kompleksas



Energijos kompleksas



Geležis su vitaminu C



Kofermentas Q10

ENERGIJA

GROŽIS IR SAVIJAUTA

Kasdienė priežiūra iš vidaus. Kruopščiai subalansuotos formulės jūsų gerai savijautai ir grožiui.



Premium Omega-3



Nakvišų sėklų aliejus



Sąnariams



Boulardii

GROŽIS IR SAVIJAUTA



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

NAUJA LINIJA

bio farmacija

CAPS

-25%** nuo 6,74 €

Ta pati kokybė. Dabar ir kapsulėse.

Yra maisto papildų, kurie tiesiog papildo. Ir yra maisto papildai, kurie turi kilmę, istoriją ir mokslinį pagrindą. „Biofarmacija“ jau 15 metų kuria produktus, paremtus viena aiškia idėja – organizmui suteikti tik tai, ko jam iš tiesų reikia, be jokių perteklinių priedų, be kompromisų dėl kokybės.

Pristatome naują liniją – „Biofarmacija CAPS“, maisto papildus kapsulių forma, sukurtus tiems, kurie nori patogumo, bet neketina atsisakyti grynumo.

Naujos linijos asortimente – septyni produktai, iš kurių galite išsirinkti sau tinkamą: **nervų sistemai ir psichologinei funkcijai** (magnio bisglicinatas); **streso suvaldymui, emocinei pusiausvyrai ir miego kokybei** (patentuotas grynas ašvagandų šaknų ekstraktas, rodiolės ir valerijono ekstraktai); **imunitetui** (cinkas, liposominis vitaminas D, vitaminas C iš erškėtuogių ekstrakto).



Mineralai iš Negyvosios jūros

Biofarmacija CAPS išskirtinumai

- Be užpildų, rišiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių.
- Tik aktyviosios medžiagos ir augalinės kilmės kapsulės apvalkalas.
- Maksimaliai švari ir atsakingai sukurta sudėtis.
- Patogi vartoti forma kasdienai ir kelionėms.
- Premium lizdinė pakuotė papildomai apsaugai ir higienai.

**** Pasiūlymo ieškokite didžiosiose vaistinėse.**

MAISTO PAPILDAI



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

-30% nuo 22,95 €

FEMARELLE®
linija



Maisto papildai, 56 kapsulės
„FEMARELLE® REJUVENATE“. Gerai nuotaikai, odai ir nuovargio mažinimui. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B2 ir biotino.
„FEMARELLE® RECHARGE“. Hormonų veiklos palaikymui ir normaliai savijautai menopauzės metu. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ir sėjamųjų linų sėmenų ekstraktų, vitamino B6.
„FEMARELLE® UNSTOPPABLE“. Moterims po menopauzės normaliai kaulų būklei palaikyti. Sudėtyje yra gauruotųjų sojų ekstrakto, kalcio, biotino, vitaminų D ir B2.

-40% nuo 9,57 €

Vyrų sveikatai

FOMAN®
FOMAN®UP SHOTS





Maisto papildas, 30 kapsulių
„FOMAN“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyriškosioms funkcijoms: prostatos, šlapimo sistemos, reprodukcinei. Išskirtinėje „FOMAN“ sudėtyje yra 4 kompleksiškai veikiantys elementai: gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią prostatos funkciją; fermentas proteazė papildo vyro mitybą; organinė seleno forma padeda palaikyti normalią spermatogenezę. Rekomenduojama suaugusiesiems gerti po 1-2 tabletes per dieną ne valgio metu.
„FOMAN®“ – „TECHNIŠKAI“ TVARKINGAM VYRUI.

Maisto papildas, 14 buteliukų po 25 ml
„FOMAN UP SHOTS“ – skirtas seksualiai aktyviems vyrams. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė, pritaikyta vyrų lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai. Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti peruvinė pipirnė (maca). Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti gulsčioji ragužė. Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje taip pat yra taurino (natūralios amino rūgšties).
TURBO REŽIMAS TAVO VYRIŠKUMUI!

iki -40% nuo 4,13 €

SALVIASEPT

NAUJIENA



Medicinos priemonės, purškalas, 20 ml, 12 pastilių, 6 ledinukai, 30 čiulpiamųjų pastilių
Medicinos priemonė „SALVIASEPT SPRAY“ padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei perštėjimą. Skirtas suaugusiesiems ir vaikams nuo 7 metų. Medicinos priemonė „SALVIASEPT SPRAY KIDS“ padeda sumažinti bakterijų ir virusų sukeltą gerklės uždegimą bei perštėjimą. Priemonė drėkina ir ramina sudirgusią gerklės ir burnos ertmės gleivinę. Vaikams nuo 2 m. „SALVIASEPT ACUT“ be cukraus padengia gerklės gleivinę apsaugine plėvele, o sudėtyje esančios sidabro nanodalelės apriboja mikroorganizmų plitimą. „SALVIASEPT ACUT“ su medumi malšina gerklės uždegimą, burnos ertmės uždegimą, tonzilių uždegimą, skausmą pašalinus tonziles. Medicinos priemonė malšina uždegimą, lydintį gerklės sudirginimą, kuris pasireiškia skausmu, deginimu, išsausėjimo jausmu ir sunkumu ryjant. Be to, susidariusi plėvelė apsaugo nuo kenksmingos išorinių veiksnių (tokių kaip šaltas oras) įtakos, padėdama gleivinei atgauti jos pirminę apsauginę funkciją. Pastilės sudrėkina ir atgaivina burnos ertmės bei gerklės gleivinę. „SALVIASEPT KIDS“ ledinukai gerklei užtikrina gerklės uždegimo, gerklės skausmo, perštėjimo ir sausumo mažinimą bei rijimo palengvinimą. „SALVIASEPT KIDS“ ledinukai nuo kosulio su islandinės kerpės, vaistinių svilaražių šaknų ir čiobrelių ekstraktais. Sušvelnina kosulį, sumažina kosulio dažnį, lengvina atsikosėjimą. „SALVIASEPT VOCAL“ rekomenduojama vartoti: užkimus; esant sausai ir sudirgusiai gerklei; kenčiant nuo sauso, nuolatinio kosulio; būnant sausose, šildomose ar kondicionuojamose patalpose; jeigu reikia nuolatos įtempti balso stygas – žmonėms, kurie profesionaliai naudojasi savo balsu, pavyzdžiui, mokytojams, dėstytojams, dainininkams, laidų vedėjams; patiriant cigarečių dūmų poveikį;kaip pagalbinė priemonė peršalus ir esant nestipriam gerklės skausmui.





Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

1+1 Pirkite 1, o gaukite 2

Geresnei savijautai kasdien

Vitaminas D kasdienai

1+1 nuo 4,35 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

„Oilesen D₃" su juodųjų ikrų aliejumi, 40 kapsulių. Vienoje kapsulėje – net 4000 TV vitamino D, ištirpinto juodųjų ikrų aliejuje.

„Oilesen D₃ 400", 10 ml. Viename laše yra 400 TV vitamino D, ištirpinto ypač tyrame alyvuogių aliejuje. Tinka kūdikiams.

„Oilesen D₃+K₂" su kanapių aliejumi, 60 kapsulių. Itin vertinga sudėtis gerai savijautai: sinergiškai veikiančių vit. D3 (4000 TV) ir vit. K2 (75 mcg) derinys su 500 mg kanapių sėklų aliejaus.



Daugiau vitamino D su „Oilesen D3"!

Žarnyno mikroflorai

1+1 nuo 10,39 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

„Bifoval® Forte", 15 kapsulių. 5 milijardai *Lacto* ir *Bifido* bakterijų.

„Bifoval® Babe", 25 kramtomosios tabletės. Braškių skonio kramtomos tabletės, kurių sudėtyje yra 4 rūšių *Lacto* ir *Bifido* bakterijų kompleksas. Vaikams nuo 3 metų.



Stipriam imunitetui

1+1 19,89 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

„Imunital FORTE+", 30 kapsulių. Didelės vitaminų D, C ir cinko dozės vienoje kapsulėje su vertingais beta gliukanais ir augaliniais ekstraktais. Komponentai veikdami kartu padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą [1], apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos [2] bei mažinti nuovargį [3].



Sveikai širdžiai

1+1 11,39 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

„Cardoval Ritmo", 30 kapsulių. Trejopo poveikio maisto papildas skirtas ritmingam širdies darbui, kraujagyslėms [4], nervų sistemai [5]. Tai viskas, ko reikia jūsų širdžiai – gudobelė, česnakas, magnis, vitaminai B1 ir B6.



Maisto papildai. [1] Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninę sistemą. [2] Dažinė ciberžolė padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. [3] Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir padeda mažinti pavargimo jausmą. [4] Gudobelė ir česnakas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. [5] Vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei energijos apykaitą. [6] Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų" kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

1+1 Pirkite 1, o gaukite 2

Geresnei savijautai kasdien

Atminčiai ir protinei veiklai

1+1 nuo 3,84 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

„HypnoZAN Express“, 30 čiulpiamų tablečių. Čiulpiamos tabletės su melatonino ir fitoterapinių medžiagų deriniu leidžia greičiau užmigti [6].

„HypnoZAN“, 20 kapsulių. Padeda greičiau užmigti [6], palaikyti normalų miegą bei psichinę sveikatą ir padeda atsipalaiduoti.

„ValeroZAN Drops“ 50 ml. Geriamasis tirpalas nervų sistemos veiklai, psichinei sveikatai [7] ir atsipalaidavimui [8].

„ValeroZAN“, 60 tablečių. Padeda atsipalaiduoti, palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir miego kokybę [9].



„Zan“ - įkvėpk... iškvėpk“

Nuotaikai, ramybei, miegui

1+1 nuo 8,99 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

„Neuromed Good Mood“, 15 kapsulių. Su šafranu – gerai nuotaikai, psichologinei funkcijai, nuovargiui mažinti [5].
„Neuromed Relax“, 15 kapsulių. Streso kontrolei ir nervų sistemai [9].
„Neuromed Sleep“, 15 čiulpiamų tablečių. Čiulpiamos tabletės su melatoninu greitam užmigimui bei ramiam miegui [6].



Atsipalaidavimui

1+1 7,89 €

Perkant prekę, antra tokia pati – tik 0,01 €

„Rameval“, 15 kapsulių. Jaučiantiems lengvą nervinę įtampą. Padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią nervų sistemos būklę, miego kokybę [9].

Tinka vaikams nuo 5 metų!



Moterų sveikatai

1+1 nuo 9,79 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

„Difolin“, 60 tablečių. Planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms moterims: folio rūgštis + vitaminas D3. Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį [10]. **„Difolin+“,** 30 tablečių. Hemoglobinui, energijai, nervams, imunitetui [11]. Mikrokapsuliuota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12, D3, C ir varis.



Maisto papildai. [7] Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią psichinę būklę. [8] Vaistinės melisos ir pipirinės mėtos padeda atsipalaiduoti. [9] Paprastieji apyniai padeda palaikyti normalų užmigimą ir normalią nervų sistemos veiklą. [10] Mažas folatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 μSg folio rūgšties ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja ląstelių dalijimosi procese. [11] Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, geležis – hemoglobino susidarymą, folatai – kraujodarą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis – nervų sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 – energijos apykaitą.



Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

-40% nuo 41,33€

Kvėpavimo takams

INGENCARE®

VP-M11 tinklinis inhaliatorius
VP-D2 kompresorinis inhaliatorius



Medicinos priemonės
„INGENCARE“ inhaliatoriai skirti naudoti peršalus ar sergant kvėpavimo takų ligomis. Inhaliatoriaus pagalba naudojamas tirpalas paverčiamas aerozoliu, kurį lengva įkvėpti. „INGENCARE“ inhaliatorius dėl komplektuose esančių dviejų tipų kaukių galima naudoti tiek vaikams, tiek suaugusiems. „INGENCARE VP-D2“ kompresorinis inhaliatorius – naujos kartos mažas, tylus ir patogus prietaisas, skirtas naudojimui namuose. „INGENCARE VP-M11“ tinklinis inhaliatorius sujungia ultragarso ir kompresorinių prietaisų privalumus. Šis inhaliatorius dirba beveik be garso, yra labai lengvas, juo patogu naudotis ne tik namuose, bet ir darbe ar keliaujant. Prietaisą galima pakreipti kampu ir procedūrą atlikti patogiai gulint.

KVĖPAVIMUI BE KLIŪČIŲ!

iki -20%** nuo 14,44 €

ECOSH



Maisto papildai, 90 veganinių kapsulių
„ECOSH“ – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

„ECOSH“ – VEDAMI GAMTOS.

**Akcija taikoma tik pažymėtoms prekėms.

-30% nuo 13,96 €

WALMARK® BIORYTHM™



Maisto papildai, 30 kapsulių
„BIORYTHM“ – inovatyvios formos maisto papildų linija su lėto atpalaidavimo mikrogranulėmis, kurios išskiria maistingąsias medžiagas iki 8 valandų per dieną. Palyginti su įprastomis tabletėmis ar kapsulėmis, šie papildai pasižymi didesniu biologiniu prieinamumu – medžiagos įsisavinamos žarnyne palaipsniui. „BIORYTHM“ maisto papildų linją sudaro 6 produktai – ašvaganda (migdomosios vitaminos), cinkas 15 mg, geležis 28 mg, vitaminas B12 Max, selenas 100 µG ir magnis su vitaminu B6. 2603_SB_Biorythm_V01_LT

„BIORYTHM“ – INOVATYVI PRAILGINTO VEIKIMO LINIJA!

-40% nuo 32,99 €

INOLAB

JEUNESSE NMN I SPN



Maisto papildai, 30 kapsulių, 28 buteliukai po 25 ml
„INOLAB“ – sukurtas Šveicarijoje, pasižymintis sinerginiu sudedamųjų medžiagų poveikiu. „INOLAB JEUNESSE NMN | SPN“ sudėtyje esantis NMN (nikotinamido mononukleotidas) yra natūrali medžiaga, iš kurios mūsų organizmas gali pasigaminti NAD+.[1] NAD+ molekulė (nikotinamidas) yra atsakinga už energijos gamybą. Spermidinas (SPN) yra reikalingas audinių regeneracijai, ląstelių dauginimuisi ir ląstelių augimui. Cinkas padeda palaikyti normalią DNR sintezę, odos būklę.

[1]Shade 2020.
Ieškokite didžiosiose vaistinėse.

-35% nuo 18,58€

Cukraus kiekiui reguliuoti

MULBERRY™ SUGAR CUT™

BERBERINE



Maisto papildai, 60 tablečių
Labai svarbu, kad cukraus kiekis kraujyje būtų normalus. Deja, daug žmonių nežino, kad jų gliukozės kiekis kraujyje yra nuolat padidėjęs. „MULBERRY™“ ir „SUGAR CUT™ BERBERINE“ maisto papildiuose esančios medžiagos padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą ir gliukozės koncentraciją kraujyje. Šilkmedžių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme, o chromas – normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.

PALAIKYKITE NORMALŲ CUKRAUS KIEKĮ KRAUJYJE!

-30% nuo 10,70 €

Šlapimo sistemai

URINAL®



Maisto papildai, 10 tablečių, 30 kapsulių, 60 guminukų
„URINAL CRANBERRY GUMMIES“ – guminukai, kurių sudėtyje yra proantocianidinų (18 mg PAC viename guminuke). Tinka visai šeimai. Vaikams nuo 3 metų.
„URINAL AKUT“– unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.
„URINAL“ – sudarytas iš unikalios maistinių medžiagų kombinacijos: džiovintų spanguolių *(Vaccinium macrocarpon)* sulčių koncentrato, didelės koncentracijos spanguolių *(Vaccinium macrocarpon)* sulčių ekstrakto – „ExoCyan TM“, paprastųjų rykštenių *(Solidago virgaurea)* ekstrakto ir vitamino D. 2601_SB_Urinal_V01_LT.

DEGINIMO POJŪTIS? NELAUKITE IR VEIKITE IŠKART!



Medicinos priemonė, 14 tablečių
„URINAL D-MANNOSE 2000 mg“ – padeda išvengti pasikartojančių šlapimo takų infekcijų ar cistito, kuriuos sukelia bakterija *E.coli*. Pagalbinė priemonė gydant šlapimo takų infekcijas.

-30% nuo 12,21 €

Imunitetui ir gerai savijautai

NEW NORDIC MULTIVITAMINAI



Maisto papildai, 60 tablečių, 90 tablečių, 120 tablečių
Skandinavų bendrovės „New Nordic“ multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. „MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN“ – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir grožiu. „MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN 55+“ – vyresnių moterų organizmo poreikiams. „MULTIVITAMIN PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMAN“ – besilaukiančioms moterims ir žindyvėms. „MULTIVITAMIN ACTIVE MAN“ ir „MULTIVITAMIN ACTIVE MAN ENERGY BOOST“ – vyrams. Multivitaminų sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!



Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

TIK „CAMELIA“

-40% 3.59 € 5.98 €



Kvėpavimo takams, gerklei
VIVAVIT ČIOBRELIŲ IR SVILARŽIŲ
ekstraktų tirpalas

Maisto papildas, tirpalas, 100 ml
Tirpalo sudėtyje esantys čiobrelių ir svilarožių ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Čiobrelio ekstraktas taip pat padeda palaikyti normalią imunines sistemos funkciją.
TRADICIJOMIS PAREMTA SUDĖTIS – KVĖPAVIMO TAKAMS!

8.48 €



Raumenų ir sąnarių skausmui malšinti
Kapsikam®

Nereceptinis vaistinis preparatas, tepalas, 50 g
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. Indikacijos: vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: ant skaudamos vietos, naudojant aplikatorių, užtepama 1–3 g tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildantį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. Specialūs įspėjimai: nerekomenduojama naudoti karštų procedūrų (pirties, vonios ir kt.) prieš ar iš karto po „Kapsikam“ pavartojimo. „Kapsikam“ tepalo negalima tepti ant pažeistos odos, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų.*Reklamos teksto parengimo data: 2026-10-10.
MANO JĖGA JUDĖJIME!

---

nuo 5.83 €

Venų ligoms gydyti
TROXEVASIN®
300 mg, 50 kietųjų kapsulių 12.53 €
2 % gelis, 40 g 5.83 €
2 % gelis, 100 g 11.00 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Viename grame gelio yra 20 mg trokserutino. Indikacijos: lėtinio venų nepakankamumo simptomų (kojų skausmo, sunkumo, patinimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „TROXEVASIN“ kapsulės: rekomenduojama pradinė dozė suaugusiems – 600 mg (2 kapsulės) per parą tolygiais intervalais. Gydoma, kol išnyksta edema ir kiti simptomai, dažniausiai 2 sav. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2-4 sav. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsules reikėtų vartoti valgio metu, nes jos gali sukelti dispepsijos simptomus. „TROXEVASIN“ gelis: suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu gelio kiekiu ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Gydymo geliu veiksmingumas daugiausia priklauso nuo vaistinio preparato dozės, vartojimo reguliarumo ir trukmės (patariama vartoti ilgai). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „TROXEVASIN“ kapsulių reikia atsargiai vartoti kepenų nepakankamumu ar tulžies apytakos sutrikimu sergantiems pacientams. Vaistinis preparatas neveiksmingas gydant edemas, atsiradusias dėl kepenų, inkstų ar širdies-kraujagyslių sistemos ligų. Vaikams iki 18 metų trokserutino vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sudėtyje esantis saulėlydžio geltonasis FCF (E110) gali sukelti alerginių reakcijų. „TROXEVASIN“ gelį galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris gali sudirginti odą. Nesitikima, kad vartojimas nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti susijęs su žalingu poveikiu motinai, kadangi benzalkonio chlorido absorbcija per odą yra minimali. Tekstų peržiūros data: 2024-11-13.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-07-15. TROX-LT-00033

36.02 €



Svoriui mažinti
ORLISTAT POLPHARMA

Nereceptinis vaistinis preparatas, 42 kapsulės
Veikliojі medžiaga, stiprumas: orlistatas, 60 mg. Indikacijos: „ORLISTAT POLPHARMA“ yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥ 28 kg / m2) suaugusiems žmonėms svoriui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloringumo ir sumažinto riebalų kiekio dietos. „ORLISTAT POLPHARMA“ gali būti vartojama prieš pat valgį, valgant arba ne vėliau kaip praėjus valandai po valgio. Kapsulė turi būti nuryjama užgeriant ją vandeniu. Suaugusiems rekomenduojama dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne daugiau kaip tris 60 mg kapsules. Gydymo trukmė turi neviršyti 6 mėnesių. Dieta ir fiziniai pratimai yra svarbios svorio mažinimo programos sudedamosios dalys. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais antikoaguliantais. Specialūs įspėjimai: pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti viršškinimo trakto veiklos sutrikimai. Gydymas orlistatu gali sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją. Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantys asmenys, vartojantys amjodaroną, levotiroksiną, preparatus hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, prieš pradėdami gydymą „ORLISTAT POLPHARMA“ turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. * Reklamos teksto parengimo data: 2026-06-02.
SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI!

15.11 €

Nuo lūpų pūslelinės
ACIC
200 mg tabletės



Nereceptinis vaistinis preparatas, 25 tabletės
Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 200 mg acikloviro. Indikacijos: anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po vieną tabletę 5 kartus per parą kas 4 val. Gydymo trukmė – 5 paros. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: po viruso pažeistos vietos palietimo, reikia tuoj pat nusiplauti rankas. BS2601069662.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.
UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ IŠ VIDAUS!

5.47 €

ACIC 5 % kremas



Nereceptinis vaistinis preparatas, kremas, 2 g
Veikliojі medžiaga, stiprumas: 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. Indikacijos: odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia *Herpes simplex* virusas, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kuriems pagalbinėms medžiagoms. Netepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). Specialūs įspėjimai: vaisto draudžiama nuryti. BS2601069662.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-01-06.
UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

---

nuo 4.81 €

Nuo alergijos
OPEXA® 20 mg
10 tablečių 4.81 €
10 burnoje disperguojamųjų tablečių 4.95 €



Nereceptiniai vaistiniai preparatai
Veikliojі medžiaga, stiprumas: bilastinas, 20 mg. Indikacijos: „OPEXA“ vartojamas šienligės (kuriai būdingi simptomai yra čiaudulys, niežulys, sloga, užgulta nosis, paraudusios ir ašarojančios akys) ir kitų alerginio rinito formų simptomų slopinimui. Jis taip pat gali būti vartojamas niežtinčių odos išbėrimų (pūslių arba dilgėlinės) gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė suaugusiesiems, įskaitant senyvus žmones ir 12 metų bei vyresnius paauglius, yra 1 tabletė (20 mg) per dieną. Tabletę reikia nuryti nevalgius, vieną valandą prieš valgį arba sulčių gėrimą arba praėjus dviem valandoms po valgymo arba sulčių gėrimo. Kontraindikacijos: „OPEXA“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija bilastinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei Jums nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, mažas kalio, magnio, kalcio kiekis kraujyje, jeigu Jums pasireiškia arba pasireiškė širdies ritmo sutrikimų, arba Jūsų širdies susitraukimų dažnis yra labai mažas, jeigu vartojate vaistų, galinčių paveikti širdies ritmą, jeigu Jums yra arba buvo tam tikrų širdies ritmo sutrikimų (vadinamasis QTc intervalo pailgėjimas elektrokardiogramoje), kurie gali pasireikšti sergant kai kuriomis širdies ligų formomis, ir vartojate kitus vaistus. Neduokite šio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršykite rekomenduojamos dozės. Gydymo trukmė priklauso nuo Jūsų ligos simptomų, trukmės ir eigos. Nevartokite „OPEXA“ ilgiau nei 10 dienų nepasikonsultavę su gydytoju. Jei po 3 dienų Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.* Reklamos teksto parengimo data: 2025-06-15. LT-OPE-2-2025_MFLOW_pharma.
SUTRAMDYK ALERGIJĄ!

-25% nuo 11.36 €

ALPECIN PLANTUR



Kosmetika, plaukų šampūnai, 200 ml, 250 ml , plaukų šaknų tonikas, 200 ml, plaukų kondicionierius 150 ml
„ALPECIN“ šampūnas papildytas kofeino kompleksu. Stiprina plaukų šaknis. Kasdien trenkant galvą šampūnu „ALPECIN“, plaukų šaknys gauna aktyvinančios medžiagos.
„PLANTUR 39“ šampūnas su aktyviu kofeino kompleksu, fitoflavonais, kviečių ekstraktu ir provitaminu B5.



*Nuolaidos netaikomos vaistams perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

nuo **5⁸⁸ €**

BEPANTHEN®

50 mg /g, kremas **5⁸⁸ €**
50 mg /g, tepalas **5⁸⁸ €**
PLUS, 50 mg/5 mg /g, kremas **6²⁹ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai, 30 g

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „BEPANTHEN®“ kremo ir tepalo yra 50 mg dekspantenolio; 1 g „BEPANTHEN® PLUS“ kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Indikacijos: „BEPANTHEN®“ kremas ir tepalas: įvairios kilmės paviršinių odos ir gleivinių pažeidimų pagalbinis gydymas drėkinant odą ir atkuriant epidermio barjerą, palaikant epitelizaciją su atitinkamu uždegimo malšinamuoju ir niežėjimą mažinančiu poveikiu, pvz., nedideliems pažeidimams (nedideliems nudegimams arba nubrozdinimams), odos sudirgimams, išbėrimui nuo sauskelnių, skausmingiems ir įtrūkusiems speneliams gydyti. „BEPANTHEN® PLUS“ kremas: lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz., nubrozdinimų, įpjovimų, įbrėžimų, odos įtrūkių, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: „BEPANTHEN®“ kremas ir tepalas: pažeistą odą tepti plonu sluoksniu preparato 1 ar daugiau kartų per dieną, kai reikia. Skausmingus ir įtrūkusius spenelius tepti po kiekvieno maitinimo, prieš žindant nuplauti. Tepti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes, prieš tai odą reikia kuo kruopščiau nuvalyti. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. „BEPANTHEN® PLUS“ kremas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems išvalytą žaizdą arba pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu 1 arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. Kontraindikacijos: „BEPANTHEN®“ kremas ir tepalas: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. „BEPANTHEN® PLUS“ kremas: alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkęs ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „BEPANTHEN®“ kremas ir tepalas: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant tepalą ar kremą reikia vengti kontakto su akimis. „BEPANTHEN® PLUS“ kremas: saugokitės, kad kremo nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsdami nutraukite ir pasitarkite su gydytoju. *Reklamos teksto parengimo data 2025-11-02. CH-20251104-84

LAIMEI, YRA „BEPANTHEN“®. GYDO IR APSAUGO ODĄ.

iki **-25%** nuo **13³¹ €**



BEPANTHEN®

ANTI-EXEM kremas

Medicinos priemonė, 50 g

Kliniškai patikrintas kremas be hormonų slopina atopinės egzemos (atopinio dermatito), odos išsausėjimo sukeltą niežėjimą ir paraudimą, atstato apsauginį odos barjerą. Numalšina odos niežėjimą vos per 30 minučių, poveikis išlieka mažiausiai 7 valandas. Kremą galima vartoti tiek gydymo hormoniniais preparatais, tiek pertraukų tarp hormoninio gydymo metu. Tinka kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, odai apie akis.



BEPANTHEN®

SENSICONTROL® prausimosi gelis, kremas

Kosmetika, kremas, 200 ml; gelis, 400 ml

„BEPANTHEN SENSICONTROL®“ – kasdienis prausimosi gelis jautriai ir į egzemą linkusiai odai. Nuramina, drėkina odą, prisitaiko prie jūsų odos pH, saugo natūralų odos barjerą ir mikrobiomą. Sudėtyje yra provitamino B5 ir prebiotikų. Tinka visai šeimai.

„BEPANTHEN SENSICONTROL®“ – kremas, skirtas jautriai, atopinei, į egzemą linkusiai odai. Kliniškai patikrinta „Derma-Defense“ formulė, papildyta prebiotiku, suteikia kasdienę odos apsaugą: palaiko odos apsauginę mikroflorą, stiprina odos barjerinę funkciją, užtikrina ilgalaikį, iki 24 val. trunkantį, drėkinimą ir padeda raminti sausą, niežtinčią odą. Greitai įsigeriantis kremas tinka kūnui, veidui ir akių vokams. Tinka visai šeimai. CH-20261016-46

„BEPANTHEN®“ PRODUKTŲ LINIJA Į EGZEMĄ LINKUSIAI ODAI!

-50% nuo **1⁷² €**

BORO PLUS



Kosmetikos priemonės, kremai, 25 ml, 50 ml, lūpų balzamai, 10 ml

Drėkinamasis lūpų balzamas sausoms ir susikeldėjusioms lūpoms. Sudėtyje esantys 4 aliejai ir žolelės užtikrina visapusišką lūpų priežiūrą. Drėkinantis „BORO PLUS“ kremas su augalų ekstraktais suteikia odai glotnumo, drėkina, saugo odą nuo išsausėjimo.

-25% nuo **7⁴²€**

Odos priežiūrai

DERMATONICS



Medicinos priemonės, 60 ml

„DERMATONICS ITCH RELIEF CREAM“ – nuramina sudirgintą odą, efektyviai sumažina niežėjimą, todėl gali būti siūlomas kaip alternatyva atopiniu dermatitu sergantiems žmonėms. Unikali sudėtis – kremo formulėje yra 3% koloidinių avižinių dribsnių ir 5% šlapalo.

„DERMATONICS DRY SKIN BALM“ – greitai ir itin efektyviai pagerina odos drėkinimą ir bendrą būklę. Jo sudėtyje yra 10% karbamido ir kitų palaikomųjų emolientų. Tinka kūno, rankų ir pėdų drėkinimui. Tinka žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu.

„DERMATONICS ONCE HEEL BALM“ – sausai, šiurkščiai, suragėjusiai kulnų ir padų odai. Produkto sudėtyje yra 25% urea (šlapalo), kuris veikia kaip drėkiklis, sulaiko vandenį raginiame sluoksnyje, padeda šalinti negyvybingas odos ląsteles. Pakanka naudoti kartą per dieną. Matomas rezultatas po 24 val.

-30% nuo **15¹⁸€**

NIZORAL®

CARE



NAUJIENA

Kosmetika, šampūnas, 200 ml

„NIZORAL® CARE“ šampūnas sausai ir jautriai galvos odai. Labai sausai, pleiskanojančiai, jautriai galvos odai.
„NIZORAL® CARE“ šampūnas riebiai galvos odai ir plaukams. Valo galvos odą, šalina pleiskanas, mažina niežėjimą.
„NIZORAL® CARE KERATO PSO“ šampūnas su įkapsuliuota salicilo rūgštimi švelniai, bet veiksmingai puoselėja sausą galvos odą.
2608_SB_Nizoral_V01_LT

„NIZORAL®“ – SVEIKAI GALVOS ODAI IR GRAŽIEMS PLAUKAMS!

nuo **10⁹⁸ €**

NICORETTE®

FRESHFRUIT 4 mg vaistinė kramtomoji guma, 30 vnt. **10⁹⁸ €**
INVISIPATCH, 25 mg/16 h, transderminis pleistras, 7 vnt. **23⁷² €**
COOLMINT, 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 150 išpurškimų **23¹⁰ €**



Nereceptiniai vaistiniai preparatai

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje vaistinėje kramtomoje gumoje yra 4 mg nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra 39,37 mg nikotino; kiekviename išpurškime (0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. Indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus - mesti rūkyti. Purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. „NICORETTE COOLMINT“ geriausia vartoti kartu su elgesio palaikymo programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Daugiau kaip 24 vaistinių kramtomųjų gumų per dieną vartoti negalima. Pleistrą reikia priklijuoti ant odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 ipurškimų per valandą. Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimus iš karto, per 24 valandas neviršyti 64 ipurškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vaistinės gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams arba nerūkantiems pacientams. Specialūs įspėjimai: prieš vartodami „NICORETTE“, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertiroze, viršikinimo trakto ligomis, anksčiau yra pasireiškę traukuliai. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklijuokite „NICORETTE“ pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomosios gumos ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomosios gumos sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius.* Reklamos teksto parengimo data: 2026-09-10. LT-NIC-2026-356630.

SUKURTA TAM, KAD PADĖTŲ MESTI RŪKYTI.

iki **-35%** nuo **22⁰¹ €**

B.WELL

WF-4000 bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras ~~31⁴⁵~~ **22⁰¹ €**
PRO-25 automatinis kraujospūdžio matuoklis su 3AVG technologija ~~49²⁹~~ **32⁹⁴ €**
MED-130 kompresorinis inhaliatorius ~~53⁹⁰~~ **35⁰¹ €**



Šveicarijos gamintojas „B.Well Swiss“ kuria patikimus ir kliniškai patikrintus sveikatos priežiūros produktus, skirtus naudoti gydymo įstaigose bei namuose. Asortimente esantis automatinis kraujospūdžio matuoklis „PRO-25“ apskaičiuoja 3 paskutinių matavimų vidurkį, todėl padeda tiksliau įvertinti kraujospūdžio rodiklius, o kompresorinis inhaliatorius „Med-130“ užtikrina efektyvią inhaliacinę terapiją vaikams ir suaugusiesiems. „B.Well Swiss“ gaminiai pasižymi aukštais kokybės standartais, moderniomis technologijomis ir yra sukurti patogiai sveikatos priežiūrai visai šeimai. Visiems gaminiams suteikiama 2 metų garantija.
Akcija taikoma tik pažymėtoms prekėms.



*Nuolaidos netaikomos vaistams ir medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

CAMELIA VAISTINĖ

KŪNO IR PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS

-30%

Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų kūno ar plaukų priežiūros priemonių. Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 11 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

CECE MED
plaukų priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

po **8**01 €

CECE MED STOP HAIR LOSS
Šampūnas, kondicionierius, 300 ml



nuo **5**10 €

CECE MED STOP HAIR LOSS
Ampulės plaukams, 5 vnt. po 7 ml, 30 vnt. po 7 ml



nuo **6**92 €

CECE MED SILK
Losjonas galvos odai, plaukų kaukė, 75 ml, 200 ml



DELIA
kūno ir plaukų priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

139 € 1.99 €

DELIA ARGAN CARE
Rankų kremas su arganų aliejumi, 50 ml



po **3**35 €

DELIA CAMELEO EXPERT GROW STRONG
Kondicionierius, šampūnas, 300 ml



po **4**89 €

DELIA FOREST BLEND MOISTURIZING
Kūno losjonai, 300 ml



EVOLUDERM
kūno ir plaukų priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

419 € 5.99 €

EVOLUDERM
Aliejus odai su saldžiųjų migdolų aliejumi, 100 ml



nuo **2**44 €

EVOLUDERM DELICE DE KARITE
Šampūnas, kondicionierius, 400 ml, 200 ml



po **3**49 €

EVOLUDERM DELICE DE KARITE PLUIE DE COCO
Dušo želė, 500 ml



HELIA-D
plaukų priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

po **8**39 €

HELIA-D PLEX ACTIVE BOND REBUILD
Plaukų priemonės, 280 ml



783 € 11.19 €

HELIA-D PLEX ACTIVE PREPARING TONER
Plaukų tonikas, 110 ml



nuo **7**34 €

HELIA-D PLEX ACTIVE
Plaukų aliejus, serumas, 50 ml, 30 ml



JOANNA
kūno ir plaukų priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

po **1**60 €

JOANNA NATURIA BODY
Rankų kremai, 100 g



po **1**88 €

JOANNA TRADITIONAL RECIPES
Šampūnai, kondicionieriai, 300 ml, 300 g



279 € 3.99 €

JOANNA JEDWAB SILK
Šukavimą lengvinantis plaukų purškiklis, 150 ml





Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

BIODERMA
ATODERM, CICABIO kūno priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo **5,94 €**



Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš grynų veikliųjų medžiagų, atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje.
„NAOS“ EKOBIOLOGIJA – DERMATOLOGIJOS ESMĖ.

NOUGHTY
plaukų priežiūros priemonėms

-40%

nuo **7,13 €**



Atkurk plaukų pusiausvyrą su „NOUGHTY“ šampūnais ir kondicionieriais. Kiekvienas buteliukas kupinas natūralių gerųjų medžiagų. Sintetinės sudėtinės dalys pakeistos natūraliais ingredientais, kurie pasižymi itin veiksmingomis savybėmis ir duoda puikius rezultatus.

NEUTROGENA
veido ir kūno priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo **3,42 €**



„NEUTROGENA®“ – inovatyvūs sprendimai Jūsų odos priežiūrai. „NEUTROGENA® HYDRO BOOST“ inovatyvios formulės dėka gali drėkinti odą visą dieną. „NEUTROGENA®“ norvegiškosios formulės produktai gali raminti sausą ir sudirgusią odą ir atkurti drėgmės lygį, gali suteikti puikios savijautos pojūtį.
„NEUTROGENA®“ – TINKAMAI ODOS PRIEŽIŪRAI.

BABÉ BODY
kūno priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo **6,15 €**



Kūno higienai ir odos drėkinimui skirti produktai, kurių sudėtyje yra rūpestingai atrinktų veikliųjų medžiagų. Prižiūri ir saugo odą. Specialios priemonės, skirtos tokioms problemoms, kaip odos sausumas, gausus prakaitavimas ar jautri oda, spręsti.

EUCERIN®
ATOPICONTROL, AQUAPHOR kūno priežiūros priemonėms

-30%*

*perkant bent 2 prekes

nuo **7,59 €**



„EUCERIN ATOPICONTROL“ – veido ir kūno priežiūros priemonės labai sausai, į atopiją linkusiai odai. „EUCERIN AQUAPHOR“ tepalas – sausos, šiurkščios, skilinėjančios odos priežiūrai.



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

-30%* nuo 12,56 €

*perkant bent 2 prekes

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR



Kosmetika, 400 ml
„LIPIKAR“ linija specialiai sukurta sausai, labai sausai, jautriai ir į atopinį dermatitą linkusiai odai. Produktai gali padėti raminti, giliai drėkinti odą, palaikyti apsauginį odos barjerą ir balansuoti jos mikrobiomą.

-30%* nuo 14,62 €

*perkant bent 2 prekes

VICHY MINERAL 89

veido priežiūros priemonės ir dezodorantai



Kosmetika, 50 ml
„MINÉRAL 89“ gali padėti palaikyti odos barjerinę funkciją ir užtikrinti intensyvų odos drėkinimą. Pagrindinio linijos produkto – serumo „MINÉRAL 89 HYALURONIC ACID SERUM“ – sudėtyje yra grynos hialurono rūgšties ir 89 % Vichy vulkaninio vandens su 15 svarbių mineralų. Šios minimalistinės, tačiau stipraus poveikio sudėties serumas rūpinasi oda, kad ji atrodytų pilnesnė, o smulkios raukšlelės – mažiau matomos. Be to, šios priemonės padeda saugoti nuo žalingo kasdienio aplinkos poveikio – taršos ir kitų dirgiklių. Oda atrodo sudrėkinta, daili ir atspari.
„VICHY DEO“ – priemonės gali apsaugoti nuo intensyvaus prakaitavimo ir nemalonaus kvapo.

GOLDEN ROSE

lūpų dekoratyvinei kosmetikai

1+1**

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €



GR GLOW KISS
Lūpų balzamas, 3 g
po 7,49 €



GR SENSATION
Lūpų blizgesys, 5,6 g
nuo 6,99 €



GR
Lūpų dažai, 4,2 g
nuo 4,99 €



GR MATTE CRAYON
Lūpų pieštukas
nuo 5,39 €



GR DREAM
Lūpų pieštukas
nuo 3,49 €

**Akcija galioja tik pažymėtoms prekėms.

1+1 nuo 3,94 €

Perkant prekę, antra tokia pati arba pigesnė – tik 0,01 €

AIMX®

Efektyvumas patvirtintas kliniškai



Nr. 1
lakštinės veido kaukės vaistinėse Lietuvoje*

*Lietuvos vaistinių rinkoje lakštinių kaukių kategorijoje 2026 m. sausio–birželio laikotarpiu – Nr.1 pagal pardavimų vertę eurais. Šaltinis: UAB „SoftDent“ farmacijos rinkos duomenų bazė PharmaZOOM



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

CAMELIA VAISTINĖ

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖMS

-30%

Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų burnos higienos priemonių. Visoms joms suteiksime 30% nuolaidą.



Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 11 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

ECODENTA
burnos higienos priemonėms

-25%

nuo **2,39 €**



„ECODENTA“ – TAVO NATŪRALIAI ŠYPSENAI!

NORDICS
burnos higienos priemonėms

-30%*

nuo **1,89 €**



*perkant bent 2 prekes

„NORDICS“ – tvari ir ekologijos standartais grįsta burnos higienos priemonių linija. Prekių ženklo misija yra paremta siekiu skatinti aplinkai draugišką gyvenimo būdą, atsižvelgiant į kasdienius įpročius.

BLEND-A-DENT
dantų protezų priežiūros priemonėms

-25%**

nuo **7,12 €**



Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą, saugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami „BLEND-A-DENT“ fiksuojamąjį kremą, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti. Geresnė ir ilgalaikė fiksacija, gaivus mėtų skonis, tačiau nepaveikiantis maisto skonio. Gali stiprinti emalį reikalingais mineralais.

STIPRI IR ILGALAIKĖ FIKSACIJA, TAD JŪS GALITE RAMIAI ŠYPSOTIS, KALBĖTI IR VALGYTI.

**Nuolaida netaikoma dviguboms pakuotėms.

JORDAN
burnos higienos priemonėms

-30%

nuo **1,32 €**



Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikalią jų valymo techniką, renkamės dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „JORDAN“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant turėti gerą dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių siūlus bei šepetėlius, dantų pastą suaugusiems ir vaikams.



Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų“ kortele.

CAMELIA VAISTINĖ

SENI, ABENA, TENA SLAUGOS PRIEMONĖMS

-25%

Perkant bent 2 prekes

Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų SENI, ABENA, TENA slaugos priemonių. Visoms joms suteiksime 25% nuolaidą.













Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 11 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Administracijos sprendimu pasiūlymas gali būti pratęstas arba pakeistas. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.

PRIREIKĖ SLAUGYTI ŠLAPIMO NELAIKANTĮ ARTIMĄJĮ IR NEŽINOTE, NUO KO PRADĖTI?

3 praktiniai patarimai, padėsiantys rasti atsakymus ir pasirinkti tinkamą priežiūrą

1 Parinkite sauskelnes, kurios užtikrintų patogumą, apsaugą nuo pratekėjimo ir neleistų atsirasti nemaloniam šlapimo kvapui namuose.

Parinkite pagal artimojo būklę tinkamo tipo sauskelnes:



Jei artimasis guli slaugos patale

„TENA Slip Maxi“ lipdukais užsegamos sauskelnės



Jei artimasis juda ribotai, bet gulėdamas dar gali pakelti savo svorį

„TENA Pants Maxi“ užmaunamosios kelnaitės

- Parinkite sauskelnių dydį pagal slaugomo asmens drabužių dydį: S, M, L arba XL.
- Rekomenduojama sauskelnes keisti 3 kartus per parą.
- Sauskelnės yra kompensuojamos. Dėl kompensavimo kreipkitės į slaugomo asmens šeimos gydytoją.

2 Pragulų profilaktikai naudokite specializuotą prausiamąjį kremą.

Tarpvietė, kirkšnys, sėdmenys – tai vietos, kuriose kaupiasi drėgmė ir greičiau vystosi dermatitas – pagrindinis pragulų rizikos veiksnys. Šiose vietose oda turi būti kruopščiai prižiūrima.



„TENA Wash Cream“ prausiamasis kremas

Kaskart keisdami sauskelnes naudokite specialiai šlapimo nelaikančių asmenų higienai skirtą „TENA“ prausiamąjį kremą, kuris valo, apsaugo ir drėkina lengvai pažeidžiamą odą.

Ant minkšto audinio išspaudę kremo, kruopščiai valykite tarpvietės odą iš priekio nugaros link. Nuplauti vandeniu nebereikia – tiesiog uždėkite naujas švarias sauskelnes.

3 Ligoniui lovoje prausti naudokite slaugos higienos priemones.

Slaugomas asmuo nori jaustis švariai, bet prausimas slaugos patale dažnai tampa iššūkiu artimiesiems. Yra specialių priemonių, palengvinančių ligonio prausimą lovoje.



„TENA Wet Wash Gloves“ drėgnosios prausimo pirštinės

Iš anksto sudrėkintos pirštinės skirtos visam kūnui prausti. Nereikia naudoti vandens ir muilo.
Pakuotę galima pašildyti mikrobangų krosnelėje ar ant radiatoriaus, kad ligoniui būtų komfortiškiau.



„TENA Shampoo Cap“ šampūno kepurė

Uždėjus šampūno kepurę masažuojamaisiais judesiais trinkti galvą 3–4 min. Nuėmus kepurę plaukų nebereikia skalauti vandeniu – tik nusausinti rankšluosčiu.

1268_1026

SENI
slaugos ir higienos priemonėms

iki -30%

nuo 2 63 €



„SENI LADY" ir „SENI MAN" įklotai skirti naudoti esant lengvam šlapimo nelaikymui. Skirtingų dydžių, orui laidūs, su kvapo kontrolės sistema. „SENI ACTIVE TRIO" sauskelnės-kelnaitės tinka aktyviems, savarankiškai judėti galintiems asmenims. „SENI CARE" kosmetika odos priežiūrai puikiai valo, neutralizuoja kvapus, padeda saugoti odą nuo sudirgimų.

PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI.

Nuolaida netaikoma perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu ir elektroniniu kompensuojamuoju receptu.

GENTLE DAY
moterų higienos priemonėms

-25%*

nuo 1 57 €



Hipoalerginės „GENTLE DAY®" higienos priemonės skirtos moterims, kurių oda linkusi sudirgti ar yra alergiška. Švelnios nosinaitės iš nebalinto bambuko pluošo su aloviju ir gliceriną – ypatingai švelniai odos priežiūrai.

SVEIKIAU JUMS IR APLINKAI.

*perkant bent 2 prekes

-30%* 8 92 € ~~12 75 €~~

*perkant bent 2 prekes

Intymiai moters sveikatai
ALKAGIN®



Medicinos priemonė, makšties ovulės, 10 vnt.
Raminančios, apsaugančios ovulės su lengvai šarminiu pH, skirtos malšinti makšties niežulį.

-30%* nuo 2 43 €

*perkant bent 2 prekes

ALKAGIN®



Kosmetika, intymios higienos prausikliai, 250 ml, drėgnos servetėlės, 150 vnt.
Intymios higienos prausikliai skirti kasdienei intymios higienos priežiūrai, gali saugoti ir gaivinti odą išorinių lytinių organų srityje nuo dirginimo. Priemonės gali padėti drėkinti ir minkštinti odą išorinių lytinių organų srityje.
Servetėlės su švelnia emulsija, skirtos kasdienei intymios higienos priežiūrai. Praturtintos medetkų, dedešvų ir liepų ekstraktais. Gali suteikti gaivumo ir komforto pojūtį.

*Nuolaidos netaikomos vaistams ir med. pagalbos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiesiems. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos. Pasiūlymų ieškokite vaistinėse „CAMELIA". Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Jei leidinyje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informaciją, esančią leidinyje, vertinti kaip spaudos klaidą. Kainos nurodytos eurais. Nuolaidos taikomos su Mažų kainų kortele. Akcinių prekių skaičius ribotas. Visoms leidinyje pateiktoms kainoms papildomos nuolaidos netaikomos. Leidinys galioja 2026 11 01 – 2026 11 30. Už informacijos teisingumą ir už tai, kad atitiktų LR reklamos, LR Konkurencijos įstatymų, Farmacijos įstatymo bei kitų LR teisės aktų nuostatas atsako produkto atstovas (reklamos davėjas). Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonės apie „CAMELIA" leidinį el. paštu reklama@camelia.lt.



Nuolaidos netaikomos medicinos priemonėms perkant su kompensuojamuoju receptu. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai.
Pasiūlymų ieškokite vaistinėse CAMELIA. Nuolaidos galioja su „Mažų kainų" kortele.

CAMELIA VAISTINĖ

Mažų kainų vaistinė

Maisto papildams

ŠIRDŽIAI

iki -40%













Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Pasiūlymas galioja su „Mažų kainų“ kortele iki 2026 11 30 prekėms, įtrauktoms į UAB „Nemuno vaistinė“ administracijos patvirtintą sąrašą. Pasiūlymas netaikomas prekėms, kurioms taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar pasiūlymai. Prekių kiekis ribotas. Daugiau informacijos teiraukitės vaistinėje.