LAPKRIČIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2026 11 01 - 2026 11 30

Ramunėlės vaistinė

-30%

Silvanols Faringo spray KIDS

Purškalas gerklei vaikams su čiobreliais ir liepžiedžiais.

- Vaikams nuo 4 metų
- Be etanolio
- Be konservantų
- Be dirbtinių dažiklių

Čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę.

NAUJIENA!



Faringo pastilles SOFT

Minkštosios pastilės gerklei ir burnos ertmei

- Su hialurono rūgštimi
- Šaltalankių aliejumi
- Svilarožėmis
- Vitaminais B ir C

Švelnios burnos ertmės gleivinei, o kruopščiai atrinktos sudedamosios dalys gali padėti palaikyti normalią gleivinių funkciją.

-30%

Atmosil

Kapsulės – kvėpavimo sistemai skirtas kompleksas su augaliniais ekstraktais.

- Pušų ekstraktas padeda palengvinti kvėpavimą bei palaikyti normalią kvėpavimo takų ir gerklės būklę.
- Bosvelijų ekstraktas padeda palaikyti plaučių ir kvėpavimo takų sveikatą.
- Anyžių ekstraktas ramina burnos ertmę, gerklę bei ryklę ir padeda palaikyti normalią balso stygų būklę.
- Sudėtis papildyta vertignais flavonoidais bei augalnės kilmės medžiagomis – kvercetinu, resveratrolu, likopenu ir astaksantinu.

Nuo 12 metų.



-30%

Silvanols Faringo spray

Klasikinis ir apelsinų skonio purškalai gerklei su šaltalankiais ir medetkomis.

- Vaikams nuo 12 metų
- Be etanolio
- Be konservantų
- Be dirbtinių dažiklių

Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę.



Silvanols Laringo spray

Purškalas gerklei su propoliu ir medetkų žiedų tinktūra. Propolis padeda palaikyti burnos ir gerklės gleivinės būklę. Medetkų žiedai ramina burnos ertmės bei gerklės gleivinę ir padeda palaikyti normalią jų funkciją. Glicerolis užtikrina malonią gaminio konsistenciją ir tolygų padengimą.

- Vaikams nuo 12 metų
- Be dirbtinių dažiklių

Maist o papildas neturi būti v art ojamas kaip maist o pakaitalas . S varbu jv airi ir subalansuota mityba bei s veikas gyv enimo būdas . Saug oti nuo v aikų.

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt

100 METŲ VAISTINĖ

Pasiūlymai galioja 2026 m. lapkričio 1 d. - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

KARŠČIAVIMAS

Žmogaus kūno temperatūra paros metu svyruoja. Paprastai žemiausia ji būna naktį (tuomet lėčiausia medžiagų apykaita) ir ryte, o dieną, kai esame aktyvūs, ji pakyla. Įprastai vidutinė normali kūno temperatūra yra 36,8°C ir svyruoja nuo 36,2°C iki 37,0°C.

Temperatūrą būtina matuoti taisyklingai, kaip nurodyta termometro naudojimo instrukcijoje. Matuojant temperatūrą pažastyje, karščiavimas gali būti: nedidelis (37—38°C), vidutinis (38—39°C), didelis (39—40°C) ir itin didelis (daugiau kaip 40°C). Yra 3 karščiavimo stadijos: temperatūros kilimas, laikymasis ir kritimas. Temperatūrai kylant, dažniausiai krečia drebulys, juntamas šaltis, gali skaudėti galvą bei sąnarius. Temperatūrai kretant žmogus daug prakaituoja, padažnėja jo kvėpavimas. Prisiminkite, karščiavimas nevisada yra peršalimo simptomas.

Pakilus kūno temperatūrai, nereikėtų skubėti ją mažinti vaistais. Karščiavimas nėra liga, tai tik vienas iš ligos simptomų. Pakilusi kūno temperatūra (karščiavimas) — ženklas, kad organizmas kovoja su infekcija (bakterijomis ir virusais), uždegimu. Kuo imuninė sistema stipresnė, tuo lengviau ir greičiau nugalima infekcija. Esant pakilusiai kūno temperatūrai, pagreitėja medžiagų apykaita, organizmas pradeda gaminti daugiau interferono (medžiaga, kuri neutralizuoja virusus) ir imuninių ląstelių, taip stabdomas ligos sukėlėjų dauginimasis. Pakilusią temperatūrą rekomenduojama mažinti palaipsniui. Jeigu karščiuojama ilgiau nei dvi paras,(net jei temperatūra nukrenta ir vėl pakyla) privaloma kreiptis į gydytoją.

Kaip mažinti karščiavimą?

Norint sumažinti kūno temperatūrą rekomenduojama gerti daug skysčių (šiltas vaistažolių arbatas, šviežias natūralias sultis, kompotus, šiltą negazuotą mineralinį). Karščiavimą mažina šiltos juodųjų serbentų, spanguolių, bruknių uogienės, aviečių lapų, šeivamedžio žiedynų bei vaisių, liepų žiedų, čiobrelių arbatos.

Svarbu neleisti kūnui perkaisti. Smarkiai karščiuojant, rekomenduojama kūną aptrinti drungnu vandeniu sudrėkintu rankšluosčiu (pradedant nuo veido ir kaklo, vėliau pilvą, rankas, kojas). Jei karščiuojant gausiai prakaituojama, būtina dažnai keisti drabužius. Nuolat vėdinkite patalpas.

Sergant svarbu valgyti kuo daugiau daržovių ir vaisių, kurių sudėtyje gausu antioksidantų (vitaminų A, C ir E, cinko, seleno ir kt.). Vitamino C gausu citrinoje, šermukšnių, spanguolių ir putino uogose.

Visuomet kreipkitės į gydytoją, jeigu temperatūra pakyla naujagimiui. Skirdami vaikams karščiavimą ir skausmą mažinančius vaistus, gydytojai atsižvelgia į vaiko amžių, svorį, ligą. Jei ligos simptomai nepraeina ilgiau nei dvi dienas, visada kreipkitės į gydytoją.

Būkite sveiki!

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tab. 2,50 €

APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tab. 4,07 €

APAP express, 500 mg 10 minkštųjų kapsulių 3,35 €

APAP, 250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 pak. 6,25 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje „APAP, 250 mg" yra 250 mg paracetamolio; 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. Indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg" granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus. Reklamos teksto parengimo data: 2025-03-31.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĘ.



IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4,24 €

IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių 4,93 €

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 6,50 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Terapinės indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2026.03.23

8,56 €

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĘ.



IBUPROM, 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30– 40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sistemine raudonąja vilklige, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidratacija, vartojantiesiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2024.12.12

8,49 €



TONUFEN 200 mg/30 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Tonufen“ dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikiam simptominiam nosies ir ančių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinusitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletės per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praeityje pasireiškusios alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertireoze, cukriniu diabetu, uždaro kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. Specialūs įspėjimai: atsargiau reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praeityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudonąja vilklige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: 2025-09-17.

8,76 €

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS



INOVOX MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

HERBION 35 mg kietosios pastilės

6,57 €



*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5:1). Terapinės indikacijos: Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiesiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Dozavimas ir vartojimo būdas: Įprasta dozė 6-11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiesiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Vartoti ant burnos gleivinės. Leisti pastilei lėtai ištirpti burnoje. Jei simptomai išlieka šio vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip savaitę, pacientui būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems gebenių šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai: Jei pasireškia dispnėja (dusulys), karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. Gastritu ar skrandžio opalige sergantiems ligoniams vaistinio preparato rekomenduojama vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 12 07.

HERBION 7 mg/ml sirupas



6,85 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Herbion 7 mg/ml sirupas, 1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helicis L., folii (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5:1). Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui. Suaugę žmonės, senyvi, 12 metų paaugliai ir vyresni. Du kartus per parą gerti 57,5 ml sirupo (atitinka 70105 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto paros dozę). 612 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 70 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto paros dozę). 25 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 2,5 ml sirupo (atitinka 35 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto paros dozę). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems Araliaceae (gebenių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. 24 metų vaikų nuolatinį ar pasikartojantį kosulį galima pradėti gydyti tik nustačius medicininę diagnozę. Jei pasireškia dispnėja, karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo Herbion metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-21.

-20%

SAUSAM, DIRGINANČIAM KOSULIUI

HERBISLAND 6 mg/ml sirupas



Medicinos priemonė

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto.

Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus:
- sausam, dirginančiam kosuliui;
- užkimimui;
- gerklės skausmui.

Herbisland sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę.

Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus. Be cukraus (į sudėtį įeina natūralios kilmės sorbitolis). Malonaus citrinų skonio.

Kaip vartoti Herbisland?
1-4 metų vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) x 4 k./d.
4-10 metų vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) x 4 k./d.
10-16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) x 4 k./d.
16 metų ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukštai) x 4 k./d.
Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą. Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

HERBISLAND kietosios pastilės, N16



Medicinos priemonė

Gerklės dirginimui, užkimimui ir sausam kosuliui malšinti.
Be cukraus. Apelsinų skonio.

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg islandinių kerpenųsausojo ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus) (atitinkančio 90-120 mg islandinių kerpenų). Tai yra tradicinis augalinis preparatas, kuris rekomenduojamas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosuliui palengvinti. Islandinių kerpenų ekstrakto sudėtyje yra didelis kiekis vandenyje tirpių gleivių, kurios, manoma, padengia, apsaugo ir drėkina burnos bei gerklės gleivinę bei sumažina jos dirginimą. Įprastinė dozė suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams yra 1 kietoji pastilė aštuonis kartus per dieną.

9,49 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA



SEPTABENE 1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalas 30 ml

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius - skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą.
Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti:
- jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas;
- sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu);
- prieš dantų traukimą ir po jo.

Dozavimas suaugusiesiems. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. 6-12 metų vaikams. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną kartą. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. Kontraindikacijos ir specialieji perspėjimai. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. Teksto peržiūros data: 2023 08 09.

8,10 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA



SEPTABENE, 3 mg/1 mg, kietosios pastilės N16

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Eukaliptų skonio / Citrinų ir šeivamedžio skonio / Citrinų ir medaus skonio / Kolos skonio

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos: „Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę, lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu) ir ryklės uždegimu (faringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji: rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val.; 6–12 m. vaikai: rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-27.

Pasiūlymai galioja 2026 m. lapkričio 1 - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Jei sloga pavirto simfonija, laikas „GeloMyrtol forte“



GeloMyrtol forte, 300mg, 20 arba 100 skrandyje neirių minkštųjų kapsulių Nereceptiniai vaistiniai preparatai*

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: 1 kapsulėje GeloMyrtol forte yra 300 mg išgrynintų eukaliptų, saldžiųjų apelsinų, mirtų ir citrinų eterinių aliejų mišinio (66:32:1:1) distiliato. **Terapinės indikacijos:** Šie vaistai skirti atsikosėjimui, sergant ūminiu ir lėtiniu bronchitu, palengvinti bei sinusito simptomams lengvinti. GeloMyrtol forte skystina bronchų ir nosiaryklės sekretą bei pagerina jo šalinimą. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** GeloMyrtol forte ūminės ligos atveju: 6 -12 metų vaikams ir paaugliams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų - po 1 kapsulę 3-4 kartus per parą. Lėtinės ligos atveju: 6 -12 metų vaikams ir paaugliams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų - po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką **Kontraindikacijos:** Šių vaistų vartoti negalima jei esate alergiški veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. GeloMyrtol forte jaunesniems nei 6 metų vaikams artoti negalima. **Specialūs įspėjimai:** pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti šiuos vaistus: jeigu sergate bronchų astma, kokliušu arba kitokia kvėpavimo takų liga pasižyminčia padidėjusiu kvėpavimo sistemos jautrumu, Gelomyrtol forte galima vartoti tik gydytojui paskyrus. Jeigu savijauta nepagerėjo arba pasunkėjo, arba atsirado dusulys arba karščiavimas, arba pradėjote atsikoseti gleivėmis, kuriose yra kraujo, arba į pūlius panašios išskyros, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Reklamos teksto parengimo data 2024 10.01.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.



GELOMYRTOL FORTE, 300mg, 20 skrandyje neirių minkštųjų kapsulių — 6,89 €

MYRTOL, 120mg, 20 skrandyje neirių minkštųjų kapsulių — 4,96 €

*Nereceptiniai vaistiniai preparatai***

Veikliosios medžiagos ir stiprumas:1 kapsulėje GeloMyrtol forte yra 300 mg, o 1 kapsulėje Myrtol yra 120mg išgrynintų eukaliptų, saldžiųjų apelsinų, mirtų ir citrinų eterinių aliejų mišinio (66:32:1:1) distiliato. Terapinės indikacijos: Sie vaistai skirti atsikosėjimui, sergant ūminiu ir lėtiniu bronchitu, palengvinti bei sinusito simptomams lengvinti. GeloMyrtol forte ir Myrtol skystina bronchų ir nosiaryklės sekretą bei pagerina jo šalinimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: GeloMyrtol forte ūminės ligos atveju: 6 -12 metų vaikams ir paaugliams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Lėtinės ligos atveju: 6 -12 metų vaikams ir paaugliams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1–2 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Myrtol ūminės ligos atveju: 3 -5 metų vaikams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1–3 kartus per parą, 6-12 metų vaikams ir paaugliams- po 1 kapsulę 3–4 kartus per parą. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 2 kapsules 2–5 kartus per parą Lėtinės ligos atveju: 3 -5 metų vaikams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 2 kartus per parą, 6-12 metų vaikams ir paaugliams-po 1 kapsulę 3 kartus per parą. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 2 kapsules 3-4 kartus per parą. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką Kontraindikacijos: šių vaistų vartoti negalima jei esate alergiški veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu sergate skrandžio, žarnų arba tulžies pūslės ir latakų uždegimine liga arba sunkia kepenų liga. GeloMyrtol forte jaunesniems nei 6 metų vaikams, ir Myrtol jaunesniems nei 3 metų vaikams vartoti negalima. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti šiuos vaistus: jeigu sergate bronchų astma, kokliušu arba kitokia kvėpavimo takų liga pasižyminčia padidėjusiu kvėpavimo sistemos jautrumu, Gelomyrtol forte ir Myrtol galima vartoti tik gydytojui paskyrus. Jeigu savijauta nepagerėjo arba pasunkėjo, arba atsirado dusulys arba karščiavimas, arba pradėjote atsikosėti gleivėmis, kuriose yra kraujo, arba į pūlius panašios išskyros, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025 12.01

nuo 6,77 €



QUIXX nosies purškalas 30 ml
QUIXX Soft nosies purškalas 30 ml
QUIXX Extra nosies purškalas 30 ml
QUIXX Baby nosies lašai (tirpalas) 10 ml
QUIXX Acute nosies purškalas 100 ml
QUIXX Daily nosies purškalas 100 ml

Medicinos priemonės

Quixx efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. **Quixx Soft** su alavijų ekstraktu – tai natūrali, pagalbinė priemonė, drėkinanti jautrias nosies sieneles ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamų simptomų nosyje. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiesiems: esant reikalui, 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę kelis kartus per dieną. **Quixx Extra** su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą, suteikia stiprų gaivumo pojūtį. Dozavimas. Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1 – 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną, suaugusiems ir paaugliams: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną. **Quixx Acute** – natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasireiškus slogai. Gali vartoti vaikai nuo 3 metų amžiaus ir suaugusieji. **Quixx Baby** - mažylių nosies priežiūrai ir higienai nuo pirmosios gyvenimo dienos. Dozavimas. 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia. Naujagimiams ir kūdikiams iki 3 mėnesių rekomenduojama vartoti netiesiogiai, užlašinus ant vatos tamponėlio. Sudėtyje yra tik natūralios medžiagos. Specialūs įspėjimai. Quixx medicinos priemonių negalima vartoti jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai.

5,27 €

ATKEMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĖJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ



SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (suaugusiems)

SEPTANAZAL 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (vaikams)

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:
- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegininė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Specialūs įspėjimai. Septanazal galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinti galinčiais vaistiniais preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždaro kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. Teksto peržiūros data 2026 02 17.



8,99 € — 8,39 €

FERVEX be cukraus, suaugusiesiems, 500 mg/25 mg/ 200 mg, granulės geriamajam tirpalui, 8 vnt.

FERVEX suaugusiesiems, 500 mg/25 mg/ 200 mg, granulės geriamajam tirpalui, 8 vnt.

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems ir FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus: viename paketėlyje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato ir 200 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos. Trumpalaikis ūminių peršalimo ligų simptomų (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) lengvinimas. FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems ir FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus skirti suaugusiesiems ir paaugliams nuo 15 metų. Vartojimo metodas ir dozavimas. Vartoti per burną. Prieš vartojant, granules reikia ištirpinti pakankamame kiekyje karšto arba šalto vandens. Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozę reikia koreguoti.FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems ir FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus: vartoti po 1 paketėlį mažiausiai kas 4 val. Didžiausia paros dozė – 3 paketėliai. Maksimali gydymo trukmė yra 5 paros. Didžiausia paracetamolio paros dozė neturi viršyti 4 g per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai, sunkus kepenų nepakankamumas, uždaro kampo glaukoma ar šlapimo susilaikymas. FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems ir FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus: vartojimas jaunesniems kaip 15 metų vaikams.FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus: aktyvios kepenų ligos, fenilketonurija. Specialūs įspėjimai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Paracetamolis gali sukelti sunkių odos reakcijų, kurios gali būti mirtinos. Pasirodžius pirmiesiems odos išbėrimo ar kitiems padidėjusio jautrumo požymiams, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti. Įtariant piroglutamato acidozės sukeltą padidėjusį anijoninį tarpą esant metabolinei acidozei, rekomenduojama nedelsiant nutraukti paracetamolio vartojimą ir atidžiai stebėti. Reikia vartoti atsargiai esant sutrikusiai kepenų ar inkstų funkcijai, sergant lėtiniu alkoholizmu, esant ilgalaikei prastai mitybai, dehidratacijai. Vengti alkoholinių gėrimų ir sedacinių vaistinių preparatų. Žindymo laikotarpiu FERVEX vartoti negalima. FERVEX daro didelę įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems: atsargiai vartoti astma sergantiems pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas NVNU. Sudėtyje yra sacharozės ir gliukozės, būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams, negalima vartoti pacientams, kuriems nustatyta gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems: reikia vartoti atsargiai pacientams, sergantiems Zilberto sindromu, anoreksijai, kacheksijai, bulimijai, badavimui, padidėjusiam jautrumui acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiančiu bronchų spazmu. FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems ir FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus: Reikia vartoti atsargiai, jei kūno svoris < 50 kg. Tik FERVEX granulės geriamajam tirpalui paketėlyje suaugusiesiems, be cukraus: jautriems asmenims gali padidėti akispūdis, pasunkėti apatinių šlapimo takų obstrukcija ar sutrikti skrandžio turinio evakuacija. Vartoti atsargiai jei , yra polinkis šlapimo takų arba inkstų akmenų susidarymui. Sudėtyje yra aspartamo, jis gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija. Reklamos teksto data 2026.10 mėn.


DAINUOK
VISA GERKLE
GeloRevoice®
gerklės pastilės
sūkājamās tabletes
kurgutabletid
Vyšnių ir mentolio skonio
Kirss-mentool · Ar kiršu-mentola garšu
„GeloRevoice“ – tavo balso pastilės

8 50 €



GELOREVOICE gerklės pastilės, N20

Medicinos priemonė

Vyšnių - mentolio arba juodųjų serbentų - mentolio skonio

GeloRevoice® gerklės pastilės apsaugo burnos ir gerklės gleivinę. Pastilės vartojamos norint palengvinti užkimimą, ryklės perštėjimą, skausmą, sausumą ir dėl kvėpavimo takų gleivinės dirglumo išsivysčiusį kosulį.
- Išsausėjusios, dirglios burnos ir gerklės gleivinės priežastys gali būti:
- Tenka daug kalbėti, dainuoti,
- Sunku kvėpuoti per nosį (pvz. peršalus),
- Dėl šildymo ar oro kondicionavimo sistemų sausas patalpų oras,
- Alergija (šienligė),
- Rūkymas.

GeloRevoice® pastilei įtirpus, burnoje ir ryklėje susiformuoja hialurono rūgšties hidrogelio kompleksas. Šis kompleksas gerai sukimba su gleivine ir suformuoja dirglias vietas drėkinančią, apsaugančią ir epitelio regeneraciją skatinančią plėvelę.



10 89 € **9 49 €**

UMCKALOR® geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml
UMCKALOR® 20 mg, 15 plėvele dengtų tablečių

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Tabletės. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. Indikacijos: Umckalor yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas. Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tabletės. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Vartoti nekramtant, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos. Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Umckalor: jeigu turite bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimų. Jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vargina dusulys arba atkostite skreplių su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletėms) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

7 89 €



PROSPAN 65 mg šnypščiosios tabletės, N10

*Nereceptinis augalinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščiojoje tabletėje yra 65 mg Hederae helicis L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5 : 1). Indikacijos: ūminio bronchito sukelto kosulio lengvinimas, atsikosėjimo gerinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „PROSPAN“ 65 mg šnypščiosios tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – po 1 šnypščiąją tabletę 2 kartus per parą; vaikams nuo 4 iki 12 metų – po pusę šnypščiosios tabletės 3 kartus per parą. Prieš vartojimą tabletę ištirpinti stiklinėje karšto arba šalto vandens (apie 200 ml). Vartoti per burną. Kontraindikacijos: šnypščiųjų tablečių vartoti draudžiama, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) gebenės lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „PROSPAN“ 65 mg šnypščiųjų tablečių sudėtyje yra natrio, sorbitolio, makrogolglicerolio hidroksistearato ir laktozės. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 4 metų vaikams. Daugiau informacijos apie specialius įspėjimus žr. vaistinių preparatų charakteristikų santraukose. Reklamos teksto parengimo data: PM-LT-2025-11-7394.

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!



„Vironox“ linija – epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų.

„Stiprus imunitetas“, 7 paketėliai – tik 7 dienos organizmo apsaugai bei imunitetui. Viename paketėlyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Jėgoms atstatyti+“, 14 paketėlių – maisto papildas siekiantiems greičiau atgauti jėgas. Kininių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį.

„Smegenų rūkas“, 14 paketėlių – maisto papildas protinei veiklai. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Raudonžiedžių pasiflorų žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalią miego kokybę. Vartojimas: tik 1 paketėlis per dieną.

Balzamo „Veiksminga apsauga“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

*Maisto papildai**

Pasiūlymai galioja 2026 m. lapkričio 1 - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!



LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N30
LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N60

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

3 75 €



ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti puséje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptusi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2025-08-18.



ESSENTIALE Forte N 600 mg kapsulės N30
ESSENTIALE Forte N 300 mg kapsulės N30
ESSENTIALE forte N 300 mg kietosios kapsulės N90

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. Terapinės indikacijos: simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams vienkartinė dozė – 1 kietoji kapsulė (600 mg). Paros dozė – po 1 kietąją kapsulę (600 mg) 3 kartus per parą (1800 mg sojų fosfolipidų). „Essentiale forte N“ saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 m. neištirti. Dėl šios priežasties „Essentiale forte N“ neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu kiekiu skysčio (pvz., stikline vandens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės riešutams, sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: „Essentiale forte N“ neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. „Essentiale forte N“ gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti šių vaistų dozę. „Essentiale forte N“ sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas natrio ir etanolio kiekis. Reklamos teksto parengimo data 2023-09. 2605_SB_Essentiale_V01_LT

1+1

APYKAITAI, KEPENŲ FUNKCIJAI IR VIRŠKINIMO SISTEMAI



*Maisto papildai**

„INULIN“ – inulinas 6000 mg + paprastosios trūkažolės ekstraktas 25 mg. Paprastoji trūkažolė, inulinas padeda normaliai: virškinimo/žarnyno veiklai, virškinimo trakto skysčių gamybai ir skrandžio bei žarnyno judėjimo stimuliavimui, laikantis dietos padeda svorio mažinimui, kepenų veiklai bei gliukozės koncentracijai kraujyje reguliuoti. **„bioSILYMARIN“**– Ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silimarinas! Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią: kepenų ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą), kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją, padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje.! **„LAXMAG“** – skaidulų šaltinis, senos lapų ekstraktas ir rabarbarų ekstraktas padeda normaliai žarnyno motorikai ir veiklai. **„URITA“** – produkto sudėtyje stambiauogės spanguolės, miltinės meškauogės. Meškauogė padeda palaikyti normalią šlapimo pūslės/takų veiklą. Be kvapiųjų medžiagų, be dažiklių, be konservantų. **„CLEAN ME“** sudėtyje balkšvieji gysločiai, linų sėmenys, gliukomananas, rugių skaidulos ir kalcio mineralas žarnynui ir virškinimui, svorio kontrolei. **„MAGNULIN“** – magnio, inulino ir paprastosios trūkažolės kompleksas, normaliam virškinimui, kepenų veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. 1 pakelyje - net 300 mg magnio ir 3000 mg inulino.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

-40%



*Maisto papildai**

POTENZINE SUPERIOR, tabletės N30

Subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildo sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją, ištvermę ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino. Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

PROSTOSAN FORTE, kapsulės N30

Pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys sabalpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, valgio metu.

-40%



LIBIDO MOTERIŠKA ENERGIJA, skystis N14

Apelsinų skonio skystas maisto papildas moters seksualinei sveikatai ir gerai savijautai. Padeda palaikyti reprodukcinės sistemos funkciją ir vaisingumą bei libido. Normalią moters reprodukcinės sistemos funkciją ir normalią fizinę veiklą padeda palaikyti peruvinių pipirnių šaknų ekstraktas. Normalią odos būklę, normalią plaukų ir nagų būklę padeda palaikyti cinkas. Normalų vaisingumą padeda palaikyti standieji smidrai.

LIBIDO VYRIŠKA ENERGIJA, skystis N14

Obuolių skonio skystas maisto papildas energijai, libido, vaisingumui ir gyvybingumui. Daržinių krokų purkų ekstraktas (šafranas) padeda palaikyti normalų vaisingumą ir protinę veiklą. Kininio ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią seksualinę veiklą ir organizmo gyvybingumą, o cinkas – normalią testosterono koncentraciją kraujyje bei reprodukcijos veiklą. Juodųjų eleuterokokų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią fizinę ir imuninės sistemos veiklą.

EPIGENIX GERAS SVORIS, 30 kapsulių

Naujos epigenetinės linijos EPIGENIX maisto papildas su dihidroBERBERINU. DihidroBERBERINAS - lengviau organizmo pasisavinama berberino forma. Normalią baltymų, gliukogeno ir energijos apykaitą padeda palaikyti vitaminas B6, o apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos padeda varis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

*Maisto papildai**

-50%

WALMARK – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI



SUPER VITAMINAS C - prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Praturtintas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą. **MEGA VITAMINAS D 4000UI** - didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. **CINKAS AKTIV** - aukštos kokybės cinkas grožiui ir imunitetui! Padeda palaikyti normalią nagų, plaukų odos ir kaulų būklę. Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Visos dienos dozė vienoje tabletėje! **SALUTIL FORTE** - 5 mlrd. gyvų lakto ir bifido bakterijų kiekvienoje kapsulėje. **URINAL AKUT** - unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

*Maisto papildai**

1+1

IMUNITETO ATSPARUMUI



„Biofarmacijos“ lengvai pasisavinami miltelių formos papildai, sukurti kasdieniam imuniteto palaikymui ir organizmo atsparumui. **IMUNO C + ECHINACEA + GINGER** – stipraus poveikio vitamino C, ežiuolės ir imbiero kompleksas imunitetui. Viename pakelyje – net 500 mg vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą ir mažinti nuovargį. Ežiuolės ir imbiero ekstraktai prisideda prie kvėpavimo takų funkcijos ir natūralaus organizmo atsparumo. **bioVITAMIN C+ZINC** - natūralios kilmės vitaminas C iš Acerolos ir grynas cinko citratas – kasdieniam imuniteto palaikymui, nervų sistemai, ląstelių apsaugai nuo oksidacijos. Cinkas papildomai prisideda prie odos, plaukų, nagų, kaulų, regėjimo ir baltymų sintezės. **bioVITAMINAS D3** – lengvai pasisavinamas ir tinkamas tiek vaikams, tiek suaugusiems vitaminas D3 miltelių formoje. Viename pakelyje: 75 µg / 3000 TV vitamino D3. Svarbus imunitetui, kaulams, raumenų funkcijai, kalcio ir fosforo įsisavinimui

*Maisto papildai**

1+1

TITANIŠKA GALIA SĄNARIAMS



„BIOFARMACIJOS“ ATLANT LINIJA – stiprios sudėties formulės su hidrolizuotu kolagenu. ATLANT sudėtyje 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Sukurti aktyviai judantiems ir siekiantiems ilgiau išlaikyti sąnarių lankstumą. Nr. 1 kolageno maisto papildas sąnariams Lietuvoje 2024–2025 metais! Nustatyta pagal 2024–2025 m. UAB „Softdent“ didmeninės prekybos pardavimų (Eurais) duomenis. Aukštos kokybės Negyvosios jūros mineralai, paprastos formulės ir jokių nereikalingų priedų.

*Maisto papildai**

1+1

EMOCINEI PUSIAUSVYRAI IR MIEGUI



„LABANAKT“ - melatonino, valerijono ir magnio kompleksas geresniam miegui. Melatoninas padeda mažinti laiko, norint užmigti, trukmę. **„ASHWA PRO400“**, **„ASHWA PRO600“** – papildai su aukštos kokybės ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktu, pasižyminčiu itin didele – net 5% - vitanolidų koncentracija. Papildytas inulinu iš cikorijos šaknies, kuris ne tik palaiko nervų sistemą ir atsparumą stresui, bet ir praturtina mitybą augalinės kilmės tirpiomis skaidulomis.

*Maisto papildai**

Pasiūlymai galioja 2026 m. lapkričio 1 - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-50%



PREMIUM VITAMINAS D 5000 TV, 60 kapsulių

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, normalią kalcio koncentraciją kraujyje, normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

MUMI IMUNO skystis 10 ml N10

Mumijo, kordicepsų, kulkšnių ekstraktai ir vitaminas C stiprina imuninę sistemą bei palaiko organizmo gyvybingumą, kraujagyslių funkciją bei fizinę ir protinę veiklą.

ČAGA 1000 skystis 10 ml N10

Koncentruotas skystas juodojo beržo grybo (čaga) ekstraktas – maisto papildas kasdieniam vartojimui.

ARTIŠOKAS+ MARGAINIS DETOX, 30 tablečių

Artišokų, margainių ir eršketžių ekstraktai skirti normaliai kepenų veiklai, žarnyno būklei bei organizmo apsaugai nuo laisvųjų radikalų palaikyti.

*Maisto papildai**

-50%



KARDIO START® sudėtyje esantis valgomųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją. **BEAUTYNOL®** sudėtyje esantis biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. **FLEX®** su gliukozaminu, chondroitinu, MSM ir vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą. **OCULO START®** sudėtyje esantis vitaminas A padeda palaikyti normalų regėjimą. **HEPA START®** sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą

*Maisto papildai**

-50%

PASAKYK STRESUI STOP!



STOP STRESS®, 30 kapsulių

STOP STRESS® sudėtyje yra 17 komponentų: vitaminų, aminorūgščių, mineralų ir augalų ekstraktų. Tikrieji imbierai padeda palaikyti normalią energiją, o raudonžiedžių pasiflorų, pipirinių metų ir vaistinių melisų ekstraktai padeda atsipalaiduoti. STOP STRESS® sudėtyje esantys B grupės vitaminai – niacinas, tiaminas, riboflavinas ir vit. B6 - padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, o foliatai - normalią psichologinę funkciją.

STOP STRESS® Night, 30 kapsulių

STOP STRESS® Night esantys valerijono ir apynio bei pasifloros ekstraktai padeda atsipalaiduoti ir padeda palaikyti normalų miegą.

STOP STRESS® Herbal, 30 kapsulių

STOP STRESS® Herbal padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir protinę veiklą. Vaistinės melisos padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Paprastosios sukatžolės padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

*Maisto papildai**

-40%



ECOSH bioaktyvus Magnis su vitaminu B6, 90 kaps.
ECOSH Magnesium complex + Mumio, 90 kaps.
ECOSH bioaktyvus vitaminas B12, 1200µg, 90 kaps.
ECOSH bioaktyvus Selenas, 150µg, 90 kaps.
ECOSH Žarnyno DETOX, 150g

*Maisto papildai**

Ecosh - Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškesnius ir efektyvesnius maisto papildus. Naudojamos veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami veganams.

12,70 €



NYDA EXPRESS purškalas, 50 ml

Medicinos priemonė

Nyda Express padeda atsikratyti galvos utėlių vos per 10 minučių!
Dėl preparato fizinio veikimo mechanizmo utėlių atsparumas NYDA® express atsirasti negali.

- Veikia per 10 minučių
- Be insekticidų
- Tinka vaikams nuo 2 metų
- Lengva naudoti

-20%

VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODAI!

RELIZEMA spray&go – zinc + panthenol purškalas 100 ml
RELIZEMA baby care kremas 100 ml

Kosmetikos priemonės



Produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir pantenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti bei apsaugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskelnių srityje, ant odos sudarydami apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Kliniškai įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.
RELIZEMA™ spray&go - zinc + panthenol purškalas - be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.
RELIZEMA™ priemones rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia.

Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB Berlin Chemie Menarini Baltic, J. Jasinskio str. 16a, LT-03163 Vilnius, Lithuania

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

VAISTINIŲ KONTAKTAI

VILNIUS | Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642
Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520

KAUNAS | V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826

MASTAIČIAI | Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144
Kauno raj.

KLAIPĖDA | Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914

ŠIAULIAI | Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879

ALYTUS | Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088

BUTRIMONYS | Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244
Alytaus raj.

MIROSLAVO K. | Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587
Alytaus raj.

DRUSKININKAI | Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008

ELEKTRĖNAI | Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415

ABROMIŠKIŲ K. | Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310
Elektrėnų sav.

GIRKALNIS | Šėtupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523
Raseinių raj.

GRINKIŠKIS | Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388
Radviliškio raj.

GRIŠKABŪDIS | Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266
Šakių raj.

JONIŠKĖLIS | Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219
Pasvalio raj.

KAIŠIADORYS | Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745

KRUONIS | Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106
Kaišiadorių raj.

MICKŪNAI | Mickūnų g. 3, tel. (0 522) 34 206
Vilniaus raj.

SASNAVA | Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511
Marijampolės raj.

SEIRIJAI | Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939
Lazdijų raj.

SIMNAS | Alytaus g. 10, tel. (0 315) 426 16
Alytaus raj.

Užsisakykite prekes internetu **www.100metu.lt**
ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!

VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS | **„Guobos vaistinė“** Vilniaus g. 107 tel. (0 319) 59 280
Prienų raj.

IŠLAUŽAS | **„Vitalijos vaistinė“** Kauno pl. 1 tel. (0 698) 45 977
Prienų raj.

KALVARIJA | **„Kalvarijos vaistinė“** Ugniagesių g. 9 tel. (0 343) 21 257
Marijampolės raj.

KĖDAINIAI | **„Kaštonų vaistinė“** J. Basanavičiaus g. 10 tel. (0 347) 67 244

MARIJAMPOLĖ | **„Gubojos vaistinė“** R.Juknevičiaus g. 72-1 tel. (0 343) 97 372

KURŠĖNAI | **„Kuršėnų vaistinė“** Vytauto g. 5 tel. (0 415) 85 747

-15%

Taikoma visam DrLuigi asortimentui





DrLuigi avalynė skirta ir rekomenduojama visiems kas:

- rūpinasi savo sveikata ir kojomis;
- turi sunkumų su sąnariais ir stuburu;
- turi kraujotakos problemų ar išsiplėtusias venas;
- serga artritu ar osteoporoze;
- turi diabetinę pėdą;
- turi viršsvorio.

DrLuigi medicininė avalynė yra itin lengva ir minkšta. Natūralaus pluošto dėka jūsų pėda mažiau prakaituoja, taip suteikiant daugiau komforto avalynę dėvint ilgą laiką. Neslystantis medicininės avalynės padas amortizuoja kūno svorį ir lengvai prisitaiko prie kiekvieno žmogaus pėdos ypatumų.

Pasiūlymai galioja 2026 m. lapkričio 1- 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

Daugiau informacijos rasite www.ramunelesvaistine.lt ir www.100metu.lt