

BALANDŽIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2026 04 01 - 2026 04 30



ŠIUOLAIKINIŲ ANTISEPTIKŲ PRIVALUMAI GYDANT ŽAIZDAS

Antiseptikus žmonija naudoja jau daugiau nei tūkstantį metų. Antiseptikai yra antimikrobinės medžiagos, kurių pagrindinis tikslas ne tik sustabdyti infekcijas, tačiau šios medžiagos taip pat turėtų būti gerai toleruojamos, netoksiškos organizmui, plataus spektro ir veiksmingos. Kažkada karvės šlapimas buvo laikomas labai efektyvia dezinfekavimo priemone, o, pavyzdžiui, Hipokratas žaizdas rekomendavo valyti vynu.

Šiandien viena iš naujausių medžiagų, turinčių antiseptinį poveikį, yra oktenidinas. Šiuolaikinės dezinfekcijos priemonės oktenidino pagrindu yra veiksmingos ir švelnios audiniams, gali ne tik sunaikinti mikroorganizmus, bet ir užkirsti kelią jų dauginimuisi, todėl jos veiksmingai apsaugo nuo komplikacijų gydymo metu. Oktenidinas yra skaidri, bekvapė, gerai toleruojama plataus spektro antiseptinė medžiaga, kuri pasižymi mažu citotoksiškumu, negrauzia ir netepa.

Neveltui medikai nuolat pabrėžia tinkamą žaizdų priežiūros svarbą. Žaizdos lengvai palaiko bakterijų augimą, todėl bet kuris paviršinis odos pažeidimas gali transformuotis į sunkiai gydomas, užkrėstas lėtines žaizdas. Du pagrindiniai veiksniai skatinantys šią transformaciją yra bioplėvelės, kurios net 10 kartų padidina riziką susiformuoti lėtinei žaizdai ir antras veiksnys, žaizdoje esančių įvairių bakterijų populiacija. Dėl šių priežasčių, žaizdų antiseptikai turi pasižymėti ne tik plataus veikimo spektru, bet ir bakterijų dekolonizacija.

Siekiant geriausių mikrobo naikinimo ar slopinimo sąlygų, per pastaruosius dešimtmečius buvo atlikta daugybė klinikinių tyrimų, norint sukurti naujas antiseptines medžiagas. Oktenidino dihidrochloridas, viena iš medžiagų, pasižyminti optimaliomis antiseptinėmis savybėmis. Švelni dezinfekavimo priemonė, kurioje nėra alkoholio, todėl nedegina ir yra tinkama net kūdikiams. Efektyvus, novatoriškas ir universalus oktenidinas tinka įpjovimams, įbrėžimams, nubrodinimams ir daugeliui kitų negalavimų dezinfekcijai.

Plataus spektro antiseptinis preparatas oktenidino dihidrochloridas ne tik pasižymi infekcijos mažinimo savybėmis, tačiau drėkindamas žaizdą užtikrina greitesnį jos gijimą.

Dėl plataus pritaikymo galimybių, oktenidinas idealus pagalbininkas prižiūrint žaizdas visų amžiaus grupių pacientams, todėl visada naudinga jį turėti po ranka.

BAKTERIJŲ AUGIMĄ STABDANTIS ŽAIZDŲ ANTISEPTIKAS

OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalo, tirpalas 100 ml
OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalo, tirpalas 50 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas**

573 €

833 €



Veikliosios medžiagos stiprumas. Kiekviename g tirpalo yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. Terapinės indikacijos. Visų amžiaus grupių pacientų kartotinis trumpalaikis pagalbinis mažu, paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams Octezy vartojamas ant gydomos srities, kol ji bus visiškai sudrėkinta. Pavartojus šį vaistinį preparatą ir prieš imantis kitų priemonių, pvz., uždėdant ant žaizdos tvarstį, reikia palaukti mažiausiai 1–2 minutes. Octezy turi būti vartojamas ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartojimą reikia riboti iki kelių dienų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Octezy negalima nuryti, vartoti didesniais kiekiais nei būtina. Siekiant išvengti audinių pažeidimo, reikia būti atsargiems plaunant žaizdą ir užtikrinti, kad vaistinis preparatas nebūtų naudojamas su slėgiu ar suleidžiamas į audinius. Esant žaizdai su ertmėmis, reikia užtikrinti, kad bet kurio metu būtų užtikrintas vaistinio preparato išleidimas. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosios arba bet kurią pagalbine medžiagai. Octezy draudžiama vartoti pilvo ertmės, šlapimo pūslės ar ausies būgnelio plovimui. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. Reklamos teksto parengimo data 2026 03.

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt



Pasiūlymai galioja 2026 m. balandžio 1 - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lv.lt.

DR. PAKALNS – GAMTOS ĮKVĖPTI SPRENDIMAI KASDIENIAM KOMFORTUI

Prekinis ženklas Dr. Pakalns gimė Latvijoje, o jo pavadinimas – pagarbus priminimas žmogui, kurio žinios ir požiūris į augalus tapo šios linijos įkvėpimu. Dailonis Pakalnis, žinomas latvių žolininkas ir gamtos mylėtojas, daugelį metų rinko, tyrinėjo ir puoselėjo augalų naudojimo tradicijas. Jo vardas tapo simboliu natūralumo, atsakingo požiūrio ir pagarbos gamtai – vertybių, kuriomis remiasi ir šiuolaikiniai Dr. Pakalns produktai.

Augalų galia kasdieniam organizmo palaikymui

Dr. Pakalns maisto papildų linija sukurta taip, kad padėtų papildyti kasdienę mitybą medžiagomis, kurių kartais gali pritrūkti.

BETA IMMUNE balzamas – su beta gliukanais ir šėivamedžio uogomis. Šėivamedžio vaisių ekstraktas, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir stiprina natūralią organizmo apsaugą. Vaikams nuo 3 metų.

GYSLOČIŲ balzamas – su siauralapio gysločio ekstraktu, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Gysločio lapai padeda stiprinti imuninę sistemą ir palaiko organizmo apsaugą nuo nepalankių aplinkos veiksnių. Vaikams nuo 3 metų.

PINI PLUS sirupas – su pušų pumpurais ir čiobreliais. Tradiciškai vartojami kvėpavimo takų funkcijai palaikyti, padeda išlaikyti gerklės komfortą ir natūralų atsikosėjimo procesą. Vaikams nuo 4 metų.

ISLANDINIŲ KERPIŲ sirupas – su pipirmėčių tinktūra. Padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklės komfortą. Islandinė kerpė padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Nuo 12 metų.

DEXANGIN SPRAY purškalas gerklei – su ramunėlėmis, vaistine pikule ir čiobreliais. Augaliniai ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų gleivinės būklę ir balso funkciją. Nuo 6 metų.

LOORO SPRAY purškalas gerklei - su šaltalankiais ir medetkomis. Šaltalankiai padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir burnos ertmės būklę, bei normalią kvėpavimo takų veiklą. Nuo 12 metų.

Kokybė, kuri remiasi tradicija ir atsakomybe

Dr. Pakalns produktai gaminami laikantis aukštų kokybės standartų. Sudėty yra aiškios, be perteklinių priedų, o augaliniai ekstraktai atrenkami taip, kad išlaikytų natūralų veikliųjų medžiagų balansą. Tai – pagarba tiek vartotojui, tiek gamtai, kurią taip vertino ir pats Dailonis Pakalnis.

Praktiškas pasirinkimas sezoninių iššūkių metu

Šaltuoju metų laiku, kai dažniau susiduriama su gerklės ar kvėpavimo takų diskomfortu, Dr. Pakalns produktai gali būti patogus būdas papildyti mitybą augaliniais ekstraktais ir vitaminais, padedančiais palaikyti normalią imuninės sistemos ar kvėpavimo takų funkciją.

-30%



DR. PAKALNS linija

Maisto papildai*

9,49 €



**UMCKALOR® geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml
UMCKALOR® 20 mg, 15 plėvele dengtų tablečių**

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. Tablečių. 1 plėvele dengtoje tableteje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. Indikacijos: Umckalor yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas. Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tablečių. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Vartoti nekrantam, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos. Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. Specialūs spėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Umckalor: jeigu turite bet kokią pobūdžio kepenų veiklos sutrikimą. Jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet koks pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vagina dusulys arba atostote skreplį su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletelems) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

8,77 €

**RENKUOSI „IBUPROM“.
RENKUOSI LAISVĘ.**



IBUPROM, 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs spėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidracija, vartojantiesiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-29.



**GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak. 7,99 €**

**GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak. 7,50 €**

**GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak. 8,72 €**

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketylyje: „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidroklorido; „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidroklorido; „Gripex Thermal“ 300/20/5 mg: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidroklorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg arba „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketylį kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketyliai kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevertkite ilgiau nei 7 d. Nevertkite didesnę nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei Jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholi. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatahidrogenazės arba methemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs spėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išlyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.



GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tab. 6,13 €

GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tab. 8,96 €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tab. 6,48 €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tab. 9,25 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tableteje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido, 10 mg dekstrometorfano hidrobromido. 1 tableteje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido, 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroninis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminoooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs spėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydanis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholi. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt/iv.

645 €



SOLPADEINE 500 mg/8 mg/30 mg, 12 tablečių
Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kofeino. Terapinės indikacijos: silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (šanarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Persilaimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems: po 2 tabletes, jei reikia iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 val. ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 val. 12–15 m. paaugliams: po 1 tabletę kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą, 16–17 m. paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 val. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti vaistą. Jeigu Jus sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla; įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūslė; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jeigu esate arba kada nors buvotė priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba netiesių cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kofeino. Kartu su šiuo vaistų nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Taip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai. Jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranjinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu sergate sunkiomis ligomis, įskaitant sunkius inkstų funkcijos sutrikimus arba sepsį, netinkamą mitybą, lėtinį alkoholizmą arba jei vartojate ir flukloksaciliną. Gauta pranešimų apie sunkų sveikatos sutrikimą – metabolinę acidozę. Gali sukelti mieguistumą ar svajonimą. Jei taip nutiko, nevaldykite mechanizmų. Kontraindikacijos. Solpadeine vartoti draudžiama. Jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms, skausmą malšintiems opioidams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranjinis spaudimas; jeigu buvo atliktas tulžies latakų operacija; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; vaikams, jaunesniems kaip 12 metų; mašinti skausmo vaikams ir paaugliams (0-18 metų) po gerklės ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodeinas labai greitai metabolizuojamas į morfino; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data: 2026-03-17.

1+1



- HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių
Medicinos priemonė
- HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių
- HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių
- HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių
Maisto papildai*
- HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, aviečių ir obuolių skonio ledinukai, 4 vnt.
- HERBITASSIN® becurrakriai miško uogų skonio ledinukai, 4 vnt.
Maisto produktas

Herbitassin® įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklėi ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.

KARŠČIAVIMO MAŽINIMUI IR SKAUSMO MALŠINIMUI

- IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100ml 435 €
- IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. 100ml 729 €



Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtkite. Ibustar vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praėityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešūždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiški kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakūrimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėityje skrandžio arba dvilikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Salutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtina simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlini tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjarauziais reikia vengti vartoti Ibustar. LT Ibu. 01/2024. Vt. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

RENKUOSI „IBUPROM“.
RENKUOSI LAISVĘ.



- IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 444 €
- IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių 516 €
- IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 665 €

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Terapinės indikacijos: skausmo (galvos, šanarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negeri daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negeri daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negeri daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradine doze yra 2 tabletes, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negeri daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvilikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestru. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-29.

378 €



NEOCITRAMONAS 240 mg/200 mg/30 mg tablečių N20
Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. Terapinės indikacijos: vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, šanarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems: po 1 tabletę, jei reikia iki 4 kartų per dieną. Didžiausia paros dozė - 4 tabletes. Negalima vaisto vartoti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki aukšto kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjęs skydlaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti, pakinta šlapimo kiekis, pasireiškia paburkimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą, nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo išsiskyrimo padidėjimą. Reklamos teksto parengimo data: 2024 11 14

NUO PERŠALIMO.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!



DALERON COLD3 325 mg/30 mg/15 mg pėlėvele dengtos tabletės N12 arba N24
Nereceptinis vaistinis preparatas**

Vienoje pėlėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudofedrino hidrohlorido ir 15 mg deksmetorfanro hidrobromido. Terapinės indikacijos: Persilimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, šanarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletes. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausia 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletes. Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantys insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė audonajų vilkligė, cukriniu diabetu, hipertiroidizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

3 75 €

ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neiūros kietosios kapsulės

Nereceptinis vaistinis preparatas**



Veiklosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaites. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepašalinami simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamu „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesniui kaip 18 metų vaikų populiacijai indikacijai trumpalaikiams gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymui. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, distigiją, vėmimą krauju ar melną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepašalinamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai paktusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojanti nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją kaip ilgalaikio profiaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klodogrelui neparatinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems trūkstazės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygiu. Reklamos teksto parengimo data 2025-08-18.

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*

3 41 €



7 29 €

MEZYM 10000V, 10 skrandyje neiurių tablečių MEZYM 20000V, 20 skrandyje neiurių tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Vienoje skrandyje neiurioje Mezym 10000V tabletyje yra 80mg- 111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopeją. Vienoje skrandyje neiurioje Mezym 20000V tabletyje yra 160mg-222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopeją. MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Mezym vartoti negalima; jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušies (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jis sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepašalinamumą. Esant simptomams, panašiams į žarnyno nepašalinamumo požymius, reikia apsvaistyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusiskundimų pobūdis, būtina kreiptis į gydytoją, kuris jus apžiūrės tikslu atžinti žarnų pažeidimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sąsė, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym būtina reikia būtina nuryti nekramčius. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitą nurodyti, valgant išgeriamas 2-4 plevėle dengtos MEZYM 10000V tabletes arba 1-2 plevėle dengtos MEZYM 20000V tabletes. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plevėle dengtos tabletes nuryjamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmė nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47. LT@berlin-chemie.com LT-MEZ-3-2025_MFLOW, 2025/12 *Kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

10 02 €



LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N30

LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N60

17 22 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatą, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

-40%



VALIDOL Aconitum – jūsų gerai savijautai!

Maisto papildai*

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palaikyti gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tabletę reikia laikyti po liežuvio tol kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną.



- ECOSH bioaktyvusis Selenas 150 mcg, 90 kapsulių
- ECOSH Ašvaganda 400 mg, 90 kapsulių
- ECOSH bioaktyvus Magnis su vitaminu B6, 90 kapsulių
- ECOSH bioaktyvusis Cinkas, bisglicinatas 25 mg, 90 kapsulių
- ECOSH bioaktyvus vitaminų B kompleksas, 60 kapsulių
- ECOSH Žarnyno DETOX, 260 g

Maisto papildai*

Ecosh - Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškesnius ir efektyvesnius maisto papildus. Naudojamas veganinės, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami veganams.

-40%



Maisto papildai*

- SELENAS + CINKAS + Vitaminai C ir E, 30 tablečių**
Stiprina imuninę sistemą, saugo ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo ir padeda palaikyti gerą odos, plaukų bei nagų būklę.
- ENDOARMONY, 30 kapsulių**
Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir skydliaukės veiklą, reguliuoja medžiagų apykaitą, kraujo rodiklius bei padeda kontroliuoti kūno svorį.
- ATERO Cholesterol, 30 kapsulių**
Sudėtyje esantys ciberžolių ekstraktas, cholinas ir foliatai padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, lipidų apykaitą bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.
- VALERIANA Extra 30 mg, 50 tablečių**
Valerijonų šaknų ekstraktas tradiciškai vartojamas padėti palaikyti ramybę, atsipalaidavimą ir emocijų pusiausvyrą.
- MaxiVita SUPER Line (lieknėjimui), 30 tablečių**
Garcinijos, chromas, arbatmedis ir vitaminas C padeda reguliuoti kūno svorį, medžiagų apykaitą bei gliukozės kiekį kraujyje, kartu stiprindami imunitetą ir mažindami nuovargį.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepašalinami ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lrv.lt.

LENGVAM NERIMUI MALŠINT IR MIEGUI PALENGVINTI

6⁸⁷ €



11⁷⁶ €

LILANDOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N14 arba N28

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliąjam arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Netinka vartoti jaunesniems negu 12 metų vaikams. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skystiu kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. LT-LIL-10-2025_MFLOW, 2025/12 Atgauk ramybę ir ramų miegą

-40%



„TRIPTAN FORTE“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

-40%

BALANSAS KŪNUI IR PROTUI!



Naujiena! „ASHWA pro600“ – papildai su aukštos kokybės ašvagandų KSM-66® šaknų ekstraktu, pasižymintiu itin didele – net 5% - vitanolidų koncentracija. Papildytas inulinu iš cikorijos šaknies, kuris ne tik palaiko nervų sistemą ir atsparumą stresui, bet ir praturtina mitybą augalinės kilmės tirpiomis skaidulomis. „Rebrain“ - naujos kartos nootropinis maisto papildas protinei veiklai, psichologinei funkcijai, kurio sudėtyje esantys fosfolipidai gali padėti išlaikyti kognityvinę funkciją ir ryškiai atmintį „bioMagnesium 300“ - magnio maisto papildas milteliais geriamajam tirpalui ruošti. 1 pakelyje – net 300 mg magnio citrato. Magnis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti, padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. „bioCalcium 600 mg“ - kalcio citratas milteliais su vitaminu D! Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, normalų nervinio impulso perdavimą. Vitaminas D svarbus kalcio ir fosforo įsisavinimui, normaliai imuninės sistemos veiklai.

Maisto papildai*

-40%

SUTEIK TITANIŠKOS GALIOS SĄNARIAMS IR ŠIRDŽIAI!



ATLANT LINIJA - aktyvių medžiagų sinergija Jūsų sąnariams, kaulams, širdžiai, kraujotakos sistemai.

„ATLANT“ – net 12 200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C kompleksas.

„ATLANT MAXIMUS“ - dar daugiau moksliskai įrodyto poveikio sąnariams kolageno (net 15 000 mg)! Be to kompleksas papildytas hialurono rūgštimi (net 500 mg), ciberžolės (500 mg) ir bosvelijos (100 mg) ekstraktais.

„ATLANT ŠIRDIS“ - svarbiausiam organui širdžiai su didžiausiu polifenolių (resveratrolio 260 mg ir likopeno 13 mg) kiekiu*, kofermentu Q10, mineralais K, Mg, Fe, vitaminu B1, gudobelės, ciberžolės ir vaistinio valerijono ir česnakų ekstraktais.

*2024 m. duomenis.

Maisto papildai*

-40%



KALIS+MAGNIS+B6, 60 tablečių

Kraujospūdžiui, nervų sistemos veiklai, raumenų funkcijai palaikyti.

MAGNESIUM 400 mg + B complex + vitamin C milteliai N20

Magnis, vitaminai C, B1, B6 ir B12 stiprina imunitetą bei širdį, mažina nuovargį ir palaiko normalią nervų sistemos, raumenų bei energijos apykaitos funkciją.

MUMI IMUNO skystis 10 ml N10

Mumijo, kordicepsų, kulkšnių ekstraktai ir vitaminas C stiprina imuninę sistemą bei palaiko organizmo gyvybingumą, kraujagyslių funkciją bei fizinę ir protinę veiklą.

MAGNIO Bisglicinatas+Zn+vit.D, 100 kapsulių

Magnis, cinkas bei vitaminai D ir C padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei kaulų, dantų ir dantenų būklę.

Maisto papildai*

-40%



KRIOMEGA+, kapsulės N30

Maisto papildas*

Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantys omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėžiagyvių – krilių – ekstrakto, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose. Ypač aukštos kokybės krilių taukuose esančios EPR (eikozapentaeninės) ir DHR (dokozaheksaeninės) rūgštys padeda palaikyti širdies veiklą, DHR rūgštys padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą**. Krilių taukų kapsules patogiau vartoti: jos nepalieka nemalonaus poskonio ir yra kelis kartus mažesnės nei įprastų žuvų taukų kapsulės. Užtenka tik 1 kapsulę per dieną. *Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. **Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

-40%



Linija „**LIUBERIN**“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „**LIUBERIN superior**“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Ginkmedžio ekstraktas padeda palaikyti akies kraujotaką. O „**LIUBERIN +LUTEIN 35 MG**“ – preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Mėlynių ekstraktas padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

-50%



ISKIAL MAX, 120 kapsulių
ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių

Maisto papildai*

„ISKIAL“ – ryklio kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklio kepenų aliejus – tai vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „ISKIAL JUNIOR“ sudėtyje kartu yra ir zuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, kurios svarbios normaliai smegenų funkcijai ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „ISKIAL MAX“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

-40%

LIVOL – GEROS SAVIJAUTOS MEISTRAI IŠ DANIJOS



Imunitetui, gerai savijautai LIVOL vitaminai

Maisto papildai*

Atnaujintas LIVOL įkvėptas Danijos vertybių, šiaurietiškos estetikos ir Hygge balanso, kuris atspindi harmoningą požiūrį į kasdienę gerą savijautą. Danų kultūroje gyvenimo pusiausvyrą gimsta iš paprastų, bet prasmingų kasdienybės akimirų – judėjimo, ramybės, artumo, šypsenų bei sąmoningo rūpesčio savimi. Šia filosofija vadovaujasi ir LIVOL vitaminai, sukurti Danijoje, naudojant pažangias, subalansuotas formules ir efektyvią gamybos technologiją, užtikrinančią maksimalų pasisavinimą.

-20%



BIO-GLUCOSAMINE, 500 mg, 150 tablečių,
BIO-GLUCOSAMINE MEGA, 500 mg, 60 tablečių

Maisto papildai*

Aukštos kokybės gliukozamino sulfatas, išgautas iš gliavandenių vėžiagyvių. „Bio-Glucosamine MEGA“ tabletėse papildomai yra chondroitino sulfato. Kartu su vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą.

-15%

HEMOROJAUS SUKELTO DISKOMFORTO MAŽINIMUI



HEMOPROPIN tepalas su propoliu, 20 g

Medicinos priemonė

Veikliosios medžiagos: vazelinas, lanolinas, propolio ekstraktas, vaistinė ramunėlė (Anthemis nobilis). Terapinės indikacijos: natūralios sudėties tepalas Hemopropin su propoliu skirtas hemorojaus sukeltam diskomforto mažinimui. Tepalas sukuria apsauginę plėvelę ant pažeistos tiesios žarnos gleivinės ir apsaugo ją nuo dirginimo, skausmo, įtrūkimų, niežėjimo bei skausmingo tuštinimosi. Dozavimas ir vartojimo būdas: ūmiu periodu tepti HEMOPROPIN tepalą ant svorio išangės ir tiesiosios žarnos srityje ryte ir vakare. Simptomams palengvėjus, tepti vakare. Kontraindikacijos: nenaudoti esant alergijai propoliui. Saugoti nuo vaikių.

-25%

INTYMIAM HIGIENAI



LACTACYD PHARMA intymios higienos prausiklis apsaugai nuo BAKTERIJŲ, 250 ml
LACTACYD PHARMA intymios higienos prausiklis JAUTRIAI odai, 250 ml
LACTACYD PHARMA intymios higienos prausiklis su PREBIOTIKAIS, 250 ml
LACTACYD CLASSIC intymios higienos prausimosi losjonas kasdieniam naudojimui, 200 ml

Kosmetikos priemonės

LACTACYD® intymios higienos prausikliai yra specialiu produktų, praturtintu natūraliais aktyviais ingredientais, grupė, skirta kasdieniai intymiai higienai. Sudėtyje esanti natūrali L-pieno rūgštis bei tinkamas pH – švelniam intymios zonos natūralios pusiausvyros atstatymui ir apsaugai. Iš plataus LACTACYD® asortimento paprasta išsirinkti sau tinkamiausią priemonę: prausiklis apsaugai nuo BAKTERIJŲ padeda slopinti nepageidaujamų bakterijų dauginimąsi ir apsaugo nuo nemalonaus kvapo susidarymo, pritaikytas naudoti menstruacijų metu, po sporto, taip pat nėštumo metu bei po gimdymo; prausiklis JAUTRIAI odai – itin švelni formulė be kvapiklių; prausiklis su PREBIOTIKAIS stiprina natūralią mikroflorą; prausimosi losjonas – skirtas normaliai odai, sukurtas harmoningai dirbti su Jūsų kūnu.

VAISTINIŲ KONTAKTAI

- | | |
|--|---|
|  VILNIUS Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642
Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520 |  GRINKIŠKIS Tiltų g. 13-2, tel. (0 422) 63 388
Radviškio raj. |
|  KAUNAS V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826 |  GRIŠKABŪDIS Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266
Šakių raj. |
|  MASTAIČIAI Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144
Kauno raj. |  JONIŠKĖLIS Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219
Pasvalio raj. |
|  KLAIPĖDA Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914 |  KAIŠIADORYS Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745 |
|  ŠIAULIAI Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879 |  KRUONIS Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106
Kaišiadorių raj. |
|  ALYTUS Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088 |  MICKŪNAI Mickūnų g. 3, tel. (0 522) 34 206
Vilniaus raj. |
|  BUTRIMONYS Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244
Alytaus raj. |  SASNAVA Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511
Marijampolės raj. |
|  MIROSLAVO K. Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587
Alytaus raj. |  SEIRIJAI Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939
Lazdijų raj. |
|  DRUSKININKAI Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008 |  SIMNAS Alytaus g. 10, tel. (0 315) 426 16
Alytaus raj. |
|  ELEKTRĖNAI Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415 |  ŠAKIAI V. Kudirkos g. 48, tel. (0 345) 51 516 |
|  ABROMIŠKIŲ K. Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310
Elektrėnų sav. |  VENTA Žemaičių g. 31-43, tel. (0 425) 30 447 |
|  GIRKALNIS Šėtupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523
Raseinių raj. | |

Užsisakykite prekes internetu www.100metu.lt ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!



VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS

Prienų raj.

„Guobos vaistinė“
Vilniaus g. 107
tel. (0 319) 59 280

IŠLAUŽAS

Prienų raj.

„Vitalijos vaistinė“
Kauno pl. 1
tel. (0 698) 45 977

KALVARIJA

Marijampolės raj.

„Kalvarijos vaistinė“
Ugniagesių g. 9
tel. (0 343) 21 257

KĖDAINIAI

„Kaštonų vaistinė“
J. Basanavičiaus g. 10
tel. (0 347) 67 244

MARIJAMPOLĖ

„Gubojos vaistinė“
R. Juknevičiaus g. 72-1
tel. (0 343) 97 372

KURŠĖNAI

„Kuršėnų vaistinė“
Vytauto g. 5
tel. (0 415) 85 747

-30%



PANTHENOL balzamas lūpoms, 5 ml su beta karotenu ir D-pantenoliu, padedantis veiksmingai prižiūrėti lūpas.

PANTHENOL Forte 6 % kremas, 30 g su dideliu D-pantenolio kiekiu, A, E ir F vitaminų kompleksu ir alantoinu. Tinka sudirgusios ir sausos odos kasdieninei priežiūrai.

PANTHENOL Forte 2 % kremas rankoms 100 ml. Sudėtyje yra D-pantenolio, minkštinančio ir sušvelninančio sausą rankų odą. Papildytas alantoinu, avokadu aliejumi ir vitaminu E, vertinamu dėl antioksidacinio poveikio.

PANTHENOL Forte purškiamos odos putas, 150 ml su 9% D-pantenolio ir vitaminu A, E ir F kompleksu. Purškiklis skirtas saules ar kitaip pažeistos odos priežiūrai. Paprasta naudoti jautrioms sritims. Greitai susigeria, panaudojus oda netampa lipni.

-40%



THE DOCTOR HEALTH & CARE

Kosmetika, sukurta kasdieninei plaukų ir galvos odos priežiūrai! Puoselėkite savo plaukus su The Doctor Health & Care plaukų priežiūros linija!

-30%

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PATIKIMOSE RANKOSE



LEUKOPLAST®

Medicinos priemonės

Aukštos kokybės pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms, tokioms kaip įpjovimai, įbrėžimai, nubrozdinimai ar įtrūkimai. Yra įvairių tipų pleistrai: sterilūs, atsparūs vandeniui ar apsaugantys nuo bakterijų patekimo į žaizdą, itin tvirtai prilimpantys ar švelnūs odai. „Leukoplast elastomull haft“ – kibus elastinis bintas tvarsčių prilaikymui ir fiksavimui. Unikalus tuo, kad limpa pats prie savęs, tačiau nelimpa prie odos. Išsirinkite tinkamiausias priemones savo pirmosios pagalbos vaistinėlei.