



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonai. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Kaip apsaugoti nuo ŽPV sukiamų ligų?

Dėl informacijos apie skiepų prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vaipris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791> 03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonai. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Kaip apsaugoti nuo ŽPV sukiamų ligų?

Dėl informacijos apie skiepų prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vaipris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791> 03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonai. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Pasitarkite su savo šeimos gydytoju apie vakcinaciją nuo ŽPV

Dėl informacijos apie skiepų prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vaipris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791> 03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonai. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Pasitarkite su savo šeimos gydytoju apie vakcinaciją nuo ŽPV

Dėl informacijos apie skiepų prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vaipris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791> 03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonai. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.



Dėl informacijos apie skiepų prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vaipris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791> 03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonai. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.



Dėl informacijos apie skiepų prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vaipris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791> 03/2022 LT-GSL-00094

Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

03/2022 LT-GSL-00094

Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

03/2022 LT-GSL-00094

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM) nemokamu telefonu: 8 800 73568 arba užpildyti www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją VVKT prie LR SAM vienu iš šių būdų: raštu: Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, nemokamu faksu: 8 800 20131, el. paštu: NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per VVKT prie LR SAM interneto svetainę <http://www.vvkt.lt>. Pranešdami apie šalutinį poveikį padėsite mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. www.vvkt.lt

03/2022 LT-GSL-00094

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM) nemokamu telefonu: 8 800 73568 arba užpildyti www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją VVKT prie LR SAM vienu iš šių būdų: raštu: Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, nemokamu faksu: 8 800 20131, el. paštu: NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per VVKT prie LR SAM interneto svetainę <http://www.vvkt.lt>. Pranešdami apie šalutinį poveikį padėsite mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. www.vvkt.lt

03/2022 LT-GSL-00094

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE ŽPV:




ŽPV prevencija www.zpv.lt

03/2022 LT-GSL-00094






SUŽINOKITE DAUGIAU APIE ŽPV:




ŽPV prevencija www.zpv.lt

03/2022 LT-GSL-00094

1400x162 px GARDASIL pac.

 GARDASIL.9 [Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina]	Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.				Kaip apsaugoti nuo ŽPV sukeliamų ligų? Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791 03/2022 LT-GSL-00094
 GARDASIL.9 [Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina]	Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.				Pasitarkite su savo šeimos gydytoju apie vakcinaciją nuo ŽPV Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18. Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791 03/2022 LT-GSL-00094
 GARDASIL.9 [Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina]	Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.				Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. 03/2022 LT-GSL-00094
 GARDASIL.9 [Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina]	Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.				Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM) nemokamu telefonu: 8 800 73568 arba užpildyti www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją VVKT prie LR SAM vienu iš šių būdų: raštu: Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, nemokamu faksu: 8 800 20131, el. paštu: NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per VVKT prie LR SAM interneto svetainę http://www.vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį padėsite mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. www.vvkt.lt 03/2022 LT-GSL-00094
 GARDASIL.9 [Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina]	Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.				SUŽINOKITE DAUGIAU APIE ŽPV:   ŽPV prevencija www.zpv.lt 03/2022 LT-GSL-00094

1920 width x 503



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]



**KAIP
APSISAUGOTI
NUO ŽPV
SUKELIAMŲ
LIGŲ?**

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Dei informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]



**PASITARKITE
SU SAVO
ŠEIMOS GYDYTOJU
APIE VAKINACIJĄ
NUO ŽPV**

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Dei informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]



Jeigu Jums arba
Jūsų vaikui pasireiškė
šalutinis poveikis,
įskaitant šiame lapelyje
nenurodytą, pasakykite
gydytojui, vaistininkui
arba slaugytojui.

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Dei informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]



Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT)
prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM)
nemokamu telefonu: 8 800 73568 arba užpildyti
www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją VVKT
prie LR SAM vienu iš šių būdų: raštu: Žirmūnų g.
139A, LT-09120 Vilnius, nemokamu faksu:
8 800 20131, el. paštu: NepageidaujamaR@vvkt.lt,
taip pat per VVKT prie LR SAM interneto svetainę
<http://www.vvkt.lt>. Pranešdami apie šalutinį poveikį
padėsite mums gauti daugiau informacijos apie
šio vaisto saugumą. www.vvkt.lt

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas. Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiesiems skirta vakcina, leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Dei informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepavimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE ŽPV:



ŽPV prevencija



www.zpv.lt

03/2022 LT-GSL-00094

GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

**KAIP APSISAUGOTI
NUO ŽPV
SUKELIAMŲ LIGŲ?**

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.



Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094

GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

**PASITARKITE SU SAVO
ŠEIMOS GYDYTOJU
APIE VAKINACIJĄ NUO ŽPV**

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.



Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094

GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė
šalutinis poveikis, įskaitant šiame
lapelyje nenurodytą, pasakykite
gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.



Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094

GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės
tarnybai (VVK) prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM)
nemokamu telefonu: 8 800 73568 arba užpildyti www.vvkt.lt esančią
formą ir pateikti ją VVK prie LR SAM vienu iš šių būdų: raštu: Žeminių g.
139A, LT-09120 Vilnius, nemokamu faksu: 8 800 20131, el. paštu:
NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per VVK prie LR SAM interneto
svetainę <http://www.vvkt.lt>. Pranešdami apie šalutinį poveikį padėsite
mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. www.vvkt.lt

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.



Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE ŽPV:



ŽPV prevencija



www.zpv.lt

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

**KAIP APSISAUGOTI
NUO ŽPV
SUKELIAMŲ LIGŲ?**

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.




Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

**PASITARKITE SU SAVO
ŠEIMOS GYDYTOJU
APIE VAKINACIJĄ NUO ŽPV**

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.




Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė
šalutinis poveikis, įskaitant šiame
lapelyje nenurodytą, pasakykite
gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.




Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094



GARDASIL.9
[Devyniavalentė rekombinantinė
žmogaus papilomos viruso vakcina]

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės
tarnybai (VVK) prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM)
nemokamu telefonu: 8 800 73568 arba užpildyti www.vvkt.lt esančią
formą ir pateikti ją VVK prie LR SAM vienu iš šių būdų: raštu: Žemunių g.
139A, LT-09120 Vilnius, nemokamu faksu: 8 800 20131, el. paštu:
NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per VVK prie LR SAM interneto
svetainę <http://www.vvkt.lt>. Pranešdami apie šalutinį poveikį padėsite
mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. www.vvkt.lt

Injekcinė suspensija 0,5 ml, N1 flakonas.
Vaikams bei paaugliams nuo 9 metų
ir suaugusiesiems skirta vakcina,
leidžiama norint apsaugoti nuo ligų,
kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 ar 58 tipo ŽPV.




Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepijimo programos leidimo Nr. LG-18.
Vaistinio preparato pakuotės lapelio informacija: <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/25791>

03/2022 LT-GSL-00094

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE ŽPV:



ŽPV prevencija



www.zpv.lt

03/2022 LT-GSL-00094

INFORMACIJA VARTOTOJUI

GARDASIL[®] 9 [Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina]

Daugiau informacijos: www.zpv.lt

ŽPV – žmogaus papilomos virusas



GARDASIL9 injekcinė suspensija

Devyniavalentė vakcina nuo žmogaus papilomos viruso (rekombinantinė, adsorbuota)

Kas yra GARDASIL9 ir kam jis vartojamas

GARDASIL9 yra vaikams bei paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems skirta vakcina. Ji leidžiama norint apsaugoti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo žmogaus papilomavirusas (ŽPV). Šios ligos yra: moters lyties organų (gimdos kaklelio, išorinių lyties organų ir makšties) ikivėžinės pažeidimai, išangės ikivėžinės pažeidimai, vyrų ir moterų lyties organų karpos bei gimdos kaklelio ar išangės vėžys. Gardasil skiriamas apsaugoti nuo šių ligų. Vakcina nevartojama ŽPV sukeltų ligų gydymui.

GARDASIL9 vartoti negalima, jeigu Jums arba Jūsų vaikui:

- yra alergija bet kuriai iš veikliųjų medžiagų arba bet kuriai pagalbinei šios vakcinos medžiagai;
- suleidus GARDASIL arba SILGARD (6, 11, 16 ir 18 tipo ŽPV) arba GARDASIL9 dozę išsivystė alerginė reakcija.

Išpėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, jeigu Jūsų arba Jūsų vaiko:

- yra sutrikęs kraujo krešėjimas (kraujuoja ilgiau nei įprastai), pavyzdžiui, yra hemofilija;
- imuninė sistema yra nusilpusi, pavyzdžiui, dėl genetinio defekto, ŽIV infekcijos arba imuninę sistemą slopinančių vaistų vartojimo;
- jeigu Jūs arba Jūsų vaikas serga liga, kurios metu sunkiai karščiuoja. Vis dėlto nežymiai padidėjusi kūno temperatūra ar nesunki viršutinių kvėpavimo takų infekcija (pavyzdžiui, peršalimas) nėra priežastis atidėti skiepimą.

Kaip leidžiamas GARDASIL9

GARDASIL9 yra injekcija, kurią suleis Jūsų gydytojas. GARDASIL9 yra skirtas paaugliams nuo 9 metų ir suaugusiems žmonėms.

Jeigu pirmosios injekcijos metu esate nuo 9 iki 14 metų (imtinai)

GARDASIL9 gali būti skiriama pagal 2 dozių schemą:

- pirmoji dozė suleidžiama pasirinktą dieną;
- antroji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus nuo 5 iki 13 mėnesių.

Antrąją vakcinos dozę suleidus anksčiau nei praėjus 5 mėnesiams po pirmosios dozės, visada būtina suleisti trečiąją dozę.

GARDASIL9 gali būti skiriama pagal 3 dozių schemą:

- pirmoji dozė suleidžiama pasirinktą dieną;
- antroji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 2 mėnesiams (ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo pirmosios dozės);
- trečioji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 6 mėnesiams (ne anksčiau kaip po 3 mėnesių po antrosios dozės).

Visos trys dozės turi būti suleistos per vienerius metus. Daugiau informacijos suteiks Jūsų gydytojas.

Jeigu pirmosios injekcijos metu esate 15 metų ir vyresni

GARDASIL9 turi būti skiriama pagal 3 dozių schemą:

- pirmoji dozė suleidžiama pasirinktą dieną;
- antroji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 2 mėnesiams (ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo pirmosios dozės);
- trečioji dozė suleidžiama po pirmosios injekcijos praėjus 6 mėnesiams (ne anksčiau kaip po 3 mėnesių po antrosios dozės).

Visos trys dozės turi būti suleistos per vienerius metus. Daugiau informacijos suteiks Jūsų gydytojas.

Žmonėms, kuriems buvo suleista pirmoji GARDASIL9 dozė, skiepimo kursą rekomenduojama užbaigti vakcina GARDASIL9.

GARDASIL9 bus suleista per odą tiesiai į raumenis (geriau viršutinės rankos dalies arba šlaunies raumenį).

Pamiršus vieną GARDASIL9 dozę

Jei pamiršote planuotą dozę, Jūsų gydytojas nuspręs, kada Jums suleisti praleistąją dozę.

Svarbu laikytis Jūsų gydytojo arba slaugytojo nurodymo, kada turite vėl pas jį apsilankyti kitos vakcinos dozės. Jei pamiršote arba negalite atvykti pas gydytoją paskirtu laiku, klauskite jo patarimo. Kai pirmoji dozė yra GARDASIL9, skiepimo kursas turi būti užbaigtas GARDASIL9, o ne kitokia ŽPV vakcina. Jei kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Galimas šalutinis poveikis

Ši vakcina, kaip ir visos kitos, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Suleidus GARDASIL9 gali būti stebimi šie šalutiniai reiškiniai.

Labai dažni (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 pacientų): šalutinis poveikis injekcijos vietoje (skausmas, patinimas ir paraudimas) ir galvos skausmas.

Dažni (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 pacientų): šalutinis poveikis injekcijos vietoje (kraujosruvos ir niežulys), karščiavimas, nuovargis, svaigulys ir pykinimas.

Reti (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1000 asmenų): alerginės reakcijos.

Kai to paties apsilankymo pas gydytoją metu būdavo leidžiamos GARDASIL9 ir revakcinacinė sudėtinė difterijos, stabligės, kokliušo (nelaštelinė, komponentinė) ir poliomieliito (inaktyvuota) vakcinos, injekcijos vietos patinimas pasireiškėda dažniau.

Pranešta apie alpimo, kartais kartu su traukuliais arba sąstingiu, atvejus. Nors alpimo epizodų pasireiškia nedažnai, po vakcinos nuo ŽPV suleidimo pacientų būklę reikia stebėti 15 minučių.

Šalutinis poveikis, pasireiškęs skiepįjant GARDASIL ar SILGARD, todėl galintis pasireikšti ir suleidus GARDASIL9

Yra pastebėtos alerginės reakcijos. Kai kurios iš šių reakcijų buvo sunkios. Jų simptomai gali būti pasunkėjęs kvėpavimas ir švokštimas. Kaip ir vartojant kitas vakcinas, įprastai pastebėtas šalutinis poveikis yra: raumenų silpnumas, nenormalūs pojūčiai, dilgsėjimas rankose, kojose ir viršutinėje kūno dalyje arba sumišimas (Guillain-Barré sindromas, ūminis išplitęs encefalomyelitas); kraujavimas arba kraujosruvos, atsirandančios lengviau negu įprastai, bei odos infekcija injekcijos vietoje.

GARDASIL9 teksto paskutinės peržiūros data – 2021 11 10.

Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Skiepimo programos leidimo Nr. LG-18.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu Jums arba Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę <http://www.vvkt.lt>. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.